

# PORADNIKA

4616

DOMOWEGO

44 Część Druga

61



Przez H. Dziarkowskiego

W WARSZAWIE

u P. Trubnie Ławadskiego i Heckiego

R. 1819.

z Rycinami.

Z KSIĘGOCIORU  
STEFANA HEMPLA



WOJEWÓDZKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
-1- 26-600 RADOM

*księgozbiór  
przedwojenny*

15819

## W Y K A Z

*Materyów i chorób w téy części  
zamieszczonych.*

Wstęp do zasad i prawideł wpostępowania doradczym domowym	1
Stan z powiększoną siłą żywotnią Str:	2
— Zpomnieyszoną siłą żywotnią	5
Objasnienie sił żywotnych	6
Poznanie przyczyn chorób	9
Różnica zięgo się mienia od chorób	10
O trwaniu i biegu chorób	11
O zakresach chorób	18
Oboasowanie zjawisk, czyli przypadłość	23
Skutkowania przypadłości	25
Zmiany wypróżnień	28
Zasady do nich	29

## R O Z D Z I A Ł E K I.

### *Częstka pierwsza*

Instrukcyja dla osób pilnujących chorych	73
Krótki rys konstytucyów	43
Konstytucyja mocna	45
Dyetta do niej	46
Wybór leków	47
Konstytucyja słaba delikatna	48
Dyetta	49
Wybór leków	50
Konstytucyja nerwowa	tamże
Dyetta	51
Wybór leków	52

52\*

Konstytucya drażliwa	53
Dyetta	tamże
Wybór leków	54
Konstytucya nieczuła	tamże
Dyetta	55
Wybór leków	tamże
Konstytucya flegmatyczna	57
Dyetta	58
Wybór leków	tamże
Konstytucya krwista	59
Dyetta	60
Wybór leków	61
Konstytucya żółciowa	62
Dyetta	tamże
Wybór leków	63
Konstytucya skłonna do zatwardzeń	64
Dyetta do niej	65
Wybór leków	66
Konstytucya skłonna do biegówek	68
Dyetta przy niej	69
Wybór leków	70
Konstytucya do wiatrów skłonna	71
Dyetta	tamże
Wybór leków	74
Konstytucya skorbutyczna	77
Dyetta	76
Wybór leków	78
Konstytucya szkrofuliczna	78
Dyetta	79
Wybór leków	80

### Częstka druga.

O zwyczajnych wieku dzieciennych chorobach	
— wyrzynanie się zębów	85

### Częstka trzecia.

O kaszlu i jego różnicach	96
— tak zwanym spazmodycznym	99

Kaszel żółdkowy	110
O bólach głowy	111
— biegówkach i dysenterjach	115
— dysenterjach	128
— wyschnięciu ciała dzieciennych	134
— wymiotach	139
— wystąpieniu kiszki stolcowej	144
— boleściach w żołądku, kiszkiach i wiatrach	147
— zatrzymaniu stolca	150
— wstrzymaniu uryńki	153
— mimowolnym uryńki odpływie	156
— żółtacze dzieciennych	158
— angielskiy chorobie	162
— szkrfulach	181
— kile pępkowej	193
— krwi płynieniu z miejsca uciętego pępk	194
— wystąpieniu pępka	tamże
— czkawce	195
— rozeysciu się szwów czaszki	196
— przyrośnięciu języka	tamże
— zapaleniu oczów	197
— ropieniu gruczołków powiek	198
— sapce	199
— ruży nowo-narodzonych	200
— wzruszeniu nerwów czyli konwulsjach	201
— spazmie szczęk dzieciennych	202
— przycięciu i miejscach sinych	203
— zajęczy wardze	204
— czerwonych plam wyrzucie	206
— pęknięciu skóry	tamże
— ogłupiorach	207
— liszajowych	209
— łupieżach na głowie	210
— zagojeniu uszów	211
— grzybkach	tamże
— wewnętrznych głowy darcach	216
— ulatniającym ogniu dzieciennym	219
— boleściach oczów	tamże



— ięczmieniu	228
— zaięczym oku	229
— płynieniu z oczów	230
— zyzowości	tamże
— bólu uszów i ich zapaleniu	233
— ciężkim słuchu i głuchocie	236
— ostrożnościach przy rupturach dzie- cinnych	tamże
— zatruciach	237
— uduszeniu przez różne wyziewy	244
— połknięciu nie zwyczajnych rzeczy	245
— oparzeniu	246
— upadnięciu dzieciinnym	248
— zranieniach	249
— uduszeniu dzieci przez przycisk	250
— zawczesnym lub natężonym rozwia- nia się wladz umysłowych	251
— gniciu usłęk dzieciennych	254
— gangrenie dzieciennéy	255
— ospie ludzkiey	256
Opis łagodnéy ospy	257
— — ziadliwéy	259
Różnice ziadliwéy ospy	260
Przepowiedzenia	261
Ogólne różnice pomiędzy łagodnemi i ziadlinemi ospami	264
O utrzymaniu ogólném przy ospach	265
Zachowanie w pierwszym peryodzie	266
— w drugim peryodzie	272
— w trzecim peryodzie	274
Leżenie ospy łagodnéy	276
— — ziadliwéy	277
O fałszywéy ospie	278
— odrze	280
— — ziadliwéy	283
Szczepienie odrzy	290
O puchlinie naatępczéy po odrze	292
— utrzymaniu chorych w czasie téy fe- bry	295

— czerwonce	298
— szkarłatynie	299
— wyrzucie pęcherkowym	302
— fryzlach	306
— potrzebowym wyrzucie	314
— febrze pokrzywnicy	315
— wyrzucie ogniowym	316
— wyprzeniach	tamże
— swierzbie dzieciennéy	317
— liszajach	322
— parchach	324
— robactwie w głowie	326
— brodawkach	327
— wenerycznéy chorobie	328
— guzie nagryczowym	332
— robactwie skórnym zwanem	334
— robakach	336
— wielkiey chorobie	343
— chrzanic	345
— tańcu Świętego Wita	351
— appoplexyi i paralizu	353
— bólach gardła	357
— — gardła katarycznych	360
— — zgniłym	362
— zapaleniu krtani i kanału powietrznego	368
— gardlicy kurczowéy	384
— katarze duszącym	388
— ciągłym krótkim tchu, dyszeniu i rzę- żeniu w piersiach	391

## ROZDZIAŁEK II.

### Częstka pierwsza.

O chorobach często zdarzających się	396
— zbieciu i nderzeniu w ogólności	tamże
— — głowy	398
— — piersi	400
— — żywota	402
— skaleczeniu	408



— wpadnięciu w ucho różnego owadu	421
— ukąszeniach przez iaszczurki lub węże	424
— ukąszeniach owadu komarów, pszczoł oss i t. p.	435
— chorobach zużytku mięs chorego by- dła	436
— kroście żydówką zwaną	438
— przypaleniu i oparzeniu	441
— odmrożeniach	445
— gwałtownym serca biciu	452
— tak zwaną marzę	455
— krwi płucną	456
— wymiotach krwistych	466
— moczu krwistym	470
— zbytecznych a do tego często napada- jących czyszczeniach miesięcznych	472
— krwi plynieniu macicznym	474
— wstrzymaniu naturalnych czyszczeń	475
— białych części rodnych płci obojga płynieniach	482
— biegunkach	491
— biegunce szczególnego gatunku	498
— cholery chorobie	499
— zatrzymaniu stolca	502

#### *Częśćka druga.*

O kolce i ięć różnicach	509
— krótkim technieniu czyli dychawicy	512
— dychawicy suchej	520
— — z zaziębień	521
— — od kurzawy lub wyziewów o- strych	523
— kaszlach	524
— głowy bólach	535
— kurczu żołądka	540
— szkorbutcie	544
— opuchlinie	550

### *R O Z D Z I A Ł E K III.*

#### *Częśćka pierwsza.*

O Febrach przerywanych zimnych	565
— febrach reumatycznych	572
— — katarycznej łagodnej	588
— — katarycznej zapalnej natury	592
— — żołądkowej	596
— — żółciowej	602
— — zgnilej	605
— — nerwowej	618
— zapaleniach w ogólności	631
Charakter ogólny	tamże
O zapaleniu mózgu	641
— zapaleniach części w wydrążeniach ust znajdujących się	643
— zapaleniu pęcherzy grzbietowych	644
— zapaleniu płuc	645
— kłociach w hoku	647
— zapaleniu żołądka	648
— — kiszek	651
— kołtonie	653

### *R O Z D Z I A Ł E K IV.*

O chorobach położowych, popołożowych i karmiących	681
— febrze pokarmowej	886
— nadpływach położowych	694
— febrze popołożowej	695

### *R O Z D Z I A Ł E K V.*

O chorobach nagłego ratunku potrzebn- jących narzędziach wraz z ich uży- ciem.	711
Zasady ogólniejsze do ratowania	713
Znaki prawdziwej śmierci	715
— utraconego i powracającego życia	716
Powszechne ratunków środków	717
Ratunek powieszonych	734



— z obawy uduszenia it. p.	736
— utonionych	742
— zmarłych	745
— zaduszonych od wyziewów	747
— zagorzałych	750
Instrukcja dla ratujących osób	753
Ratunek od pioruna uderzonych	755
— zatrutych	757
Objaśnienie rycin i narzędzi ratunkowych	770

## ROZDZIAŁEK VI.

Apteczka domowa	778
Przepisy lekarstw	796

## LISTA PRENUMERATORÓW

*Na Poradnika Domowego.*

*Jak się podali.*

Adelssohn.  
 Buchowski Franciszek. Xiądz.  
 Buczyński.  
 Czarnecki.  
 Dorand.  
 Dziekoński.  
 Grabowski Ambroży. 2. Exemplarze.  
 Grabowski, Hrabia.  
 Jabłoński. Księgarz 6. Exemplarzy.  
 Karpiński Gabryel. 3 Exemplarze.  
 Krolikowski.  
 Kaczkowski.  
 Kłosowski.  
 Maruszcwski Tomasz.  
 Murawska Szambellanowa.  
 Miłaczewicz.  
 Matecki Józef. 2. Exemplarze.  
 Mierzyński Adam.  
 Moczarski Jan.  
 Mackiewicz.  
 Nieszkowski.  
 Ogrubski.  
 Ostrowski Tadeusz. Hrabia.  
 Olesza.  
 Pierzchański.  
 Rogulski. Pułkownik.  
 Rektor Szkół Białskich.  
 Szumski Tomasz.  
 Świętosławski.  
 Stanisławski.  
 Szarzyński.  
 Stryński Sędzia Pokoju.

Suchodolski Hrabia.  
Wolanowski. Kommissarz Obwodowy.  
Wodnicka Chorażyni.  
Wendorf.  
Wolodski.  
Wodziński Jan.  
Węgrocki.  
Walowski Karol.  
Zieliński Stanisław.  
Załuski Pułkownik.  
Zawadzki i Węcki. 25. Exemplarzy.

---

## Omyłki Druku.

### w Wykazie Materyów.

Kar:	zamiast	czytaj
314.	potrzebowym wyrzucie	porcelanowym wyrzucie
332.	guzie nagryczowym	guzie nadgryczowym

### o Pieprzu.

Kar:	zamiast	czytaj
791.	wątpić	wątpić
—	łóy	ług

### O dżywno.

Kar:	czytaj
794.	nie może być choroba uleczona bez wzmaganja sił żywotnych, tém bardzićy kiedy też w processie chorobnym ciągłym nateżonym, wyczerpanem zostały



## W S T Ę P.

Służący do objaśnienia zasad i prawideł na których się wspierać ma postępowanie doradcze domowe zajętych częścią drugą chorób.

Mimo ostróg i upominków w części pierwszej przeciw chorobom podanych są przeciw innym którym ulegać musimy mniej, więcej, lekciej, ciężej, bezpiecznie lub niebezpiecznie, potrzeba się więc zaopatrzyć w dostateczne siły żywotne jako najdroższy skarb organicznej natury, za pomocą której przewyciężaniem bywają rozmaite choroby nie raz do nieuleczonych polichowane. Szczędzenie tych to sił im iest wcześnię rozpoczęte, stale utrzymywane, zapewnia nieograniczone dobrodziejstwo że nawet w późnej starości zasłaniać zwykło od chorób wiekowi temu właściwych, lecz nadto w wielkich słabościach daleko pewnię, skutecznię, pospiesznię przez wzbudzające środki dźwignione bywają i



w tenczas pomyślniey wychod chorobom, chociaż by i te niebezpiecznemi były, zapowiadaia. Wcale nas przeciwnie i smutne nauczaią prawie codzienne doświadczenia że gdzie ich niedostaie i gdzie były zbyt wczesnie przez rozwiązłe życie, trunkom uległość, wy-czerpanemi zwałtonemi nadwreżonemi, iuż tam powolęy, mniey, czynniey są wstanie zdziałać skuteczny odczyn na-przeciw szkodliwościom, nie tak też łatwo w processie chorobliwego życia przy pomocy leków gatunkowo nań działających wyprowadzaią. — Z tego o siłach żywotnych przedstawienia na wstępie téy części chorobom przeznaczonęy położonego, obieramy następujące wielkiey wagi w postępowaniu doradczym domowym naukę, że bez nich ani kroku śmiałego bezpiecznego uczynić nie możemy, pragnąc istotnie skutecznie cierpiącemu zaradzić, nie wystawiając go na żadne pomyłne a tém bardziej nayszkodliwsze bo aż do utraty życia doprowadzaiące wypadki, z tych uwag są.

- a). Stan z powiększoną czynnością składu tętnów (Arteriosum sistema) czyli iasniey mówiąc z powiększonym siły żywotnéy skutkowaniem, lekarze stan takowy nazywaią (hy-

perstenicznym) charakterystyczne znamiona iego daia się poznawać w działaniach płuc, serca tętnów żywszych z łatwością odbywaiących, czynniejszych, wytrwalszych i nie tak w wpływowi szkodliwości ulegających, iak łatwiey takowe przewyciężających na przypadek gdyby się do zawiązania chorobliwego processu przyczyniały.

- b). Towarzyszy tenże naysposzechniey konstytucyi krwistey dobrze żywionym pełnością iędrnością sprężnością ciała, przekwitaiącym licom udarowanym a nadto wiekowi młodemu, sredniemu, iak się zdarza widzieć niekiedy i w pode-szłym, w tenczas uważać go można za zwyczajki nad wszelkiemi wadami ludzkiey natury, za nagrodę w burzliwéy życia Epoce ściśle, przykładsnie dochowanych prawideł tak moralnych iako i fizycznych.

Też same działania napastowane przyczynami chorobliwemi żywiey się przedstawia iakoż dostrzegamy biciów serca mocniejszy, toż samo uczuwać się daie w tętnach czyli pulsacyach że bywaią pośpieszniejsze, tętsze, czer-



ność twarzy powiększona, tchnienie bywa prędsze i t. d:

Cała rubryka chorób wtym stanie związanych nazywać zwykliśmi (morbi hyperstenici) czyli chorobami powiększonej siły żywotnej, a temi np: bywają febry zapalne, biegunki, katary, kaszle, głowy bóle i t. p: Niewątpliwie wszyskie pokarmy zazyznające, rozgrzewające, napoje téżże natury, są nieprzyjaźnemi w stanie zdrowia, są nie równie szkodliwszemi w chorobach, dla tego użycia takowych iak najmocniéj wzbraniać wypada i owszem zbyt kujące téżże siły żywotnej działania poskromniać w pomiernym ograniczeniu utrzymać należy. Szkodzą zatem wina, wszelkie napoje pokarmy zazyznające równie iako i Leki zbyt téż siły żywotne podnoszące ile one są natury drażniący, wyjąwszy tylko przypadek gdyby były przez ciągły process choroby i wszystkie iey zakresy zbyt wyczerpanemi, w ten czas ich daleko pewniéj używać możemy zawsze iednak mieć wzgląd wypada na ich wzniecania i skutkowania.

b). Stan naprzeciwny powyższemu jest z pomniejszoną siłą żywotną, lekarze takowy nazywają (Adynamicznym) (Astenicznym), daie się poznawać nadewszystko przez następujące cechy, że iuż zbywa ciała na dostatecznej ściśliwości, sprężności, iędrności i owszem jest miękkie, wolne, nie ma twarzy tej pełności, czerwoności, nie daie się téż dostrzegać serca bicia, tętnów tak mocne nadto prędko przy pomiernych pracach, chodzie słabieją, wyprowadzone w chorobach zjawiska czyli symptomy nie bywają tak natężonemi iak przy powyższym stanie, np: nie są maiczenia, zrywania się, chęci do ucieczki, bicia, lecz spokojnie leżą chociaż po cichu maiczą. — Dla braku siły żywotnej nie tak w chorobach spiesznie następują przesilenia, a po nich daleko powolój do ozdrowienia powracają. — Napoje, pokarmy w processach chorobliwych daleko silniejsze rozgrzewający natury dzielnie służą równie iako i leki drażniące iak najskuteczniéj w podźwignieniu tych sił niedołężności, iak otwarcie szkodzą chłodzące, muiéj po-



żywne słowem szkodzi to wszystko co przy pierwszym stanie sił; końcem unikania chorób tak też i na ich pokonanie nadmienioném było. Choroby tą częścią zaięte coraz z wyprowadzonemi przez nie zjawiskami należą do niniejszego sił i stanu ich poznawania.

Maią one nayspewniejszą podstawę w dwóch własnościach ciał zwierzęcych to jest w czułości i drażliwości układach, chociaż te maią różne stopnie stanowią jednak z nieodzownych skutkowań nazwisko sił organicznych, a pókąd są w stanie bydź wzbudzonemi i czynnie przez przyiaźne środki utrzymane, pókąd też nazwisko noszą sił żywotnych, uszkodzone zaś, nadwerężone, przedrażnione ieszcze się do niejakiego czasu utrzymuią, wszelako w końcu przetężone nikną powolęj agdy zupełnie tracą swe skutkowania żyć przestaiemy. Wspierane tylko bywaią przez to wszystko co nas bez uszczerbku otacza, żywi, iako to: ciepło, czyste powietrze, zdrowe pokarmy napoje, te to stanowią rubrykę przyiaźnych dla nich bodźców im doskonałey te bywaią w materią odżywną za wpływem dzielnym sił żywotnych przerobione, siły się też w dostateczney energii u-

trzymuią, a czego dowód mamy na pierwszym ich stanie któren pod litt: a. umieściliśmy. Inaczey się wcale ma z siłami żywotnemi pomnieyszoneini, iuż tu w tym stanie równie za ich wpływem takż niedoskonale mnię zyzniące mnię też siły wzmagające następuie pokarmów, posiłków, przerobienie, w ciągu którego wzajemnie też siły odpowiadaią we wszystkich swych skutkowaniach chociaż przy pewnym stopniu zdrowia a tém bardzię przy chorobach lub po ich przestaniu czyli peryodzie do zdrowia powrotu. Nie bez użytku szczupły zbiór dowodów o téj nas prawdzie dostatecznie przekona; nadwątłone siły te bądź to przez troski, żalé, prace fizyczne, moralne, głody, lub też przez gwałtowności chorób, wszakże napoie, pokarmy zyzniące przywracaią takowe i znowu porównaymy zdrowego z choruiącym ciągle, i tam u pierwszych dostrzeżemy skutków doskonałego gospodarstwa zwierzęcego, dostrzegamy też i sił dostatecznych nieodstępność, młodego ze starym kiedy u ostatniego powolęj iak coraz bardziey wątłieie pożywność, która nam wychudnienie ciała, opad sił, zmieyszenie ciepła naturalnego daia poznawać. — Mamy zatém otwarte przy-



klady że co tylko żywi razem i wzmacnia siły i że jedna jest drugiego podstawą i tak się nawzajem rozumie, słowem jest to pasmo wzajemnych, wymuszonych, nieustannych iak koniecznych dla siebie czynów i odczynów.

Na podstawach to dostatecznych sił, umiarkowanym stopniu drażliwości, czułości układów, na utrzymaniu dostatecznym gospodarstwa zwierzęcego, zawisł opór na przeciw szkodliwościom i przemaganie ich skutków, gdyby się z nich zawiązać miał ten lub ów gatunek chorób mających charakter powiększonej czynności sił żywotnych.— Na tychże samych podstawach przy zmniejszonych siłach, przy osłabionym układzie drażliwości i czułości, przy niedostatecznym ciała pożywieniu zawisło zawiązanie się szkodliwości, wyprowadzenie z nich chorób; charakter pomniejszonej czynności sił żywotnych mających, i chorób tym trudniejsze pokonanie iak częste pod niemi uleganie zawisły, takż pokarmy, napoje, ich ilość oznaczona, i dobre wskazanie użyć się mianych środków lekarskich wzmacniających siły tak zewnętrznych iako i wewnętrznych, a że na to wszystko w doradzaniu mieć wzgląd wypada i potrzeba, nie dość przy ukończeniu

tych podstaw mieć pamięć, polecam. Przed przystąpieniem objaśnień przyczyn chorobliwych, iako samych chorób trzymających lub nie w swych napadach porządek, ich zakresy, zaczniemy od poznania przyczyn chorobliwych.

### *Poznanie przyczyn chorób.*

Choroba każda jest skutkiem przyczyny, czyli ta działa w sposób mechaniczny, fizyczny, chemiczny lub moralny, wszelako mieć musi dostateczną zasadę do wyprowadzenia chorobliwego procesu, a który wszechząc się prędzej niemoże pókąd wpływy tej lub owej przyczyny do zawiązania się choroby nie są dostatecznymi, ztąd wystawia nam przyczyna następujące warunki, z tych jest pierwszy:

1. Że jest i być musi zasadą choroby.
2. Że którakolwiek z powyższych przyczyn powinna się okazać iako otwarta szkodliwość.
3. Że każda z tych przyczyn szkodząc pospiesznie lub nie, wszelako oprócz choroby istotnej, jest w stanie zrządzić tylko złe się mienie fizyczne czyli słabowitość i tako-



wą zwykli nazywać lekarze (*Vale-  
tudinem adversam male se ha-  
bere*) (\*).

(\*) Lud pospolity zwykł stan takowy wy-  
rażać cały niemogę, bywa on dość czę-  
sto początkiem czyli wstępem do cho-  
rób wyrzutowych iako to: ospy, odry,  
szkarlatyny, dla tego trzeba się wprzód  
o nie wypytać czyli takowe odbyli lub  
nie wzdarzeniu tym oczekiwać od 3 do 4  
nawięcący dni iakaż w ten czas towa-  
rzyszyć zwykły osłabienie, utrata weso-  
łości, apetytu, nudności, cikliwości, wy-  
mioty bole żołądka, głowy, na przemian-  
ny febra z gorączką, degleliwości sta-  
wów krzyżów, to wszystko coraz wol-  
niecie wkońcu i ustanie z wyrzucaniem  
się tych lub owych krost. — Chcąc zaś  
istotnie to złe mienie się rozróżnić od  
chorób, poznać wypada następujące po-  
między niemi różnice a temi są:

- a. Ze choroby stosownie do swego  
biegu bywają krótko lub długo  
trwające, przeciwnie złe się mienie  
fizyczne czyli słabowitość trwać  
długo nie mogą.
- b. Ze choroby mają swe zakresy a  
tych niedostrzegamy przy złem się  
mieniu, ani przy słabowitości.
- c. Ze niektóre z chorób mają właści-  
we sobie przypadłości (*Sympto-  
mata*) towarzyszące w ich peryodach  
a czego niema słabowitość i złe  
się, mienie.

- 4. Że się może albo całkowicie do cho-  
roby przyczynić lub też i w części  
to jest wyprowadzić charaktery-  
styczną chorobę, albo tylko złe mie-  
nie się.
- 5. Że tym wszystkim warunkom mnięcy  
więcący muszą ciała ludzkie ulegać,  
to iest iasniey mówiąc że iuż mu-  
szą znajdować się w nich pewne  
skłonności czyli usposobienia o któ-  
rych wyżej mówiłem, inaczezy  
wszystkie przyczyny choroby cho-  
ciażby miały zarażające pierwiastki  
skutkować i wyprowadzać chorób  
w żaden sposób nie mogą.

### O trwaniu i biegu chorób.

Choroby zwykły bywać krótkie  
(*morbi breves*) i te nie trwają nad 24  
godzin, tu należą łagodne zbyt katary-

- d. Ze choroby mają swe przesilenia  
(*crisis*) a tych zaś ani przysłabo-  
witości, ani przy złem mieniu się  
niedostrzega.
- e. Ze choroby mają swe właściwe cha-  
raktery i z tych się poznają czyli  
są pojedyncze, złożone, a na tych  
zupełnie nie dostaje złemu się  
mieniu i słabowitości.



czne febry, znowu są choroby niebezpieczne (*m: acuti*) te chociaż krótko trwają jednak przy nich następujące przypadłości, iako to: febra, gorączka, bywają silne, a przy nich i mocne mairaczenia, bóle głowy, suchość ust, ięzyka a czasem i drgania stawów. Jedne z tych chorób dzielą się na najmocniejsze (*m: acutissimi*) a te nie trwają dłużej nad dni 4 dla tego, że wszystkie działania organiczne iako to: płuc, krwi krążenie, bywają zbyt nateżonemi, że wnet ustawać muszą. — *Drugie*, choć są przytomnemi powyższe działania i symptomy nateżone, nie są przecie tak trwałemi częstemi, iak przy powyższych a siły żywotne nie mogą przy nich być tak szybko, tak nagle wyczerpanemi, dla tego one się dość często przy silnéj febrze, gorączce, mairaczeniach nie raz i z bólem miejscowym do dni 7. przedłużają. Do nich należą febry zapalne, iako to: płuc, wątroby, śledziony, żołądka, kiszek, i t. d. nazywają się (*m: peracuti*) bardzo niebezpieczne i znowu na choroby pospolicie niebezpieczne (*aerquisite acuti*) takowemi chorobami są które trwają od 30 do 40 dni przy tych towarzyszyć zwykły febra, gorączka. — Bywają nadto choroby przy których albo trwają przypadłości (*sym-*

*ptoma*) i te na nieiaki czas zupełnie ustają i znowu się powracają; co się nazywa ciągiem czyli biegiem chorób (*Cursus decursus morbi*) a co nadaie różnicę oznaczającą ich trwałość, wolnienie; iedne z tych w różnym stopniu przerywać zwykły process zdrowia, nazywają się ciągłemi (*m: continentes*) i niemi bywają febry tego nazwiska iakoż przy nich zaledwie chorego opuszcza napad febry, tuż przystępuje gorączka, i znowu powraca febryczny napad, lecz ostrzegam że nie daie się dostrzegać przy febrze zimnica, trzęszenie iak przy innych, lecz tylko twardość i spieszność pulsu, tak dalece że przez godzin 24. kilkanaście takowych napadów febry, gorączki odbywa się, kiedy znowu taż febra i gorączka opuszczają, a chorzy się raz lepięy, drugi raz gorzéy mają, takowe febry nazywają się (*Continui remittentes*) to iest ciągłe ale opuszczające. Są znown choroby co albo codzień co 2. 3. lub 4. chorego napadają w pewnych godzinach lub niepewnych, po razu a niekiedy i po dwa, takowe nazywają się febrami przerywanemi (*febres intermittentes*) a im się napad zimnięy ieden od drugiego przedłuża tém się też i zyskuje więcéy czasu do brania zagubiających leków, że



ich nie tak często brać potrzeba, iak częścię gdy bywają od nięj przerwy krótszemi. — Wolny znowu czas od febry i gorączki w którym się chorzy zdrowszemi bydź czują, nazywa się (*tempus intervalum*) czyli czasem przerwy, kiedy zmienia tenże czas porządek i bieg napadów się kończy a choroba zaś nie ustaie, i napad nowy przystępuje ten się nazywa (*Paroxismus circuitus*) kiedy znowu po febry napadzie opuszcza gorączka nazywa się czas takowy (*tempus appyrexiae*) iak znowu po teyże napad zimnicy (*Paroxysmus febrilis*). Też same febry bywają regularne (*Typici*) lub nieregularne (*atypici anomali*) i znowu mogą czas ich uprzedzać (*Typus anticipans*) iako opóźniać (*Typus postponens*).

Pozostaie nam ieszcze poznać i następujące choroby, tak mamy choroby pór roku a te nas przekonać powinny że towarzyszące tymże porom roku odmiany do nich bywają głównemi przyczynami, a tém pewnięj im szybięj iedne po drugich następują np: na *Wiosnę* albo ciepłe, suche powietrze, albo mgliste, ponure, dżdżyste i chłodne. *W Lato* albo wielkie upały, suche powietrze, lub przez ciągłe deszcze wilgocią nasyczone, albo też przy suchych

upałach dnie, wieczory, nocy, poranki chłodne. — *Pod Jesień* zaś i przez nią albo suche lub wilgotne powietrze a do tego mgliste. — *Zima* znowu nie stósowna do klimatów bezmroźna, niestała, lub téż i przy mrozach silnych. Wszystkie te odmiany nazwać wypada iako bodźce zewnętrzne szkodliwości przy sprzyjających ciał dyspozycyach czyli usposobieniach są razem nieodzownemi do rozmaitych chorób i nieiako do nich nasionami. — Oprócz tego ieszcze nam wyprowadzają choroby, różne okolice, np: bagniste, niskie, wilgotne, lasami, borami otoczone, położenia są tego dowodami, że w okręgu tego lub owego z nadmienionych fizycznych położzeń, w iednéj roku porze lub téż i pozagranicą ich wszczynać się zwykły choroby znaczną liczbę mieszkańców napastujące, takowe iakię one są tylko natury, charakteru nazywają się (*Morbi Pandemici*) czyli chorobami pomiędzy ludźmi panującemi albo grassującemi, i pod tym wzięciem ma się rozumieć że znaczna liczba mieszkańców tych lub owych okolic tym lub owym chorobom ulegać musi, zawsze iednak z tym warunkiem że do nich muszą się w ciałach znajdować przysposobienia. Choroby te chociaż-



by były ziadliwemi lub i łagodnemi, wszelako zostawiają po sobie nieiako zarody, pasiona do powrotu tychże samych chorób a przynajmniej usposobienia łatwe do innych, lecz się to wszystko ściąga do mieszkańców tych lub owych położeń a oddalenie z nich zwykło od ich napadów ochraniać. — Z położeń zatem mniej lub więcej rozległych wynikające choroby nazywają się krajowemi (*Morbi Endemici*) a jeżeli przy tych okolicznościach sprzyja szczególna lubo docieczona byź niemożąca w atmosferze własność, która na wszystkich a przynajmniej na znaczniejszą część ludności różnego wieku, iakię okolicę skutkując, zrządza iędnakowe choroby, a które za zniknięciem powszechnę przyczyny to jest sprzyjającej im atmosfery ustają, nazywają się epidemicznemi (*Morbi Epidemici*), kiedy znowu w swym chorob processie utwarzają jakiś zarazy, czyli iadu uczesnictwo mający pierwiastek i który się innym udzielając rozszerza teyże samey natury choroby, które iędnak do powyższych stanów umieszczonych, mogą byź i łagodniejszymi i zjadliwyszemi mieć lub więcej niebezpiecznemi, nazywać się zwykły epidemiczno - zarażającemi i takowemi

bydź

bydź mogą np: biegunki, dyssenterie, zgnile gorączki. — Mogą byź naostatek choroby tą częścią zajęte i rozproszone mi zwane (*Morbi dispersi*) to jest że tu i owdzie ludzi równego wieku mianowiciey młodego napastują, temi byź mogą febry wyrzutowe iako to: ospa, odra, szkarlatyna, z przypadkowych zaś biegunki, dyssenterye, a nawet appoplexie, paraliże. Pozostaie nam ieszcze poznać tak zwane choroby (*Morbi recidivi*) te powinny byź też same, co były pierwsze, a im ostatnie gwałtowniejsze, przebiegi ich wszystkie, o których się poniżej mówić będzie, odbyły, im więcej siły żywotne w ich zakresach natężonemi, wyczerpanemi zostały, daleko od pierwszych niebezpieczniejsze bywają, i tych się też nader wystrzegać potrzeba, a tém więcej kiedy w niedługim czasie po pierwszych napastują. Niedostatek sił żywotnych w ich pokonaniu zwykły najczęściej na śmierci ofiarę wystawiać, wystrzegać się zatem należy wszelkich wykroczeń w pokarmach, napoiach, gniewach, zaciętości i t. p. chcąc uniknąć tak otwartego niebezpieczeństwa. Poznawszy przyczyny chorób, ich podział dla styczności, materyów, nie bez znacznego użytku poznać nam wypada i następujące:

Część II.

2



### Zakresy chorób.

Pierwszy z nich nazywa się zawiązaniem, utworzeniem, rozwinięciem się, to jednak w żaden sposób bez mniejszej, znaczniejszej w ciele zmiany nastąpić nie może, chociażby tylko miało być przytomne złe się mienie, o którym już wyżej mówiono.

Drugi już jest wstępem wywiązać się mianey choroby (*initium morbi*) w nim nie tylko się przedstawia istotne do téj lub owéj choroby należące zjawiska (*Symptomata*) i które dość często sam charakter iéy dają poznawać, np: kolki, kłócia w tym lub owym boku, uszkodzone tchnienie, trudne, bolesne, kaszel suchy, wyplucia gęstej flegmy z żyłkami krwi, są znamionami płuc zapalonych, ból w okolicach żołądka, znaczne wzniesienie się żywota, że nawet za nader małym iego dotknięciem jest bolesny, wymioty, że czasem czystej wody wstrzymać nie można, silna febra, gorączka, są znakami zapalonego żołądka, utrata zmysłów, oczy bystre, zapalone, silne mairaczenia, bezsenne noci przy silnej gorączce i febrze są znakami zapalonego mózgu.

Trzeci wzrostu, wzmaganie się powiększenie choroby (*augmentum incre*

*mentum morbi*). Przedział ten zwykły się poznawać jedynie przez zwiększenie się symptomatów albo zjawisk, one to są ich skazówką, iakoż ważność tych zjawisk różnice po ukończeniu zakresów poznamy, końcem przekonania się względem postępu ich, iak naprzeciw tymże zaradzenia, gdy tymczasem przez przykłady poznania zakresu trzeciego objaśniemy. — Jeżeli się przy poprzedniczych dwóch zakresach w zapalnych febrach przyłączają silne mairaczenia, zrywania się, chęć do ucieczki, bicia i t. p. są to znaki tego zakresu, równie iak że już choroba w iéy dalszym biegu przerwaną być nie może.

Czwarty Naywyższy stopień, na którym tylko stanąć może choroba, nazywa się (*acme status morbi*) i ten się téż nie tylko przez zwiększenie symptomów wyżej namienionych lecz i przyłączenie się do nich wcale dotąd nie byłych poznawać się zwykły, np: owe mairaczenia dochodzą ledwo nie do szaleństwa, chęć do kłania, niepohamowane złości, nieustanne zrywanie się, nieugaszone pragnienie, gorącość ciała, dodać tu muszę ważną przestrożę, że nie zawsze te symptomy przytoczone dają się w opisaney wielkości dostrzegać, bywają one spokojne wszelako o-



znaczą ten zakres choroby, *np:* przy chorobach z pomniejszoną siłą żywotną pod literą *b.* wyżey się mówiło nadto przy nerwowych gorączkach (*Typhus*) przy zgnilęj febrze, petociowey, chociażby napastowały i stan powiększonéj czynności układu tętnów opisany pod litt: *a.* wszakże i tu przez silne natężone zjawiska w końcu wolnieć muszą.

*Piąty:* Stanowi zmniejszenie się choroby (*declinatio, decrementum morbi*) ten okazie zwolnienie powyżey nadmienionych przypadłości, aby tylko takowe nie razem lecz chorego powoli opuszczały, pierwsze czynią nadzieię ozdrowienia, drugie bywają nader obojętnemi.

*Szósty:* Koniec choroby ustawianie, rozwiązanie się teyże (*Finis, terminatio, indicatio morbi*). Zakres ten poznawać się daie przez opuszczenie, zwolnienie przypadłości, czasu tego zwykła natura używać na podźwignienie sił i uwolnienie się z pierwiastków szkodliwych, iakie się w processie chorobliwym utworzyły, iakoż nie raz przedstawia swój zamiar przez działanie uderzającego iakiego zjawiska *np:* mocne osłabienia, mdłości, kiedy tuż przystępują poty obfite wszędzie po całym ciele równie dość ciepłe, lekkie laxowania

lub inne natury odbyty, takowym w żaden sposób przeszkadzać nie można, nieraz gdy są za słabe powiększyć, iak zbytczne, ostre zmienić, zaś nagle nigdy wstrzymywać. Uderzające zjawiska nazywają się (*perturbationes*) *criticae molimina critica* czyli usiłowania przesilen, a drugie same przesilenia *Crisis*, ieżeli te zmierzają do ozdrowienia, chorzy czują się bydź coraz silniejszymi, przytomniejszymi, powraca tchnienie wolne, regularne, puls miękniejszy, powolniejszy, i coraz do naturalnego się zbliżający, uryna coraz czystsza, opad niknie czerwony, pływa w niej obłoczek (*nubecula*) będąc w poprzednich zakresach czerwoną, mętną, gęstą, mulastą, inaczej się ma, ieżeli zmierzają ku zakończeniu życia, tam są poty nierównie po ciele *np:* mogą bydź na twarzy, czole, piersiach, kiedy ich nie ma po częściach innych, i tak się ma nawzajem tém niebezpiecznięj, kiedy też poty są zimne, kleiste, kiedy laxowania resztę sił z sobą uprowadzają. — Kończyć się nieraz zwykły choroby i bez tych wszystkich przesilen oznaków, chorzy wszelako lubo powoli do zdrowia powracają, nie dla innej przyczyny iak tylko, że pierwiastki chorobliwe w processie chorego



życia działane po zagrzaniu ciała przez drogi wyprowadzające nie zostały uwolnionemi, iakoż zostawiają przez ten sposób ukończone choroby słabowite życie, utworzenie się stwardnień załkówek, guzów zimnych, wrzodów nieraz zrośnięcia stawów, głuchoty i pamięci utraty. — Choroby tak ukończone nazywać się zwykły (*per lises*) Prędzcy iednak chociaż przy zwolnieniu przypadłości pewniejszego ozdowienia spodziewać się, niemożna pokąd wszystkie zjawiska chorobne, a pomiędzy niemi są nader ważne febra, gorączka, osobliwie pod wieczór na dni kilka zupełnie do ozdowienia powracającego nie opuszczają.

*Siołmy i ostatni* jest ozdowienie (*Reconvalescentia*) (*stadium reconvalescentiae*) Po chorobach ieżeli te wszystkie zakresy przeszły nie raz, trwa dłużej iak sama choroba, ustępuje osłabienie tak moralne iako i fizyczne, powraca apetyt niedosycony, ale właśnie wtenczas powracający do zdrowia sam na siebie nader baczny być powinien, aby się wstrzymywał od użycia pokarmow niestrawnych, a nawet i strawnych do sytości nie używać, takowe w szczupłej ilości przyjmować, używać napoiów rozgrzewających pomiernie,

wystrzegać się gniewu, zaziębień, a co tem więcej zachować powiniem, sam lub od pilnujących osób im więcej sił żywotnych w 4 i 5 zakresach utracił, i co ma służyć dla przestrogi, aby w uchybieniu którego z tych upominków, nader łatwo powrócić może do tój samej, którą odbył chorobę, lub téż i innej nabydź.

### Objaśnienie zjawisk przypadłości czyli Symptomów.

Z liczby ich znaczne nayważniejsze do naszego zamiaru umieścimy, poznawszy wprzód co one znaczą w chorobach, a iak w każdej prawie chorobie nawet w złem się mieniu fizycznem przytomnem przedstawiać się lub choremu uczuwać się dające, a przy usilowaniu natury wyprowadzone wypadki (*Symptoma*) nazywamy. Są one nieodstępniemi chorób towarzyszkami, iakoż gdzie nie masz choroby i złego się mienia, tam się téż nie da ią dostrzegać ani żadna ich cecha. Iedne z nich są przytomniemi chorobom w pewnym lecz nierównym zawsze stopniu, i to tylko przez nieiaki ciąg czasu, takimi nazywamy (*Symptomata*



*continua*) i tych mamy dowody przy wyrzutach ospy, odry, szkarlatyny, na febrze i gorączce, a z bólem miescowym przy zapaleniach któregośkolwiek trzewia. — Są znowu i czasowe (*Symptomata temporaria*) te są dwoiakięj natury, iedne z nich przedstawiają się na samym chorób początku, i uważać te należy nieiako za posilkowe zjawiska, iakoż na dni 23 już przystępują, tych znowu mamy dowody np: konwulsye, ekliwość, nudność, wymioty, utrata apetytu, bóle głowy, przed krost wyżęj wspomnionych wyrzutów. Drugię z nich późnięj zwykły przystępować, nazywamy te (*Epiphenomena*) i temi bydź mogą nadmienione wyżęj przypadłości, które dość często uważać można iako zjawiska odbytych już chorób, czyli raczęj w nieiakiim stopniu ich trwania czyli ustawiania. — Są wprawdzie ważnemi te przypadłości, ażeby przy napadzie ich wypytać się, czyli doznające osoby odbyły lub nie powyższe choroby wyrzutowe, ostrożnie zatem w zaradzeniu postąpić wypada, żeby w niczem usiłowań natury nie uszkadzać, wszakże zwykły same ustępować za nastąpieniem tych lub owych krost w coraz lepszym wyrzucaniu. Są

znowu oprócz nazwisk nadmienionych inne, które towarzyszyć zwykły niektórym tylko chorobom, te nazywają się znamionami istotnemi, nieodstępnemi, koniecznemi, (*Symptomata Essentialia, necessaria*) a iezeli niezawodnie cechy bytności iakięj choroby oznaczają, noszą nazwiska (*Signa Symptomata Pathognomonica*) np: puls twardy, częsty, tchnienie gorące, febra, gorączka, kłócia w tym lub owym boku, są znakami zaiętych płuc zapaleniem.

Z ważności tych Symptomów wnosić możemy o ich użytku w zaradzeniu domowém, lecz nam ieszcze poznać wypada skutkowania, które wyprowadzają w różnicach budowy organicznęj, gdy tymże równie odpowiadać zwykły charakterzy chorób. Otrzymały więc ze skutków iakie w chorobach wprowadzają swoje nazwiska.

### Skutkowania przypadłości.

Jedne z nich nazywają się czynne, posilkujące, dopomagające, (*Symptoma activa, auxiliaria*, albo *molimina naturae*) są one prawie niezaprzeczonemi ieszcze w stanie działać mogącęj



natury usiłowaniami, a to przez ową siłę żywotną, o której się wyżej mówiło, ile są zatem umiarkowanemi, są też i w stanie przywrócenia zdrowia, tem więcéy że są wróżbą na doświadczeniach opartą przesilen (crisis) chorób. Symptomy téy natury t: i: posiłkujące są prawie własnością stanu powiększonéy czynności układu tętnów (*systema arteriosum*).

Drugie nazywamy bierne (*passiva*) zwykły towarzyszyć stanowi w chorobach z pomniejszoną siłą żywotną pod b. umieszczoną, iakoż pierwsze dzielniey, pospieszniey, prędszy przystępują i skutkują, kiedy drugie powoli, mniey czynnie wszelako i te się do ozdrowienia przykładają.

W drodze postępowań doradczych na te skutkowania nie bez znacznego użytku wzgląd mieć potrzeba, tém więcéy że nader często zwykły się dołączać w różnych częściach ciała np: do głowy, płuc, żywota nadgromadzenia (*congestio*) krwi innych soków, nadgromadzenia te tak czynnych iako i biernych noszą nazwiska, a co się dotyczy tych skutków następującą przestrogę umieszczam:

Nigdy skutkowaniom przypadłości ile są one umiarkowanemi nie zaś zby-

tkującemi nie przeszkadzać, iak drugie zupełnie nie wstrzymywać, lecz tylko poskramniać należy: Przykłady lepiéy nas o tém objaśnia. Przy febrach zapalnych z powiększoną czynnością tętnów, przyłączając się zwykły nagromadzenia krwi do głowy, a przy nim głowy bóle silne, czasem szum, pisk w uszach, mialaczenia, swędzenie w nosie, a nastąpione z niego krwi płynienia, nader skutecznie znosić te przypadłości daleko skuteczniey niżeli sztuczne krwi upuszczania, i w tém to zdarzeniu w ten czas tylko wstrzymać należy, gdyby płynienie za sobą osłabienie spowodowało. Też same z nosa krwi płynienia nieraz poprzedzać zwykły znaczne serca bicia, i te wnet wolnieją, po nastąpionym złéy części ciała krwi odpływie, toż samo dzieć się zwykło przy zapaleniach kiszek, wszakże to płynienie nieiako chemoroidyczne znacznie się do zmniejszenia iego przykłada. Tak swędzenie skóry, iéy palenie a nawet i czerwoność przez poty nastąpione znoszonymi bywają.— Gdzie znowu te przypadłości są nieiaka wróżbą a nieraz dają poznać, że nie mogą dostatecznie tych lub owych zamiarów wyprowadzić, a czego mieć możemy zdarzenia na skórze wilgotnéy nieco



wszelako zapoconey, na chceniach do stolca, na ich odbyty, tam więc pomagac wypada.

### Zamiary wypróżnień.

Co tylko z pokarmów wyciągnęły rozmaite działania na użytek gospodarstwa zwierzęcego, resztę już jako nieużyteczne pozbywają się po zagranice ciała przez wszystkie drogi na to przeznaczone a gdy są wstrzymane stają się szkodliwościami, i wyprowadzają albo tylko złe się mienie lub nawet i same choroby. — Krótkie objaśnienie nad potrzebne dokładnię nas o tém objaśni. — Są one trojakię natury, albo niewidoczne, i tym iest przeziw tego nazwiska (*transpiratio insensibilis*) odbywa się on ciągle po całym organie skóry, a uszkodzony nadwercza stan zdrowia, i ten dość często zmienia się w chorobliwy, tego mamy dowody bez wiedzy naszej na reumatyzmach, do których niekoniecznie same uszkodzone poty mogą być przyczyną; powiększenie kropliste przeziwu nazywami potami, tu nawet wliczyć można i oddychanie, przez które również zdrowiu szkodliwości uwalniają się. —

Drugię natury są same ciekłości, tu należą ślina, uryna. Trzecię są stałe, t. i: uwolnienie stolca, i te tylko to wypróżnienia, czyli odbyty w chorobach, należą do krytycznych przesilen, to iest pomagających do ozdrowienia, nie mają być w żaden sposób uszkodzone, i być mogą symptomatycznymi, ale w ten czas zmierzają do skrócenia życia, ponieważ uprowadzają z sobą pierwiastki użyźniające, a przez co też i siła żywotna coraz wędli, a w końcu zupełnie ustaie. Oprócz chorób przy których nie można o tych zamiarach wypróżnień w żaden sposób zapomnieć, i owszem o ich utrzymanie stosownie do poniższych zasad starać się iest obowiązkiem ratującego, przekonać się możemy z codziennych prawie doświadczeń, że wstrzymanie stolca zrzędza głowy bóle, ię zawroty, gorączkę, torsie, nudności, utracenie apetytu, wymioty, i wszystkie cierpienia, znoszą enemy.

### Zasady.

Wypytać się czyli podług porządku od natury oznaczonego w dzień raz, dwa lub więcéy, u niektórych zdarza się co drugi, a nieraz i co trzeci przy



zupełney zdrowości stolec odbywali, tenże sam porządek przy chorobach zachować wypada, wyjąwszy gdyby się przedstawiały cierpienia, które się wyżej z przyczyn wstrzymania jego umieściły. Przeciwnie się ma, gdy częste stolce i do tego wodniste chorego osłabiające, tam znowu o wstrzymanie starać się należy, i tu służą enemy z kroczału, i środki umieszczone przy biegunkach, zawsze iednak mieć baczność potrzeba, aby ich nie dawać w czasie pocenia się, przez to można znacznie uszkodzić choremu przez wstrzymanie ich. Potrzebne ku temu narzędzie powinny się po domach, dworach ustronnych znajdować, należy i to do ważnych przysług na ratowanie bliźnich, a koszt porównanym nie jest naprzeciw owych trunków, które nieraz stają się do chorób a nawet i do końca życia samego przyczynami. *Poty*: Nie masz tu mowy o symptomatycznych to jest: zmierzających do powiększenia choroby, wyniszczenia siły żywotney i samego życia ukończenia, ale tylko istotnie o krytycznych, ile się takowe dziwnie do ozdrowienia przykładają, z tego względu są pomagającemi, lecz powinny być równie po całym ciele, częstkowe zaś nie zapewniają tego sku-

tku. Gdzie, zaś od początku choroby, nieraz upartość ię przepowiadają, iak znowu przy ukończeniu się ich są silnie pomagającemi. — Dostrzegać się nadto nieraz daie, że są tylko skłonności do nich lub i same lekkie poty przedstawiają się, w tenczas o pomnożenie ich przez bżowy kwiat, miękkiew, melisę, herbatę, zwolnione starać się wypada, wszelako nie wymuszać ich przez ogrzewającą pościel lub też gorącą izbę, ani też w tęg parze długo utrzymywać, słowem cale to dzieło naturze zostawić, przestrzegając tylko zaziębienia. *Mocz* czyli *Uryna* czerwoność, mętność, mulastość, osad iak cegła tarta, cuchnąca, niewyczayny odpływ ię, dostateczny, należą takż do oznaków przesilen, ile się takowe zmiany ię przedstawiają, są tylko skutkiem chorobliwych działań dróg urynowych spółnictwo powszechne z innemi naczyniami ciała mających. Ubywające te ię odmiany co do czerwonego koloru, mętności, mulastości, gęstości, i powrotu do złotawego przezroczystego, są dostatecznemi oznakami, że tychże dróg urynowych działania powracają z chorobliwych do przynależnych czyli zdrowych, takowe ię odpływy przez napoie często a nie w znaczney na raz ilo-



ści użyte mocno wspierają spływ pierwiastków chorobliwych w processie życia cierpiącego przysposobionych. — Gdyby się jednak zdarzył przypadek, że taż uryna jest przezroczystą iak woda, do tego bez naturalnéj woni a wszelako w żnaczney ilości odpływa, to oznacza, że ieszcze w kurczowym stanie zostaią naczynia i drogi urynowe. Mocz takowy nie można policzyć do przesileni choroby, chociażby w żnaczney ilości odpływał, na zniesienie takowych kurczów naczyni picie rumiankowego kwiatu znosi i usmierza ie. Żądać iednak nie można, aby odpływ moczu miał się przedstawiać przy obfitości potów, zwykły daleko szczuplejszy odpływać, żądać zatém, a témbardziej zmuszać naturę do téj podwójnéj czynności, byłoby nie małém uszkodzeniem, przestrzegam:

*Ślina* ile razy się ta trafia przy stanie zapaleń części w wydrążeniu ust leżących, i około podniebienia gruczołków ślinnych gardła, odpływ iéy pókąd iest wodnisty, iest skutkiem zdrążnionych części, przychodzący zaś do swéy pienistości, gęstości, białości, z łatwém do tego odeysciem, iest takóż wypróżnieniem pomagajacém równie w tych cierpieniach, iakoż wstrzymanie iéy.

iéy odpływu pogorszać zwykło takowe, a co znownu potwierdza, że słuszenie należy iéy cieczy mydlastéj natury odpływ do liczby wypróżniać równie iako i ostatni.

*Flegma z nosa.* Puszczanie się teyże dostrzegamy i iak wodę przezroczystą w skutku drażnień błony nosowéj, lecz ta bynajmniéj nie należy do zamiarów wypróżnień, w tym zaś użytku bydz powinna gęstą i z łatwością wydaną w dostateczney ilości, a ile bywa wstrzymaną, pomnaża przy febrach katarycznych bole głowy, pisk w uszach, sapki, głos nawet zmienia, i te przypadłości iako i wiele innych znosi iéy się przywrócenie. — Przedstawwszy znaczenie, naturę symptomatów wraz z ich, iakie wyprowadzają, lub oznaczają zamiary, otwarte użytki a nawet przeświadczenia niemniéj i wskazania środków użycia, łatwo się czytelnik przekona, że pracownik pisma tego miał na celu umieścić w krótkości dostateczney to wszystko, co tylko do radzenie pewnieyszém uczynić powinno; bez tych znaomości równieby nie pewności, a nawet i szkodzeniu pracę swoię iak inne rodzaju pisma tego przeznaczył.

Część II.

3



Pozostaie jeszcze do tych koniecznych wiadomości poznać też dotyczące się ciał ludzkich budowy rzutem oka poznawać się w swych różnicach dające, i o tém tu początki części téj obszerniey zawiadomią, to tylko dotknę, że lekarze zwykli stany te nazywać konstytucjami, lubo do istotnych charakterystycznych chorób nie mogą być policzonemi, uważać iednak takowe należy, iako choroby zdrowych, czyli iasniey mówiąc środkiem pomiędzy processami zdrowia a chorobliwym. Noszą one iednak zarody, nasiona, do właściwych sobie chorób, których rozwijania się pospieszniejsze, przedłużone, lub iak się daleko rzadziey zdarza, i zupełne ich wstrzymanie dostrzeganiem bywa, iakoż te niepoślednie dobrodzieystwa pomiędzy inne środki naydzielniey zapewniają ściśle dyetetycznych przepisów dochowanie, na poparcie téj niemylnéj prawdy, w dowód używam Gallena doświadczenia, iakoż mąż ten niewygastéy w swych pismach pamięci otwarcie mówi, że przez środki dyetetyczne, do których liczy i odmianę klimatów, wstrzemięźliwość, poruszenie ciała, spoczynek przynależny, picia serwatek, wód zdrowych, nader trudne w leczeniu choro-

by, któremi są dziś tak zagęszczone nerwowe, iako to: kurczowe cierpienia, konwulsye, hysteryczne i hypokondryczne przewycięzał, a czego nie mógł bez dyety przy użyciu naydzielniejszych leków dokazać, dla tego też i dalej mówi, że nie ma sztuka lekarska skuteczniejszych w skarbie swym środków nad tu wymienione. Z tego tak wielkiego użytku przy każdéy z konstytucyów położyłem stósowną dyetę wraz z lekami, i te znajdzie czytelnik na swem mieyscu. Nie uznając zaś potrzeby i to z ważnych przyczyn wliczbę chorób tą częścią zajętych wdawać się w choroby długie (*Chronici*), zostawiając takowe znawcom, do leczenia zaś opisanych zamorskie, kosztowne lekarstwa, bez których się tylko obejść można, pominąłem, a na ich mieyscu kraiove umieściłem, i z nich też i apteczkę domową z szczupłych, ile się tylko dało, urządzić poiedynczych lekarstw złożoną, umieścić starałem się.

Nie mogłem takóž przepomnieć i o podaniu środków, przez któreby się ochronić mogli od zarażenia otaczające chore osoby, w tym więc zamiarze uczynilem wstęp do téj części, i tam też czytelnik znajdzie potrzebne ku temu przestrogi.



---

## ROZDZIAŁEK PIERWSZY.

### Instrukcyja dla Osób pilnujących chorych.

W części pierwszej, rozdziałku pierwszym a częstej drugiey, radzie dwunastey, co do ciężarnych, ile się te około chorych mianowicie iakową własność zarazy mających wystrzegać powinny, chcąc, aby same na niebezpieczeństwo, życie swe i płodu nie wystawiały, i tamże pod literami potrzebne ku temu warunki podane zostały. — Sama zatym słuszość wymaga, pilnujących osób chorych od napadów tych lub owych chorób przez pewne przepisy zabezpieczyć, iakoż ta dla bliźnich posługa jest prawdziwie zarazem i służbą Bożą, ale ją rozróżnić potrzeba od zwiedzin chorego mniej potrzebnych, przy których, iak się często zdarza, niepotrzebna gadanka chorym potrzebującym duszy i ciała spokoyności, spoczynku tym bardziej im jest słabszym, a przez nieustanne pytania, więcej sił tak dla niego ocenionemi byź nie mogących utracą, przez co się stan chorobliwy po-



gorsza, a tym bardziéj, kiedy przez nieostrożność zwiedzających osób wyga-  
dują o śmierci czyiéj, lub iakowych smut-  
nych wypadkach, albo się téż i dziwią,  
że tak długo choruje, że wychudł, że  
zmizerniał i t. p.

Niepotrzebne iak nader szkodliwe-  
mi stać się mogące takowe zwiedziny,  
i z tych tu nadmienionych prawd, ie-  
szcze dość często choremu robią przy-  
krości, czasem i szkodzą, że tenże z  
potrzebą lub oddaniem wiatrów wstrzy-  
mać się musi, co się dość często zda-  
rza przy wstydlivych chorych, oni za-  
tym nie potrzebują wiele około siebie  
gości, ale raczéj posługi nieodbicie po-  
trzebny, a rady gościnney, oprócz do-  
świadczanego lekarza, równie takóž  
nie potrzebują. — Byłoby dogodną rze-  
czą, aby osoby podejmujące się pilno-  
wania chorych miały dostateczną in-  
strukcyą, iakie dla nich niemaléy są  
wartości obowiązki, a te ia w krótkości  
zebrać postanowiłem.

*Nayprzód:* Powinny byđź na przy-  
krości chorego nader wyrozumiałemi,  
powolnemi, i złością się niewodzić. —  
Wzruszenia takowe przysposabiają ich  
nader do uczestnictwa choroby.

*Powtóre:* Nie powinny z chorym  
w żadne sprzeczki wchodzić, i owszem

dogadzać choremu, w czémby zaś nie-  
dogodność upatrywały, z łagodnością i  
cierpliwością przekładać o tém kre-  
wnym lub przyiacielom donosić, lub  
do ich przybycia chorego w jego żąda-  
niach odwlec.

*Potrzecie:* Wystrzegać się przy cho-  
rych wyiawiać swoje domowe przy-  
krości, zdarzenia śmierci, dzieci, lub  
tym podobne, ponieważ takowe opo-  
wiadania rozczulaią chorych, i do alte-  
racyów, gorączek, znacznie się przy-  
czyniają.

*Poczwarte:* W chorych ile możno-  
ści nadzieie ozdrowienia wpaiać, przez  
opowiadania, że w podobneyże choro-  
bie licznych doglądały, i że zupełnego  
teraz zdrowia używają.

*Popiąte:* Nigdy smutnéj miny nie  
okazywać, ani wzdychać, a tém bar-  
dziej z otartemi od łzów powiekami do  
nich się nie zbliżać.

*Poszóste:* Zachęcać chorego do bra-  
nia regularnego podług przepisu le-  
karstw, iako i lekarza zleceń iak nay-  
ściśléj dopełniać, nic z siebie nie czy-  
nić bardziéj, iak się to często zdarza,  
ulegać chorego szkodliwym dla niego  
żądaniom.



*Posiódme:* Żadnych posiłków i pokarmów oprócz dozwolonych a nawet nad ilość ich nie podawać.

*Poóśme:* Czystość wszelką około chorego raz wraz utrzymywać, nie dać stolcom około niego zostawać, też samę czystość około siebie zachować powinny.

*Podziwiate:* Smutne wypadki dotyczące się chorego nader roztropnie i to nie razem donosić, lecz zwolna do wiedzy tychże przysposabiać.

*Podziesiate:* Bynajmniej nie poddawać się trunkom, aby iakowego błędu w dawaniu nad potrzebnych ilości lekarstw, lub ich częstego nad przepis dawania nie popelnić.

*Poiedynaste:* Nie bydź ospałą i owszem czynną, przyzwolicie się przy łóżku chorego zachować, i powietrza około niego nie zanieczyszczać, w czasie zaś pocenia okrywać, aby się nie zaziębił, a co osobliwie przestrzegać mają w czasach chłodnych, nie dawać w te czasy zimnego napoju, enemów.

*Podwinnaste:* Jeżeliby wypadła potrzeba w słabości znaczney dawać choru lekarstwa, kiedy tenże spi, należy iak nayspowolniey chorego przebudzać.

*Potrzynaste:* Mieć uwagę na wszelkie odmiany choroby, sen spokojny

lub nie, czyli maiaćzy i iak cicho, ciągle lub kiedy niekiedy.

*Poczternaste:* Nie wszystkich do chorego wpuszczać, lecz wprzód wypytać się kto, z iakim interessem, znajomi, przyjaciele, i o tém pierwey krewnych lub w niebytności ich chorego, wypytać się, czyli dozwoli lub nie do siebie przyysć.

*Popiętnaste:* Nie dać lekom w cieple stać, aby nie kwaśniały, a naczynia do ich dawania w wielkiey czystości utrzymywane bydź powinny, równie uważać, czy lekarstwa przez stoienie zmienionemi nie zostały w swym kolorze, zapachu, smaku, dla tey to ostrożności bez ohrzydzenia od początku ich dawania kosztować powinny.

*Poszesnaste:* Czyli naczynie przez dawanie leków nie bywa zmienioném *np:* łyszka srebrna czyli nie śniedzieie, takowe lepiéy iest dawać w szklanych, fajansowych, lub porcelanowych naczyniach, srebrną zaś łżykę zaraz wypada wymyć i wyczyścić.

*Posiedmnaste:* Wypytać się mają, czyli lekarstwa nie mają w sobie kwasów roślinnych, kruszczowych, lub czyli do napojów dla chorego nie wchodzi, aby ich w żadnym innym nie trzymać metaliczném lecz tylko w szklaném naczyniu.



*Poośmnaste:* Przy chorych na silne gorączki, maligny, nigdy nie trzymać noży, widelców, nożyczek, lub szklanych naczyń, aby sobie lub komu innemu przez takowe nie szkodzili.

*Podziwiewnaste:* Jeżeli maiaż zalecono, aby stolce lub urynę w naczyniu do widzenia lekarza zachowywały, takowe należy z daleka od chorego utrzymować, i chorym osobiście uryny nie pokazywać, aby się ięć mętami nie przerażali.

Te są więc warunki, które za ważniejsze do umieszczenia uznałem, a co się dotyczy diety dla tych osób, jeżeli chory nie ma żadney choroby zaraźliwey, iako to: petociów, zgnitęy febry, iak najmniej mięs świeżych używać powinny, rosoly zaś na wpół z barszczem burakowym zaczynianym kaszą, i ogrodowin używać powinny, wyjąwszy chorób tych przy zwykłej dyecie pozostać, a nawet wódki lub wina po niewielkim kieliszku używać powinny.

---

## CZĄSTKA PIERWSZA.

*Krótki rys charakterystycznego konstytucyów poznawania, w zastósowaniu dyet, wyborze leków, o użytku i wskazaniu w przebiegach chorób aż do zupełnego ozdrowienia.*

### WSTĘP.

Lubo w ogóle ciał ludzkich kształcie, porządku części, zupełne upatrniemy ich podobieństwo, zwracając iednak uwagę na własności, któremi są udarowane, to iest: na różność stopni, drażliwości i czułości, gdy na te nieodstępnie skutkuią wszystkie wpływy, co je otaczaia, czym żyia, czym w niemocy napadach ratowanemi bywaią, tudzież na doskonałą, lub innę doskonałą pierwiastków mieszaninę, z których się téż ciała składaią, a czego mamy dowody pod widok podpadaia ce na temperamentach czyli konstytucjach krwistych, przy których upatrniemy czerwoność i pełność twarzy, ściesliwość i iędrność ciała, podostatek sił, wszystkie są to skutki doskonałej pożywności, gdy na przeciwnym



flegmatycznym bladość twarzy, obwisłość, obrznięcie ięć, miętkość i wężność ciała, szczupłość sił.

Przytoczone tu dwie różniące się od siebie konstytucye, których dalszy opis dokładnięć poznamy służyć nam powinny za skazówkę do podziału i charakteru chorób, do wyboru na przeciwnym leków, ażebyśmy śmieley, pewnięć działać byli w stanie, a co się na wstępie obszernięć podało.

Powszechnie różnice konstytucyów zasadzają się, albo na zewnętrznych odmiannach, albo na wadach, którym zwykli niektórzy z ludzi podlegać, a tak dzielą:

- a). Na konstytucyą mocną, tęgą, czyli z podwyższeniem siły żywotnęć.
- b). Na rozwolnioną, słabowitą, delikatną.
- c). Na nerwową, czyli uległą nerwowym cierpieniom.
- d). Na drażliwą.
- e). Na nieczulą.
- f). Na uległą do wstrzymania stolca.
- g). Na skłoną do łatwych laxowań.
- h). Na żółciową czyli skłoną nader do gniewu. i t. d.
- i). Na flegmatyczną czyli z pomniejszeniem siły żywotnęć.
- k). Na skropuliczną.

l). Na skorbutyczną.

m). Na skłoną do wiatrów.

n). Na krwi pełną.

Poznania te przejdziemy w krótkości, przy każdęć zaś z konstytucyów umieścimy dyety, trzymając się zdania wielkiego niegdys w Hali Profesora Hoffmana, który mówi: że lekarz, który powinien starać się o utrzymanie sił leczących natury, ma najczęściej w pomoc czynności swoich używać pojedynczych i łagodnych środków dyetetycznych, niżeli skutecznych i pomieszanych leków znajdujących się w aptekach.

Ta myśl wielkiego ówczasowego lekarza przekona nas o rzetelnęć prawdziwem w niniejszęć częśc.

### *Konstytucya mocna.*

#### *Charakter ięć.*

Różni się od innych, że ma mięsne części tęgie, grube, mocne, że puls jest mocny, pełny, że nerwy wpływom zewnętrznym dość mocny opór czynią, że krew nieuszkodzenie wszęćdzie przekręza, sama jest dość gęsta, w ogólności zaś z samego spoy-



rzenia twarz zdrowa, pełna, lice rumiane, a siły w stanie się znajdują, bez znacznego oporu skutecznie różną czynności.

### Dyeta.

Nie potrzebuje ona diety mięsnej, której ilość odpowiadająca roślinnym pokarmom jest dogodna w połowie z mięsną, iakoż takowa dostatecznie siły pokrzepia, iak nie dopuszcza zagęśnienia krwi i iey mnożenia, nadto nie zaostrza krwi, ani cieków lipkich. Szkodliwą jest przy nię użyte mącznych tym bardzię gruby kley posiadających korzeni iako to kartofli, a z mącznych, które żadnego robienia czyli kiśnienia nie przeszły, równie są szkodliwe trunki zyzniące i rozgrzewające iako to: piwa dubeltowe, porter angielski, wódka, arak, poncz, wina, osobliwie słodkiey natury, a naylepię służą lekkie piwa, woda czy sta za napóy, nie są równie i pomocne czekolada, kawa zbyt tęga, iak szkodliwe nader potraw korzenne przyprawy.

Po przestálych iednak chorobach np: febrach zimnych przerywanych,

długo trwałych, gorączkowych z niestrawności pochodzących, biegunkach, laxowaniach, i t. p. służą powyżę w użytku codziennym wzbronione pomiernie brane lepię i skutecznię pomagają nawet lekom, w tenczas to dopiero swą dzielność w przywróceniu sił tyle się skutecznymi okazują, ile przy zdrowiu stają się otwartemi szkodliwościami i najczęstszymi do chorób przyczynami. Tu służą rosół wołowy, cielęcy, niełuste iednak ani korzenne, same po filiżance razy kilka na dzień, lub w pół z klejami z kaszy ięczmiennę, owsianę, owoce gotowane, konfitury.

### Wybór leków do teyże konstytucyi.

Uczynić należy wyjątek że po chorobach ciągłych pozostała słabość, do użytku wzmacniających leków przystąpić należy, gdzie służą kozłek (*valeriana*), dzięgiel (*angelica*), ptasia ruta (*fumaria*), piołun (*absinthium*) i czas nieiaki przy nich pozostać, pókąd apetyt i dobra trawność nie powrócą. — W gorączkowych zaś chorobach i zapalających natury przy biegunkach i laxowaniach, katarycznych cierpieniach,



krwi pluciach w zburzeniach iéy, z wielkim skutkiem służą chłodzącéy natury napoje i leki, iako to: serwatka z słodkiego mleka, sztuczne mleka z nasion bani, ogurkowych, migdałów słodkich, z dodatkiem w silniejszych gorączkach nieco saletry czyszczoney, np: do kwarty iedną kwintą, z leków zaś sole nieiakié np: kamień winny, sól Glaubera w proszku na wpół zmięszane, po łyzce od kawy co dwie godziny z wodą dawać. Dla mniejszych gorączek, lemoniada, woda czysta iub salerska, z winami kwasowéy natury iako to: Francuzkiemi, Ryńskimi, a w końcu dobrze służyć mogą dla popółstwa ocet winny mocno kwaśny, miodowy, wodą rozciężzone, barszcz burakowy zaczyniony.

### *Konstytucya słaba delikatna*

#### *Charakter iéy.*

Przy niéy znajduią się mięsne części miękkie, iakoby welniaste, iakoz dla téy własności, czyli szczególnego ciała składu działania téy konstytucyi wraz z siłami zbyt prędko zwykły zmordowaniu podlegac, puls w pra-

wprawdzie iest zaprędkim lecz słabym, a siły nerwów prędko swe osłabienia przy nienatężanych nawet pracach okazują, krwi krążenie bywa powolne, sama zaś krew po iéy upuszczeniu nie zwykła się tak prędko, a do tego i gęsto zsiadać, twarz bywa bladą, iakby chorowitą, słowem: cała postać ciała znajduje się iakby w nieustannéy słabowitości.

#### *Dyeta.*

Tu wypada więcéy mięs używać, wyiawszy wieprzowych, daleko zaś mniej z roślin i warzyw, pieczone mięsiwa służą lepiéy iak gotowane, kasza perłowa, owsiana, ięcznienna, ryż, dzielnie sił dodają. Napoje rozgrzewaiącey natury, potrawy korzenne, w umiarkowanéy ilości używane, a nawet i codziennie są przedziwnemi środkami do utrzymywania ludzi tą konstytucyą udarowanych przy zdrowiu. Wybór z tych napoiów zastosowanym być powinien do każdego możności, a po słabościach w większéy daleko ilości użytymi być mogą dla prędszego sił wzmagania, ile że te nader powoli i opornie powracają.

#### *Część II.*



*Wybór Leków.*

Leki drażniącey natury, iako to: kozłek, dzięgiel, china, cynamon biały, a z gorzkich wyżey przy konstytucyi mocney w czasie osłabienia położone, dzielnie w téy konstytucyi służą.

*Konstytucya Nerwowa.**Charakter icęy.*

Bardzo iest powyższy podobną z wielu względów, ma iednak do tego szczególną własność, że od naymnieyszey przyczyny nader łatwo nerwy wzruszonemi bywają, i że wyprowadzają w różnych częściach ciała, iako to: w twarzy, oczach, rękach, a nawet i nogach, różne nerwowe nienaturalne poruszenia; udarowani tą konstytucyą są bojaźliwi, do rozpaczyskłonni, niewymownie smutni, odmienni w sposobie myślenia, skłonni do różnych kurczowych cierpień, i przebiegających boleści. Przypadłości, których doznają podług różności części od cierpień napastowanych, przybie-

rać zwykły rozmaitego chorób kształtu, uryna zwykła po zagrzanu ciała odpływać blada, nieraz w szczupłéy ilości, podstawszy staie się mętną, w obfitości zaś czysta, iak woda przezroczysta, są nadto skłonnemi do przejęcia w rozmaity stan chorobliwości.

*Dyeta.*

Że w téy konstytucyi dostrzegamy zbyteczney drażliwości, którą można słusznie nazwać chorobliwą, i dla téy to własności, często słabiejącą. Wybór zatym diety powinien być żyzny a naymniey drażliwey czyli wzbu-  
dzającéy natury czynności nerwowe, ku temu zamiarowi służą mięsa wołowe, zwierzyny, drobiu, wyjąwszy kaczek, gęsi, wieprzowin; tym szkodliwiej słone i wędzone; potrawy tłuste, ciasta, które żadnego kiszenia nie przesły, np. francuzkie, torty, paszety, i t. p. Korzeni zaś do potraw w ma-  
łéy ilości brać wypada. Wyjąwszy po-  
silne kaszy mające pierwiastki odży-  
wne, kleykowe, iakoto: ięczmienna, owsiana, manna, ryż dobrze służą; przeciwnie iaglana, grochy i t. p. szko-



dżą. Owoce zaś lepiéy świeże ieżeli nie sprawnią wiatrów, niż suszone, użytemi bydź mogą, aby tylko pierwsze zupełnie były dojrzałe. Z napoiów zaś podług możności, piwa krajowego, likworów, pączu, araku, kawy, herbaty tęgiéy iak najmnieý lub wcale nie używać.

#### *Wybór leków.*

Że przy téy konstytucyi zdarzają się tak bydź nerwy czule, osobliwie przy chorobliwéy nerwów drażliwości, że nawet łagodnie drażniące leki wzruszenia nerwowe zrządząją, a że tego wypadku przed doświadczeniem przewidzieć nie można, lepiéy się zatém uczyni, gdy się z następujących środków w niewielkiéy ilości dawać rozpocznie, wszakże nie dostrzegając ani niespokojności, ani tęsknoty, ani też odęcia żołądka, odbicia, powiększyć ich każdego czasu można w stosunku istotnéy potrzeby.

#### *Leki następujące są:*

China, kora, kwiat rumiankowy, bylica, piżmo, bobrowe stroje; w pro-

szku lub kroplach, kamfora, węglan amonii z oleiem przypalonym, krople białe i t. p.

#### *Konstytucya drażliwa.*

Ciała przy téy konstytucyi znajduią się w pośrednim stanie pomiędzy mocną i słabowitą konstytucyami, a nie mało otrzymuje skłonności nerwowych, iakoż z téy własności tętna i nerwy do szybkiego ściśnienia się są skłonnemi, dla tego też za małym nawet wpływem drażliwych bodźców, czyli takowe z moralnéy lub fizycznéy pochodzą przyczyny, do pomnożeń krwi krążenia, do zarumieniań twarzy, do gniewów, iakoż nader łatwo przy użyciu bądź to napoiów, pokarmów, leków, drażniącey własności bywają wzruszanemi.

#### *Dyeta.*

Jak jest ta konstytucya właśnie środkiem pomiędzy mocną i słabowitą, tak też i dyeta złożoną bydź powinna z trzech części mięsnej, a czwartéy roślinnego wydziału, a co się przy-



nich wyżey podało, służyć powinno za dogodną i odpowiadającą do utrzymania zdrowia przy téj konstytucyi, toż samo rozumieć się ma i o napoiach.

### *Wybór Leków.*

Ten zupełnie jest odpowiadający konstytucyi nerwowéj.

### *Konstytucya nieczuła.*

#### *Charakter icý.*

Naypospoliciéj daie się poznawać, że udarowani tą konstytucyą, z natury są leniwemi, ociężałemi, pokąd nie bywają do rozweselenia doprowadzonymi, wszelako nie są stali iak nader boiaźliwi, skłonni do zatwardzeń i wstrzymania stolca. — Powszechnie krwi krążenie nader powoli odbywa się, ręce i nogi miewają zimne, nadto podlegają bez najmniejszój przyczyny częstym tęschnotom, uczuciom ciężaru w całym ciele, a które na ich umyśle znaczne czynią boiaźni wrażenia.

### *Dyeta.*

Że nie masz żadnéj obawy z użytku drażniącej natury, pokarmów i napoiu, służą zatém nader dzielnie, mięśna dyeta obficiéj nawet iak u powyższych konstytucyów, nieszkodzi nawet i owszem jest zdrowiu odpowiadająca sama zwierzynna, a przeciwnie mniéj użyteczną roślinna, korzenne przyprawy, iako to: pieprz, angielskie ziele, sól, gorczyca, chrzan, nader użyteczne, a z napoiów wszystkie bez wyjątku codziennie pomiernie użyte wielce są skutecznemi.

### *Wybór Leków.*

Tu służą mocno drażniące leki, iako to: kozlek, dzięgiel, korzeń tatarakowy, kuklik goździkowy, biedrzeńiec (*pimpinella*), sól ammoniacka, kuchenna, kwiat tranku górnego, muskatolowy, kamfora, oleie przekroplane, iako to: miętkwi, pieprznój, polnój, cynamonowy, goździkowy. — Z tych tu wymienionych leków w chorobach do użytku wskazanych, iako i po odbytych końcem wzbudzenia siły żywotnéj, w oznaczonój poniżej



ilości dawać można, a to bez obawy, np. na odwar (*decoctum*) z korzeni wzwyż wspomnionych, wziąć łótów dwa, trzy do czterech, lub też samą ilość do moczenia (*infusio*) osobliwie gdzie uniknąć wypada odwaru, aby ulotne bardzo skuteczne cząstki nieuniknęły, co się czynić zwykło przy robieniu nalania z kozłku i dzięglu, wzięwszy wody wrzącej np. uncjów 6. czyli dobrą kwaterkę, moczyć w okrytym naczyniu przez dobre pół godziny, przecedzić, osłodziwszy do upodobania cukrem, na którym napuścić kropel 4. 5. 6. z pomienionych olejków, w braniu dla chorego przyemniejszych, lub na miejsce miksury olejną balsamową (*mixtura oleosa balsamica*) gdy i ta znaydować się będzie w Aptece domowej, z niej wziąć pół drachmy, kropli zaś białych drachmę jedną lub dwie, i dawać po łyżce od iedzenia, co półtorej godziny, a w powiększonej słabości w tymże czasie i po dwie, popić napojem do możności. — Taż sama ilość korzeni, które się gotować powinny bez utraty ulotnych części, np. kwiat tran-ku górnego, korzeń tatarakowy; nalawszy pół kwarty wody, gotować do zostania się połowy, przecedzić, mo-

żna do tego odwaru dodać, albo miksury olejno balsamicznej, lub cukru z olejkami wzwyż wspomnionemi. Użytek tych odwarów, tenże sam i czas, który się oznaczył przy moczeniu.

### Konstytucya Flegmatyczna.

#### Charakter iey.

Ma to właściwego, że ich płuca, żołądek, кишки są zbyt zaflegmione; dla osłabienia narzędzi do trawności przeznaczonych, stolca wstrzymania powszechnie doznają, ogólnie zaś są zimni, nieodstępny prawie kaszlem dręczeni, przez którym znaczną flegmę lub kleistą ciekłość wyrzucają, doznają często krótkiego tchnienia, krążenie krwi nader powoli się odbywa, dla tego też i ich puls bywa słabym, opieszalym, powolnym iak mięsne części (muszkuły) nie są do drażnienia tak łatwego skłonniemi, i lubo zdają się być w ciele, wszelako wyglądają obrzmiali, iakoż ich ręce, nogi, częstemu nabieganiu podlegają.



*Dyeta.*

Przy niéy iak naymniéy używać tłustych pokarmów utrzymujących w sobie nadto podostatek kleiu roślinnego, iako to: kartofli, mącznych potraw osobliwie które żadnego kiszenia nie odbyły, chleba świeżego i t. p. a którego do tego dobrze bydź powinien wypieczonym, roślinne zaś z powodu mydlastéy natury, iako to: marchew, pasternak, pietruszka, brukiew, rzepa, (jeżeli nie ma przytomnéy żołądka słabości) nader dobrze służą. Zmięs zaś oprócz wieprzowych dobrze służą, ale użytek ich bydź powinien z dodatkiem chrzanu, cebuli, musztardy, imbiru, pieprzu, Angielskiego ziela, kwiatu muszkatolowego, galki. Ze wszystkich zaś napoiów mniéy lub więcéy kosztownych, których używanie iest pomocne, naybardziéy są szkodliwe wódki, likwory, arak, poncz gdy gorzkawéy natury, piwa dobrze wyrobione bardzo służą.

*Wybór Leków.*

W téy konstytucyi służą też same, iako i ich użytek, które się przy kon-

stytucyi nieczuléy podały, z tym dodatkiem, że wyciągi (*extracta*) korzenia omanu (*Enula*) wołowego oka (*radicis Taraxaci*) cykoryi, innych gorzkich ziół korzennych, iako to: biedrzeńca, i które są umieszczone w wyborze roślin kraiowych, wzięwszy którego z tych wyciągów, lub też i dobrawszy drugiego podług upodobania, np. pół uncyi lub więcéy z każdego rozpuścić, w sześciu uncjach czyli kwaterce wody, osłodzić cukrem, syropem lub miodem czyszczonym do upodobania, dodać kropli białych 60. 80. do 100. zmieszać i dawać parę razy dniem po łyżce, a gdyby wypadła potrzeba, i po dwie. Co się dotyczy odwarów i moczeń, te w ilości powyższéy co do sposobu robienia ich i wyboru, zostawia się do woli i smaku.

*Konstytucya Krwista.**Charakter iéy.*

Posiadają w téy konstytucyi zdolność lepszego krwi przysposobienia, iak u powyższéy, z wielu względów należących do liczby i klasy drażliwéy



konstytucyi, lecz zbliżają się do silnej i mocnej. — Trawność się doskonała odbywa, a nieraz ich apetyt dochodzi do obżarstwa, skłonniemi są do płynięń krwi z nosa i częstych odbytów natury, do bólów głowy, zawrotów, do ospałości. — Te własności konstytucyi, są skutkiem pełności krwi, którą tak łatwo, przez doskonałą trawność przysposabiają.

### *Dyeta.*

Przy żadnej z konstytucyów powyższych, nie można mniej mięs w wszelkiego gatunku, ani przypraw korzennych używać, iak przy niniejszej, i toż samo się rozumie o użyciu napoiów rozgrzewających, a tym otwarciey szkodliwszemi się stają ich nadużycia. Któż tę konstytucyą jest udarowany, i pragnie zachować się przy zdrowiu, najlepiej uczyni, kiedy używanie mięsa w trzeciej części do roślinnych pokarmów raz na zawsze postanowi, i to na obiad, a na wieczorny posiłek kasze, iakoto: ięczmienną, gryczaną, owsianą, śliwki lub jabłka suszone, równie z dobrym skutkiem służą często używane barszcze, burakowy, zaczynia-

ny cytryną lub octem winnym, malinowym, kwaśnicy z potrawami, iako i szczaw, tak świeży, marynowany, ogurki wzięwszy korniszonów. Napój zaś zwyczajny dla tej konstytucyi jest najzdrowszym woda czysta, piwa lekkie dobrze wyrobione, mniej użytecznym piwa Angielskie, portery, mniej zaś są szkodliwemi kwaskowej natury, iako to: wina Francuzkie, Austriackie, lecz i tych nadużytku wystrzegać się.

### *Wybór Leków.*

Wzięwszy choroby znaczne, iako to: gorączkowe, po których zwykła słabość czasem i dłuższa nad samą chorobę pozostawać, wtenczas tylko wzwyż wspomnionych przy konstytucyi drażliwej podanych używać można; w chorobach zaś gorączkowych, bólach głowy, krwi wzburzeniach, plynieniu Hemoroidów, którym mianowicie podlegają, chłodzącej natury leki najdzielniej służą, iako to: serwatka ze słodkiego mleka, sztuczne mleko z migdałów, nasion ogórków, bani, robione z nieco saletry, lub kremor tartari w wodzie gotowany, aby nie razem



pieć, sól Glauberska w proszku lub w wodzie rozpuszczona, gotowana kwaśnica, sok z niej, woda czysta octem winnym, piwnym, miodowym, do miłej kwaskowatości zaprawna, ocet malinowy z wodą z wielkim skutkiem powinny być używanemi.

### *Konstytucya Żółciowa.*

#### *Charakter iéy.*

Powszechnie przy téy konstytucyi twarzy kolor wydaie nieiaką słabowitość, często czują w ustach smak gorzki, skłonniemi są do częstych zatwardzeń stolca, uryna ich szarawa, z mętem żółtawego koloru, apetytu dobrego nie mają, i któren ich dość często opuszcza. Z powodu obfitości żółci i wydzielania do iéy pęcherza, wstrzymywania tamże długiego, podlegają częstym kolkom, żółciowym biegunkom i wymiotom téż natury.

#### *Dyeta.*

Nic bardziéy przy téy konstytucyi przypadłości towarzyszących po-

mnażać nie może, iak tłuste a tém bardziéy przypalone różnego sposobu robione pokarmy, iako i mączne do tego tłuste. Wszystkich zatem pieczonych mięs wieprzowych, solonych, i olejów, czyli to świeżych tém bardziéy starych, słonin, użytku wystrzegać się potrzeba, dla niepomnożenia żółci i zgęśnienia iéy. — Wybór zatem powinien być na wpół zwierzęcy diety z ogrodowinami, szczególniéy zaś służą częste użytki kwaszonych buraków, kapusty, ogórków, sałat, szczawiu świeżego lub marynowanego, owoców suchych lub przechowanych. — Znać poiów równie są szkodliwemi wódki i te wszystkie, które się przy konstytucyach drażliwéy i krwistéy podały.

#### *Wybór Leków.*

Kamień winny w proszku po łyżce od kawy z wodą lub rosołem razy dwa trzy przez tydzień, lub téż i tenże z wodą gotowany podług sposobu już w téy części wspomnionego, sól kwaśna z niego (*sal essentielle tartari*) sól Glaubera takż po łyżce od kawy razy kilka przez dzień co 3 lub 4 niedziele w wodzie rozpuszczone. Wyciągi extracta



z wołowego oka (*extractum taraxaci*) tenże wyciąg z pyrzu (*extractum graminis*) np: pół uncyi iednego z nich lub po tyleż oboyma, w kwaterce wody rozpuścić, i brać po łyżce od iedzenia raz lub dwa dniami zamieszawszy dobrze wodą popić. Co można do roku po tygodniu biorąc co 2. 3. miesiące używać. Leki te nadmienione iako i przy każdéy z niéy, zatém są zapobiegawcze przeciw chorobom właściwym tymże konstytucyom.

### Konstytucya skłonna do zatwardnien stolca.

#### Charakter icéy.

Niektórzy z ludzi są opatrzeni tą konstytucyą, co pochodzi, że ich cały kanał kiszek nie ma podstatkiem drażliwości do pośpieszniejszego tychże kiszek ruchu utrzymania, aby mógł się pozbyć po z granice ciała znaydujących się w nich nieczystości, ztąd doznają częstych odbić, wiatrów, rozdęcia żołądka, utraty apetytu, kolków wietrznych, a nawet przez zadługo wstrzymany stolec i wymiotów, chociaż przy szczupłym pokarmów użytku.

Dy-

#### Dycta.

W celu ułatwienia pozbycia się i pomnożenia tych nieczystości, wystrzegać się nadewszystko potrzeba, grubych i do strawności trudnych, kleiowych, ziemnych pokarmów, iako to: kartofli, razowego chleba, zwłaszcza przy braku ruchu i pracy umysłowej, a iak z iednéy strony są na ten zamiar służące mydlastéy natury ogrodowiny, iako to: marchew, pasternak, szpinak, zieleniny osobliwie młode, świeże, mleczywa, owoce świeże suszone iako i w całości przechowywane: gdy przeciwnie są szkodliwéy natury wszystkie mączne potrawy, szkodliwsze, które żadnego kiszenia nie przechodziły, sery tak swoyskie iako i cudzoziemskie. Z tych tu wymienionych a sprzyiających odchodowi stolca pokarmów można w połowie używać z potrawami mięsnymi, wszelako wystrzegać się używania tak zwanych serów z nóg wołowych robionych, wszystkich korzennych przypraw — Z napoiów zaś służą piwa mocne dobrze wyrobione, kawa mleczna, palenie tytoniu mierne, aby nie zaraz i dopiero w godzin 4 po obiedzie.



## Wybór Leków.

Rhabarbarum w proszku od 10 do 20 ziarek, równe części kamienia winnego i cukru, na który nakropić kroplę olejku kopru Włoskiego iednę, zmięszać i brać na raz w łyżce wody, dla otrzymania skutku, a podług potrzeby i drugi w godzin 4. po obiedzie, lub krople rhabarbarowe po pół do całej łyżki razy dwa na dzień, pókąd skutek nie nastąpi. Można też i na odmianę wziąć pigulek podług następującego przepisu: wziąć mydła lekarzkiego, gummy gwaiaku, proszku rhabarbarowego, wyciągu z cykoryi, każdego po drachmie, i kazać z tego zrobić pigułki wagi 2. lub 3. pieprzu ziarek, posypać proszkiem cynamonowym, i brać na dzień po 8. 10. do otrzymania skutku, a w potrzebie i raz drugi w godzin cztery po obiedzie. Używać wód gorzkich Seydszyckich po szklance lub dwie co rano, lub na ten zamiar wziąć soli Glaubera łotów 2. 3. do 4. do kwarty ciepłej letniej wody, rozpuścić i pić po filiżance rano na godzin 3 przed obiadem, oczekując skutku, a ten, gdyby pierwszego dnia nie nastąpił, następującego dnia można dwa razy przed obiadem, to jest w godzin

dwie po śniadaniu i w drugie dwie powtórzyć, też ilość popiwszy wodą. Upominam iednak, aby tu wymienionych leków niebrać codziennie, lecz tylko raz najwięcej dwa w tydzień, wszystkie nadmienione zaś ku temu inne leki, iako to: Elixir długiego życia i tak zwane pigułki Amerykańskie, do których Aloes wchodzi, że te skutkią za gwałtownie, przysposabiaią do wzruszeń Hemoroidycznych, krew rozgrzewaią a nadto, mogą się stać przyczyną do biegunek, sprawiedliwie są zakazanemi. — Można także z dobrym skutkiem wziąć oleju lnianego świeżego, lub oliwy przedniej, w niedostatku olejku migdałowego, np. łyżek 3. 4. żółtków ód iay 2. dodając potrochu, dobrze zmięszać, po czem domięszować wody czystej kwaterkę osłodzwszy do upodobania cukrem, dawać co dwie godziny po pół filiżanki, zamieszawszy wprzód dobrze, a w przypadku nie mienia pod ręką, iak się znajdować powinien w aptece domowej, też leki gdzie umieszczone będą, enemów dawanie z oleju lnianego, mydła, masła słonego; z serwatki i w niej gotowanym rumiankiem z dodatkiem kruspek ięczmiennych, a w przypadku upartym stolca wstrzymania,



dać enemę z wody zimnéy trzech części, dolać octu winnego czwartą, takową enemę powtórzyć i raz drugi, gdyby pierwsza nie miała dostatecznie skutkować. Przy téy konstytucyi szczególnie służą kąpiele ciepłéy wody, do któręy rozpuścić mydła łótów 3. 4. tafflowego, i takowych kąpieli razy dwa w tydzień używać, w wannie iednak nie więcéy wody iak poza pępek znajdować się powinno. Równie w przypadkach następujących z téy przyczyny, rozdęcia żywota, odbijania i kolek wietrznych, okładanie żywota rumiankiem w pomoc przybrać należy.

#### *Konstytucya skłonna do biegunek.*

##### *Charakter iéy.*

Z przyczyn drażliwości zwiększonéy tak cienkich, iako i grubych кишек, że nawet przy mało co drażniących pokarmów lub napoiów użyciach, pośpieszniejszy i tak z natury dość szybki ruch kręty tychże кишек następuie, a przy nim nader łatwe częste stolca oddawanie, i przez to szczególnie się charakteryzuie natura téy tu w krótkości opisanéy konstytucyi.

##### *Dyeta.*

Przy niéy nie używać owoców gotowanych, ogrodowin, iako to: szpinaku, marchwi, pasternaku, buraków, kapusty słodkiéy lub kwaśnéy, mleczywa, służą naylepiéy ryż, kasze kleiowe, iako to: owsiana, ięczmienia, mączne potrawy, iako to: kasza iaieczna, kluseczki lane, naleśniki, mięsiwa tak gotowane iako i pieczone, aby nie tłuste, (wyjąwszy wieprzowinę) nadto zdobnym skutkiem dodawać można do wszystkich potraw gałki muskatolowéy, pieprzu lub innych korzeni, a nadewszystko po iedzeniu po dwa ziarek całego pieprzu, osobliwie białego. Za napóy woda z arakiem do iednéy szklanki łyżeczek parę od kawy, lub wino Burgońskie, Reńskie, Bischof, po łyżce kilka razy na dzień, a równie nader dobrze służy i woda czysta, w któręy się ugasi po razy kilka zelazo rozpalone lub gwoździe niezardzewiałe, woda z grzanką, gdy pija osobliwie lekkie, a tém bardziey nie dobrze wystaje, miód, są nader szkodliwemi.



*Wybór Leków.*

Tu służą wzmacniające i rozgrzewające natury leki, iako to: korzeń tatarakowy powyżey wzmiankowanym sposobem robiony, lub w proszku na w pół z cukrem zmiészany, po łyżce od kawy dwa lub trzy razy na dzień z winem Francuzkiem dawany, skórki pomarańczowe i niedoyrzałe pomarańczeki przetłóczane, z czystą wódką przez godzin 36. moczone, np. do uncjów trzy, którego się z nich podoba, to jest: czyli skórek lub pomarańczek, wziąć po kwarcie wody i tyleż wódki, poczem wycisnąć, przez bibułę przepuścić, zachować i dawać po łyżce stołowey na godzinę przed i w 4. po obiedzie, a przynajmniéy raz o tych czasach. Dobrze takż służą miętkiew pieprzna, ogrodowa, polowa, miasto herbaty z winem Francuzkiem lub trochę araku, kory wierzbiny, dębiny, kasztanu dzikiego, np. przetłoczonych łyżek 2. gotować z kwartą wody, do zostania się połowy pokąd jeszcze gorące, dodać garstkę której z miętkwiów wyżey wspomnionych, przykrywszy dobrze naczynie, iak zupełnie przestygnie, precedzić, i brać po łyżce raz lub dwa dniem. Końcem

zapobiegania biegunkowych napadów, można takze i enemów używać z kochmalu, z powyższych korów, dębiny, kasztanu dzikiego, wierzbiny, a nawet i obinywania żywota rano wstawszy w dobrą godzinę zimną wodą lub wódką.

*Konstytucya do wiatrów skłonna.**Charakter iéy.*

Poznaie się, że przez ciepło żołądka i kiszek przy użyciu pokarmów i napoiów, chociażby te mniéy a tém bardziéy wielość powietrza w sobie utrzymujących, w tych to częściach z nich się wydobywa, a nadymając ie uniesienia całego żywota, odbijania, lub odeyscia dołem sprawia, gdy ich częstokroć wstrzymanie przez spazmatyczne ściśnienie kiszek, dokuczające zrządza kolki, krótkie tchnienie a czasem i wymioty, te wnet ustają po odeysciu wiatrów górą lub dołem, wszelako do nowych napadów są usposobione.

*Dyeta.*

Że przy téy konstytucyi iest słabość żołądka i kiszek, przez co leni-



więc odprawnią strawienie pokarmów, że te za pomocą ciepła żołądka, spoczywając dłużej iak zwykle, przy rozkładzie swym znaczną część powietrza z siebie uwalniają, a to rozdyma żołądek, cienkie, grube kiszki, ztąd te odęcia całego żywota w godzin 3. 4. czasem i prędzej lub później po wziętych pokarmach i napoiach następuie: jeżeli toż powietrze wolno górą lub dołem wychodzi, nie wiele przykrości sprawuje, przeciwnie zaś przy ściśnieniach spazmatycznych tych części, które zwykły towarzyszyć, przystępują boleści, kolki wietrzne, silne odoliania, a przy nich nieraz wymioty, ulgę w powyższych cierpieniach sprawujące. Wszystkie te przypadłości iak zwykły też konstytucją charakteryzować, tak równie częste ich napady, nawet i przy niewinném potraw użyciu przystępują, z tego to względu unikać potrzeba potraw roślinnego wydziału, iako to: owoców bądź świeżych lub suszonych, kaszy iaglaney, grochów, marchwi, rzepy, kopru, kminu, i innych ogrodowin, aż do kisionych np. kapusty, buraków, i lubo niektóre z tych artykułów pożywności mniej szkodzą, lub wcale żadnych przykrości nie zrzadzają, tych

więc z doświadczeń ciągłych, a do tego własnych, używać można wszelako w takięj ilości, aby się jeszcze chęć do iedzenia pozostała, częściej jednak bywa, że opisane wyżey pokarmy szkodzą, w tym więc razie użytku ich wcale unikać wypada, i pozostać tylko przy mięsiwach nie tłustych, tak pieczonych, iako i gotowanych, do których cebuli brać nie radzę, wieprzowiny wcale nie używać, z kaszów zaś drobną lub i grubą greczaną, iaiieczną, naleśniki, iaiia miętko gotowane, babki z kaszów, mączne potrawy, aby nie tłuste, iako to: Francuzkie, mleczywa zaś rzadko, i z kaszów, które podostatkiem z siebie powietrza wydają, wcale nie lub rzadko i to w malęj ilości użyte bydź mogą, lecz nigdy przy użyciu mleczyw nie używać, których zaprawa bywa kwasowey natury. Chleb czasem służy lepięj żytni iak pszenney. lecz oba powinny bydź dobrze wypieczone, i nie inaczej iak zaczerstwiałe. Trudno iest i oznaczyć napoie, ponieważ iedne z nich mniej szkodzą iak drugie, w takim więc razie samo doświadczenie w użytku tych lub owych służyć powinno za prawidło, wszelako iak naymniej pić potrzeba przy obiedzie, dla



nienapełnienia żołądka, przez co powstaje wiatrów wydobyć i jego odcieć, gdzie zatem szkodzą piwa szlachecze, a do tego nie dobrze wystaje, gdzie wina kwaśnej natury, użycia likworów, ponczu, araku, kawy z śmietanką, tem bardziey mlecznej, tam wodę czystą z dodatkiem win popularnych i dobrze służących; używać równie iak piwa dubeltowego i portera radzę. Przykre to jest wprowadzić takie położenie; gdy na smakowite potrawy patrzeć tylko wolno, lecz zbawienneyszą rzeczą być od nich wstrzeżliwym i unikać cierpień, które przy tęg dyspozycji im częściej napadają, tem więcey zwykły takowe ustalać, że wkońcu i mnię wiatry sprawujące posilki stają się szkodliwemi, a to jest daleko biedniejszy połozenie.

#### *Wybór Leków.*

Co tylko uśmierza spazmatyczne żołądka i kiszek ściśnienia, co pospiesniejszy ruch kręty tych części zrządza, co ciepło ich pomnaża i wzmacnia, to wszystko dzielnie służy. Na ten więc zamiar pomarańczki suszone, skórki pomarańczowe zbieli oczyszczono-

ne, tatarakowy korzeń, cynamon czerwony lub biały, miętkiew pieprzna, melisa, kwiat rumianku swojskiego, lub Włoskiego, Spiritus nitri dulcis, esencya cynamonowa, bobrowa, mogą być użyte w sposobie wyżej podanym przy konstytucyi nieczulęy, lub innych, które wskazałem w piśmie moim *Wybór roślin krajowych*, miętkiew zaś, melissa i t. p. służyć mogą na herbatę zwykłym sposobem robioną, a co krople po 30. do 40. włyżce wody i z tych ziół lub kwiatów herbatą popić, można w napadzie tych wiatrów co dwie godziny powtarzać, a końcem ich zapobieżeniu na godzinę dobrą przed i w 4. po iedzeniu w tęgże ilości używać. Równie służą nacierania żywota, osobliwie czczym żołądkiem, wstając codziennie flanelą lub miękką chustką czynić, a w przypadku i eneiny wzwyż wspomniane, lub w wyborze roślin podane, w pomoc przybrać podług potrzeby.

#### *Konstytucya Szkorbutyczna.*

##### *Charakter icę.*

Poznać się nadewszystko z znaków następujących, iako to: czarnych



albo czarno-żółtawych plam tu i owdzie po ciele występujących, po miękkości dziąseł, i obwisłości, tak dalece, że za lekkim przyciskiem, łatwo krew sączą, po twarzy bladej, cuchnących oddychaniach, potach. To wszystko jest skutkiem powszechnego części stałych osłabienia, i ich niedostateczną czynność na przyzwoite krwi zmieszanie.

### *Dyeta.*

Osłabienie stałych części, powoli przystępująca skłonność do rozkładu krwi, i iey złego zmieszania, wymaga diety, przez którąby silnie tym wypadkom zapobiedz można, a tém skuteczniey im prędszy rozpoczętą zostanie, zwłaszcza przy odziedziczonym szkorbutcie, a przy nabytym, iak się to dość często zdarza z wielkim skutkiem nie tylko w czasie iego trwania, ale i po przestaniu czas nieiaki przy niey pozostać wypada. Wszystkich za tym mięsiw prócz wieprzowin, z ogrodninami świeżemi, suszonymi, a tym lepiej kwaszonymi używać. Tu więc z ogrodnin wszystko dzielnie służy; a że te są dobrze znanemi, wyliczać ich nie potrzebuie, dodaiąc, że z nich sam

chrzan, musztarda, gorczyca, barszcze, burakowy zaczyniony, gotowane z mięsem, sok berberysowy, dla możnych cytrynowy do potraw brane dzielnie służą, niemniey owoce, iako to, jabłko, gruszki, śliwki, co do pór roku przechowywane w powidłach, lub suszone. Napoje zaś dobrze służą takż kwaskowey natury, do których doliczyć można wodę z octem z kwasem siarczanym rozcieńczoną; sól w wodzie gotowany, dołączyć do niego iółowcu tłuczonego, aby, póki tenże odwar iest gorącym, moczył się do ostygnięcia, przecedzony użytym bydną, dla możnych woda Salcerska, woda czysta z sokiem cytrynowym, wiśniowym, berberysowym, malinowym, z octem, winem Francuzkiem, Reńskim, piwa zamorskie.

### *Wybór Leków.*

Chrzan, gorczyca, moczone w piwie, lub ziola gorzkie, iako to: piołun, ptasia ruta, goryczka (gentianna), korzeń tatarski, dzięgiel, kora wierzbową, kasztana dzikiego, w wodzie moczone, np. wziąć każdego po garści dwie, nalać wódki i wody po



kwarcie, moczyć w naczyniu godzin 36. w ciepłym miejscu, wycisnąć, przez bibułę przepuścić, i pić po łyżce razy 2. 4. w różnych czasach przez dzień. Pod noc z dobrym skutkiem miasto herbaty służy kwiat bzuwy, ciepło użyty dla wzbudzania parowań skóry, z niemałym użyciem przedsiębrać można choć razy dwa w tydzień kąpiele ciepłe, a kto może dodać i wódki np. kwartę, takowe kąpiele mocno dopomagają.

### *Konstytucya Szkrofuliczna.*

#### *Charakter iéy.*

Poznawać się zwykła przez nabrzmiewania ciągłe gruczołków czyli zawalków (*glandulae*) około szyi, pod pachami w pachwinach, w piersiach kobiecych, a nawet i brzusznych (*glandulae mesentericae*), a czasem zajmując płuca, powszechniejsze iak iawniejsze są iéy znaki, grubość warg i nozdrzy, twardość i nadętość żywota, często przebiegające po ciele gorąca, małe febrów napady, pokaśliwania.

#### *Dyeta.*

Nadewszystko szkodzą mączne potrawy, iako to: naleśniki, kluski taklane iako i gniecione, pirogi z serem, chleb świeży, i ten powinien być najlepiej wypieczony, a daleko lepiej służą grzanki z niego miernie opiekane, toż samo ma się rozumieć i o bułkach, choćby te były montowe. Szkodzą także bez wyjątku, wędzone, solone mięsiwa, kaczki, gęsi, i wszelkie tłuste mięsiwa, a nawet i potrawy takowe. Z najlepszym zaś skutkiem służą ogrodowiny, iako to: marchew, pasternak, szpinak, kozłek, sałatka, salata, łoboda, szczaw, brukiew, buraki słodkie lub kwaśne, a gdzie się znajdują: wężymord dziki, ogrodowy (*scorzonera*), cukrowe korzenie (*sium sysarum*) iak iarzyń gotować, pokąd zaś tylko czas służy; cykoryi, wołowego oka, razem lub pomieszane liście opłórkawczy, drobno usiekać, i wraz z grzankami suszonymi często przez tydzień w rosole gotowane używać. Za napóy służy wprawdzie miernie użyty porter, lepiej zaś woda czysta zimna, w której gasić rozpalone bretnale, powtarzając razy kilka toż gaszenie, z dodatkiem nawet wina francuz-



kiego. Na ranny zaś posilek, a nawet i w godzin dwie po obiedzie, szczególnie zalecam zolądz paloną albo cykoryą samą lub z dodatkiem połowy kawy, pić po filizance dwie ze śmietanką. A kto by takowe napoje w skutku swym chciał zwiększyć, przed ich użyciem można takoz rozpalone czyste żelazo ugasić. Mięsiwa zaś czyli gotowane lub pieczone, z musztardą lub chrzanem surowym tartym lub gotowanym często ieść radzę.

### Wybór Leków.

Służą środki lekarskie, iako to: wyciągi z wołowego oka (*Extracta Taraxaci*), goryczki (*Gentiannae*), podróznika (*cichorei*), np. wziąć którego z nich pół uncyi, rozpuścić w kwarterce wody czystej, osłodzić do upodobania cukrem, miodem, sokiem lukrecyowym, i dodać iedną drachmę spirytusu eterycznno-siarczanego, zmięszać, i brać codziennie po dwa razy, raz przed obiadem na godzin dwie, a drugi w 4. po nim, popiwszy wodą czystą, równie też same zioła wraz z ich korzeniami, świeże lepićy służą, niż suszo-

suszone, wszelako i te mogą być użytemi oplotawszy dobrze wodą, wziawszy ich po garści dobrej drobno posiekać, rosolu wołowego, nie tłustego, cieńkiego, lub z drobiu cieleciny, np: kwartę gotować do zostania połowy, przecedzić, dać się podstać, z tego rosolu rano zwolniwszy pić po filizance co godzina, półtory, aż się ta ilość wypije, po ostatniem wzięciu w godzinę można wypić kawy, której przepis przy dyecie tej konstytucyi podałem. Toż można zrobić i pigułki, wziawszy którego z powyższych wyciągów, np: gummy ammoniackiej lub gwaiaaku drachm dwie, proszku rhabarbarowego drachmę iedną i tyleż solanu (*ammonii*) żelaznego (*ammonium muriaticum martiale*) kazać w aptece zrobić pigułki, ważące po trzy grana, posypać proszkiem tak zwanym niepotym (*Licopodium*) i brać z nich po 6, 8, dwa razy na dzień, z rana w godzin dwie po śniadaniu, a w cztery dobre po obiedzie. — W postępie czasu np: miesiąca 1. 2. przy braniu wyżej podanych środków dodać można odwaru mocnego następującego, wziawszy kory wierzbowej uncją iedną, gotować w kwarcie wody czystej do zostania się połowy, przecedzić, osłodzić czem



się podoba, dodać kropli 40 białych (*Spiritus atherico sulfuricus*) zmieszawszy, brać po łyżce od iedzenia na dobrą godzinę przed obiadem raz, a drugi w godzin 4, i w tenczas branie pigulek odłożyć do nocy, używszy ich w godzin dwie po lekkiéy kolacyi. — Do smarowania żywota, kiedy tenże bywa twardy, co jest oznaką, że załki brzuszne (*glandulae mesenterii*) są zbyt rozszerzone, że się z téy przyczyny dostatecznie ścisnąć i stulic nie są w stanie, przez co ciecz pokarmowa (*chylus*) nie może bydz dostatecznie przygotowana, tak że się w nich wstrzymywać nieiaki czas musi. Smarowanie to składa się z oliwy lub oleiu lnianego świeżego lółów 2. 3. spirytusu, soli, ammoniaku ulotnego, wodnego, drachmów 2. 3. kamfory pół kwintli, wszystko zmieszawszy zatkać czopkiem dobrze flaszke, aby nie wywietrzało; i tym rano i pod noc lekko wcierać w żywot, aby za każdym razem łyżeczka 1. 2. wsiąkła. Takoz i kąpiele brać należy raz dwa w tydzień, lub dzień przez dzień rozpuściwszy w wodzie ciepłéy lółów 4. 5. mydła taflowego, albo też na iego miejsce popiołu z twardego drzewa wziąć łyżek np: 4. 5. do 6. zagotowa-

wszy w wodzie dać się ustać, przecezić i wlać do wanny. — Można takoz i z wielkim skutkiem kąpiele robić w następujący sposób: wziąć korzeni mydlniku (*radix scoponariace*) tatarowego (*Calami aromatici*) każdego po pół funta gotować w 2 lub 3 garcach wody mocno przez godzinę, dolewając kiedy niekiedy wody wrzącéy, po tym czasie odstawić od ognia, dodać macierzanki, szaławii i chmielu, lub w niedostatku ostatniego z ziół tych po garści trzy, przykryć dobrze toż naczynie, aby w nim do ostudzenia mienego mokły, przecedzić i do wody, w którój się ma kąpać, wlać, wszelako wody w wannie nie ma być więcéy iak poza pępek, sama zaś woda powinna bydz dobrze letnią, a w postępie czasu coraz chłodniejszą, siedzenie w téy kąpieli ma bydz od pół godziny początkowo aż do 3 kwadransy, a daléy i do godziny. — Użycie tych tu wyliczonych środków iako i kąpieli stosować się powinno do wieku, tak np: od 8, do 10, 12, 15, lat, rozpuszczeń wyciągowych wyżej podanych po sporéy łyżce od kawy, do 2 aż do całéy łyżki od iedzenia, a podwoić tęż ilość u starszych wiekiem. Służą takoz kąpielki końcem zwiększenia po-



żywności ciała, razy dwa, trzy na tydzień albo z mleka do którego połowy dolać można drugie moczenia nadmienionych ziół i korzeni, można też kąpielki robić i z serwarki, nóżek cielęcych, baranich.

Z opisu tych konstitucyów na wstępie tej części nadmienionych poznaliśmy, że każda z nich zawiera z samego które nosi nazwiska, zaród do tylu charakterystycznych przypadłości wróżących i wybuch chorób właściwych. Unikanie pierwszych a przynajmniej nie tak częste napady stanowi nadewszystko dyeta, wybór zaś leków uśmierza takowe ściśle dochowując zapobiegając pomyślnie i ostatnim. Pracownik pisma tego miał to na celu, nie mógł ich nie zamieścić, otwarty użytek czytelników przekona-

## CZĄSTKA DRUGA.

### *O zwyczajnych wieku dziecinnych chorobach.*

Choroby, które zwykły towarzyszyć dzieciom przy piersiach zostają.

cym, lub też i w późniejszych latach mogą być lekkie i nie nieznaczące, im dzieci zdrowszych rodziców i w siły zamożnych są splodzonemi, im mniej w odchowcie pierwiastkowem rozczulanemi zostają, a mogą też i chorobom podlegać, im są słabszych rodziców dzieci, tym więcej że z powszechnych prawideł organizmu są w tych czasach najsłabszymi i najdrażliwszymi, w czem się łatwo przekonać możemy przy najmniejszej przyczynie, iż powstają silne gorączki, a nawet i dość częste konwulsye. — Zaczniemy od najpowszechniejszych chorób, to jest:

### *Wyrzynania się zębów.*

W części pierwszy tego pisma, Rozdziałku drugiego częstce ósmey udowodnić staraliśmy się, że te przypadłości, jako to: ropienie powiek, czerwoność oczów, kaszle, biegunki, wymioty, gorączka, tębra, nieraz aż do konwulsyów, które wyrzynaniu się zębów przypisywali, nie pochodzą z tej przyczyny, jako raczemy z usiłowań w rewolucyi będącym fizycznem natury, przez którą napastowane bywają dzieci, i że jeszcze daley rozpościerają się



owe rewolucyjne usiłowania, a których skutki dają się widocznie przedstawiać, albo na wstrzymaniu wszystkich wypróżnień poza granice ciała oprócz urynki, a czasem teyże lub przy drugich towarzyszą wymioty, biegunki, kaszle, flegmy, w piersiach rzęzenie. — Przy pierwszych usiłowaniach dają się dostrzegać i wzruszenia nerwowe, iako to: lękania się, zrywania, drgania stawów, a nawet i konwulsye, które zwykły przystępować przy drażliwych i czułych dzieciach, a wstrzymane zaś takowe odbyty natury są skutkiem ściśnięć spazmodycznych układu nerwów, który ma potężny wpływ na wszystkie odchodowe drogi.

Wobu tych gatunkach rewolucyjnych, wskazuje natura już nastąpić mające od piersi odstawienie wydaiące w swym dziele te narzędzia do przeżucia stalszych potraw służące, zktóremi oswajać się musi żołądek, od najmłodszych lat aż do postępu ich dalszego.

Całe zatem środki ratunku wspierają się na podwóynych skutkowniach, które od dwoiakiego rewolucyi stanu wyżey wspomnionego, zastosowanemi być powinny, to iest albo na

poskromienia, i nieiako otrętwienia wzruszeń nerwowych, przy pomocy środków ułatwiających zwykle odchody — Poznamy te pierwey, iako potrzebujące prędszego ratowania, niż drugie usiłowania, a które nie można początkowo wstrzymować, ale raczej w pewnym biegu utrzymować, aby siły przy ich częstości i trawieniu nie wylały.

Do pierwszych służą:

- a. Enemki ułatwienia stolca zrzadzające, iako to: z rumianku, slazu, ziela, serwatki, oleiu lnianego, masła słonego, kleiu zkaszy ięczmienney i te dawać nie w większey ilości iak po filiżance na raz, a często podług potrzeby.
- b. Okładania żywota ciepłym rumiankiem często czynić wypada.
- c. Kąpielki czynić po dwa lub trzy na dzień z wolney wody i mleka np. do dwóch części wody trzecią część mleka.
- d. Gdyby przystąpić miały wzruszenia nerwowe, i popęd krwi do głowy, za uszami stawiać po parę piławek, a na tych postawić masę z gorczycy Nro 18.
- e. Robić kąpielki z samey czystey letnięy wody, do której dodać pó



łota potażu czystego, i te kąpielki według potrzeby dwa, trzy razy na dzień użyć, iak długo w wodzie tęj zechce zostawać dziecię.

- f. Dobrze także służy po łyżce od kawy dawać często lub nie podług napadów nerwowych, wzruszeń, następujący mixturki: wziąć potażu czyszczowego *np.*: 10 do 15 gran rozpuścić w wodzie czystej, gdzie nie ma przekopłancy lub z kwiatu lipowego uncyów dwie, ośłodziwszy dodać z ostrożnością kropli z opium cztery, zmieszać, dawać z tęg mixturki co godzina, półtory, po parę łyżeczek od kawy na raz, iak pospiesznię lub opóźniono napadają wzruszenia układu nerwów.—Można też i następujące lekarstwa zrobić, wziąć szaleiu nasienia ważącego ziarek 10 z dwoma uncyami wody czystej, w móżdżerzu iak najmielej dolewać ię po trochu utłuc, przeceździć, cukrem ośłodzić i takż po łyżce od kawy lub dwie na raz dawać co godzina, półtory, stosownie do potrzeby, to iest do częstosci tych lub owych wzruszeń nerwowych, o których się wyżej nadmienilo, albo wziąć 15|grai

magnezyi Angielskię, niedokwasu, cynku, (*zinum oxidatum*) ziarek 4, cukru ile się podobą, i dwie uncye wody, zmieszać i to czynić za każdą razą, ile się dawać będzie po sporę łyżce od kawy, często lub rzadzię podług potrzeby.

### Przestroga.

W czasie tych wzruszeń przy wyrzynaniu się zębów, czyli to matka lub karmicielka iak najmniey używać powinny mięs, rosoly zaś, kleie, kaszy, owoce, służyć powinny za posiłek aż do ich ustania, piwo zaś lekkie, woda czysta lub herbata z kwiatu lipowego za napój. Można też z nierównie wielkim skutkiem przez udział skuteczny dla dziecięcia w leczeniu, zrzadzić, kiedy za napoy zwyyczajny nie tęg mleka z banianasion ogórków, migdałów słodkich z dodatkiem małym czyszczonę saletry zrobić, *n.p.* do butelki kwartówę tych sztucznych mleków granów 20 teyże, a do tego nader spokojnie się zachować.



- g. Skoro działelka obrzmiała być zaczyna, radzę takowe po samym grzbiecie przy lekkim palca przycisku smarować razy kilka, uczawszy go wprzód w miodzie czy szczonem lub syropku wiśniowym po razy kilka na dzień.

*Do drugiego znowu przypadku* służą środki uśmierzające wymioty, te poniżej niebędą przepomniane, iako i wstrzymujące biegunki, gdy i te tarzyszyć zwykły przy wyrzynaniu się zębów.

*Wymioty te następują*, kiedy żółdek bywa czasem tak sympatycznie zdrażnionym przez współnictwo nerwów jego z działelką nerwami, że sam pokarm wyrzuca, tam więc o dawaniu lekarstw pomyśleć nie można, a cały ratunek spoczywa albo na powierzchownym ratunku, lub przez pokarm matki czyli karmicielki, iako i na dawaniu enemiów. — Do okładania żywota może być użytą miętkiew ogrodowa, łączna, pieprzna, sucho iak materacyk przykładana, drobno wprzód posiekane, a jeżeli być może dozór, tam materacyki te skrapiać można winem ciepłym, wódką, lub w winie maczać całe, wyzdżawszy wprzód, ale nie trzeba im dać oziębnąć, coby mogło szko-

dzić dziecięciu, można także też materacyki nakrapiać wódką kaimforową, albo kolońską, lub wziąć środek chleba pyłowego żytniego, garści dwie, trzy, miętkwi, piołunu, pokraianych drobno po garści dobrej, to wszystko zmięszać w rondelku z dodatkiem nieco wina czerwonego, rozgrawszy dobrze, aby gęste zostało, rozsmarować na chustę i na żywotek przyłożyć, opasawszy tenże ręcznikiem, lub powiakiem, w godzin dwie można takowe okładanie po wierzchu ciepłym winem nakropić, co uczynić wypada aż do pożądanego skutku. Także dobrze służą dla karmiących osób herbata, skórki pomarańczowe, cytrynowe suszone i odbielu wprzód dobrze oczyszczone, drobno pokraiane, wzięwszy której z nich dobrą szczypkę, i moczyć w wrzącej wodzie, można także mieć gotową Essencją z pomarańczków niedożytych, w ten sposób robioną: wziąć tych łótów 6 dobrze przetrzeć, nalać wody półkwarty, a pół wódki iak najlepszej, moczyć w cieple przez godzin 36. po czem wycisnąwszy dać się ustać, i od potrzeby w butelce przechowywać, ile że się długo bez zepsucia konserwuje, a z tej esencji razy dwa, trzy, októ-



rymkolwiek czasie po łyżce od iedzenia używać.

Zdarza się iednak dośó często, że wstrzymują dzieci pokarm, i nie po każdym ssaniu tenże oddają, a takowe wymioty nie potrzebują być wstrzymanemi, przeciwnie często i za każdym pokarmu ssaniem, że nadto żadnego nieutrzymują zasilenia, wcześniej takowym nayskuteczniéj zaradzić można przez pokarm matki lub karmicielki, iakoż mają pić miękkiew miasto herbaty, często przez dzień po filiżance, lub dwie na raz, do której możniejsi dodać mogą kawalek cynamonu i razem z miękkwią moczyc dolewając do nich wina francuzkiego łyżkę lub troszkę araku i rumu. Do iedzenia dla karmiących przeznaczają się mięsa wolowe, drób, aby tylko nie tłuste, z ogrodowin zaś wystrzegać się powinny kapusty kwaśnéj i innych mniéj strawnych pokarmów.

*Biegunki:* Przy wyrzynaniu się zębów albo bywają razem z wymiotami, lub i same, w ostatnim przypadku, karmiące osoby powinny zostać przy powyższéj dyecie, a do tego unikać sałaty, ogórków, buraków, zielenin, i pozostać tylko przy rosolach, kleiach, kaszach ięczmiennéj, owsianéj, orkiszowéj, ia-

iecznéj, naleśnikach i t. p. — Z napoiów, wystrzegać się mają piwa osobliwie młodego, woda zimna czysta, w której ma się nie długo moczyć grzanka z chleba żytniego dobrze przyrumieniona, pókąd taż iest gorąca. wrzucić, i aby w niéj przez chwilę mokła, po czém przecedzić i za napój używać, lecz przestrzegam, aby latem nie wiele iéj robić, łatwo bowiem kiśnie, co może ssącemu biegunkę powiększyć i torsye zrządzić. — Równie za napój przeznaczam wodę z ryżu, albo wzięść korzenia storczyka łyżeczek od kawy dwie, nalać półtory kwarty wody gotując mięszać, aby się kwarta została, przecedzić, osłodzić, aby nie miodem *np:* sokiem lukrecyowym, lub też i samo przez się gotowane, pić za napój ordynaryyny, a przy upartszych biegunkach dla miłości dziecięcia mniéj zważać na niesmak i wzięść proszku z kóry wirzby łoziny, lub pomarańczek niedoyszłych co dwie godziny w wodzie na dobry koniec noża, gdzieby trudność zachodziła w utłuczeniu téj kory, można z niéj odwar robić *np:* wzięść teyże ususzony łyżek dwie na kwaterek wody, zagotować razy kilka przece-  
dzić, osłodzić cukrem, po stołowój



łyżce co parę godzin zażywać popiwszy wodę.

Gdzie wymioty, iak się iuż namieniło, nie bywają tak częste, ale za to częstsze i obfitsze laxowania, przy których odchodzi kley z kiszek, przez co dostają silniejszych bólów, częstego chcenia (*tenesmus*) co dzieci do płaczów zniewala, i temu zaradzić wczesnie wypada, iakoż następujący proszek zalecam, wziąć rakowych oczków na proszek miałko utłuczonych, cukru i gumy arabskiéy każdego po drachmie iednéy, na cukier wpuścić kropli 4. 3. oleyku, z miękkiéy pieprznéy lub ogrodowéy dobrze zmięszawszy dawać 3 lub 4 razy dniem na koniec dobry noża, rozrobiwszy w pokarmie, i piersiami dać popić. — Pozostaie ieszcze ieden szrodek w dawaniu enemków: te robić można z kleiu krochmalowego wziąwszy gęstego łyżkę stołową, rozrzedzić w pół filiżanki wody letniéy, zmięszawszy tak małe a niewiększe dawać enemki raz lub dwa dniem, przy upartszych zaś biegunkach, do tychże enemków dodać można proszku, kurzego ziela, (*tormentilla*) np: ziarek 15 do 20 alboli też wziąć kory, wiérzby, łoziny, (*salix pentandra*) łyżkę od iedzenia, główek maku wraz z makiem 2. 3. te pognieść

gotować z kwartą wody dobrze, aby się połowa została, przecedziwszy, na dwie enemki rozdzielić, i do każdéy dodać kleiu z krochmalu łyżkę od iedzenia. Jeszcze tu dodać muszę i inne enemki, które szczególniéy służą przy wzruszeniach nerwowych, o których mówiłem przy usiłowaniach rewolucyynnych natury przedstawiających się w zrywaniach, lękaniach się a nawet i konwulsyach, że na poskromnienie ich służą albo kozłek (*radix valeriana*) drobno pokraiany np: pół łóta nalać na niego filiżankę wody wrzącey, przykryć dobrze i moczyć do przestygnięcia, przecedzić i dać na raz enemkę, alboli też do odwaru zrumianku pół filiżanki wsypać tegoż korzenia na proszek utłuczonego 10 ziarek, i na tenże zamiar przeznaczyć. — Enemki te stosownie do częstych napadów wzruszeń nerwowych, dawać można w tey a nie większéy ilości 2, 3 lub 4 razy na dzień. Te są środki, które z ciągłych doświadczeń podałem, w reszcie wezwanie znawcy zastrzegam, w przypadkach upartych gdy tymczasem wielce się zyskuje, że do dalszego złego a przynajmniej najgorszego nie dopuszczają środki tu podane.



## CZĄSTKA TRZECIA.

*O Kaszlu i jego różnicach.*

Kaszel czyli wzruszenia silne piersi, przez które usiłuje natura pozbyć się szkodliwości drażniących też organa, lubo ma rzadko swą w nich przyczynę, iak daleko częścię bywa znamionem drażnień odległych od nich, wszelako współnictwie z piersiami zostających części, iak zwykły towarzyszyć febrom wyrzutowym, iako to: odrze, szkarlatynie, a nie wdając się w różność nazwisk, które otrzymuje albo od swych przyczyn i mieysc, nawet od których pochodzą skutki drażnień do płuc, staniemy tylko, co może dla nas w krótkości być użytecznego.

Za nim dla styczności materii o różnicach kaszli towarzyszących starszemu nawet wiekowi, niżey mówić się będzie, dla porządku poprzedziemy kaszel, o którym tu jest mowa: jest on tylko znamionem peryodu wyrzucania się zębów, iakoż zwykły niektóre z dzieci napastować, nieraz silnie dręczyć, trwać, zupełnie ustawać, i znowu przy późniejszym się zębów wyrzucaniu powracać. — Ten kaszlu gatunek znacznie się zwykły powiększać,

kszać, kiedy niebaczne karmicielki w czasach mrozów przychodząc, znów dopuszczają ssać dzieciom, nie ogrzewszy wprzód piersi, lub kiedy nogi zamaczują. Przyczyny takowe nie wymownie w każdym czasie, tym bardziej w czasie wyrzucania się zębów powiększać zwykły ten kaszel, a nawet i kataryczny dziecienny. Przestroga ta służyć powinna dla karmiących, aby się niemowlętom do silniejszych kaszli nieprzykładały, nie potrzebuje on też użycia innych środków doradczych, prócz kąpielek codziennych, wszelako i te z ostrożnościami czynione być powinny, to jest, aby dzieci po nich nie zaziębić, i aby nie winy iak dobrze zlecony wodzie kąpać. — Lecz dość często przystępuje w tym peryodzie mocne, głośnie flegmy rżenie, a to narusza wolne tchnienia i oddychania, nieraz i obawę uduszenia sprawujące. — Wskazania ku temu wraz z użyciem środków są następujące. — Aby ile możności zgęśla flegmę rozrzedzić, i takową przez wymioty z piersi, kanału oddechowego, a nawet i z żołądka wyprowadzić. — Na dopełnienie tych wskazań, następujący proszek umieszczam. — Wziąć

Część II.



cukru twardego drachmów dwie, węglanu ammonii (*ammonium carbonicum*) ziarek 10, proszku ipekakuany ziarek 4. do 6. Zmieszać razem, i w naczyniu dobrze zatkaném chować. Z niego dawać na mały koniec noża w łyżce pokarmu zmieszawszy, pokarmem dać popić, lub osłodzonymi kwiatkami, dziewanny, lipowego. — Branie proszku tego powtarzać w miarę potrzeby i skutku, to jest: jeżeli wzięty raz, dwa lub i więcej, co półtory, dwie godziny, gdyby mocno rzeziła flegma i przystępowały lekkie womity, późniéj dawanie iego na rozrzedzenie flegmy będzie dostateczne po razy dwa dniem, raz z rana, a drugi od południa, pokąd tylko toż rzeżenie nie sfolguie. Na przypadek znowu, jeżeliby powyższa proszku tego ilość nie miała do wzbudzania wymiotów być dostateczną, podwoić ją naraz radzę, co gdy skutek otrzyma, powrócić do dawania téj ilości, iaka się wyżéj podała końcem flegmy rozrzedzenia, a jeżeliby w dni 2. 3. toż rzeżenie mocniejsze miało przystąpić, znowu na zrządzenie womitów zwiększyć ilość tego proszku. — To tedy jest całe postępowanie przy kaszlu towarzyszącym wyrzynaniu się zębów, z

drym zaś skutkiem służy w pomoc przybrać i osoby karmiące, a te oprócz powyższéj przestrogi dla nich umieszczonéj a nawet i dyety, mogą po razy 2. 3. dniem po szklance zimnéj wody pić, i niebawnie dać dziecieniu ssać, przez ten środek znacznie się nowe flegmy zgromadzenie zmniejszy, i służy nieiako do wzmocnienia płuczek dziecinnych, wszakże powtórzywszy zrządzenie wymiotów w potrzebie razy 2. 3. lub i więcej przystąpić można do wody téj picia, i w tenczas przekonać się można o iego pomyślném skutkowaniu.

#### O Kaszlu tak zwanym Spazmodycznym.

Lubo i ten kaszel może napastować dzieci przy piersiach zostające, wszelako daleko rzadziéj, różnić się zwykł od innych kaszłów przez następne opisanie, częstokroć epidemicznie panuje, więcej daleko dzieci, wiek młody, niż starszych napada, że nawet stać się może udziałem zarazy. — Przy tym gatunku kaszlu uważamy trzy przedziały.



Pierwszy z nich zarazy, — drugi samé choroby, — trzeci pogorszenia. Poznamy te przedziały obszernie z samych znamion, tu tylko nadmieniam, że przebieg iego (*recursus*) bywa różnym, wszelako przedstawuje się w tychże samych przedziałach.

#### *Pierwszy Przedział.*

Chorzy powszechnie narzekają na utratę apetytu, na zimno, gorąco, i słabości; dostają powszechnie zwykłych znamion katarycznych, iako to: płynięń z oczów, zatkania w nosie, kaszlu przy którym flegma gęsta odchodzi, głowy bólów, gardła, chrapowatości głosu, i te znamiona zwykły nawet przedstawiać się przy wyrzucie odry, jeżeli właśnie w czasie téy choroby ona panuje, obawa jest daleko większa. — Wszystkie zaś znamiona trwać zwykły 3. do 14. dni, niekiedy i dłużej. — Kaszel ten więcéy napada w nocy.

#### *Drugi Przedział.*

W nim to dopiero istotny kaszel powstaie, a pierwszy iego napad by-

wa nocną porą lub. też i po iedzeniu; daie się w tym napadzie rozpoznawać przez szczególny krzyk, któren od nowych napadów bywa przerywanym, pokąd z naywiększém usiłowaniem nieco flegmy nie odeydzie, lub wymioty nie przystąpią. — Technienie jest okropne i prawie duszące, ledwie się do uduszenia nie zbliża. — Technienie zaś i odetchnienie nad spodziewanie jest szybkie, twarz obrzmiewa, staje się czerwoną, brunatną, sinieją wargi i paznokcie, powieki nabiegają, łyż obficie się leją, a oczy iakoby z swóicy kolei ustąpić miały; uderza silnie serce, chwieją się nogi, całe ciało dziecięcia drży, i właśnie potnieie z boiaźni uduszenie; niektóre znowu nóżkami tupią, alboli też od mgłości upadają; drugie znowu dzieci z boiaźni szybko po izbie biegają, dla złapania powietrza, chwytają się rzeczy, niekiedy krew z nosa i ust wydobywa się, a nieraz i z odkaszliwaniem się pokazuje. — Przy tych okropnych znamionach drugiego peryodu, bliska jest zaduszenia obawa, które wszelako rzadko przystępuje. — Po tak silném wzruszeniu niewymownie dzieci słabieją, i zaledwie po kilku minutach do siebie przychodzą, odbywszy paro-



xyzm kaszlu dwie, trzy do czterech minut trwający, i w nim iadła i picia przez wymioty oddają, a to przestawszy, doznają niedosytniego głodu, wszelako mało co iść mogą. — Napad tych paroxyzmów bywa nieregularny, nieraz po 2. 3. godzinach lub czasem i dłużej daie biednym wypoczywać, napada nawet więcéy w nocy iak w dzień, w którym to czasie obfitemi potami są zalane. — Każde obfite iedzenie, zimne picie, zaziębienie, gniew, kichanie lub smiech, nowy napad kaszlu sprowadzają, a przed nim na pół godziny dzieci niespokojnymi bywają, doznając ziębu nóg, niektóre z nich mocno kichają, niektóre znowu przed paroxyzmem doznają gniecienia w żołądku, a nawet od niego do piersi aż uczuwają nieiako drapania a w krtani łechtania.

Opisane tu znamiona prawdziwego koklusu trwają 3. do 4. tygodni, potym łatwieysze wyrzuty flegmy przystępują, i sam nawet kaszlu paroxyzm daleko wolnieyszym bywa, nie tak często womitują, tchnienia niebywają gwiżdżące i ton piejący ustaie, a nawet i nowe kaszlu napady wraz się opóźniają, że ich tylko kilka odbywają w czasie 24. godzin codzienn, zaś w nocy

spokojnymi bywają, przy tym więc Symptomie choroba ta przezwycięzoną się staie.

### Trzeci Przedział.

Nie zawsze to złe odbiera tak pomyslny wychód. — Nieraz wszystkie przypadłości pogorszają się, przystępują nieugaszone pragnienia, gorączka, zimno, opadanie z sił, utrata całkowita apetytu, wstrzymanie stolca, lub biegunka. — Napada kaszel w swéy okropności, szczególniej z konwulsyami, tchnienie krótkie, zaduszenie, członki ziębnieją, i chorzy tak okropnie ukończają swe życie, a jeżeli które z dzieci wytrzymują te peryody, są wystawieni na suchoty i wyniszczenia ciała, co tém pewniéy następują, kiedy silny ratunek przy nim i po nim zaniedbanym bywa.

### Przepowiedzenia.

Bywają dwoiakié, pomyslne i niepomyslne. — Pomyslne, kiedy przy ukończających się chorobie nie tak często paroxyzmy napadają, i te coraz rzadkie, a do tego łagodnieysze odby-



wają się, kiedy wyrzuty lekkie następują, kiedy się paroxyzmy przez wymioty kończą, kiedy zasilać się pragną, kiedy po odbytych paroxyzmach dzieci bywają dość wesolemi, sen spokojny, bez ciężkiego tchnienia, a gdyby też i bywały te paroxyzmy, ale nie tak częste, policzyć je można do dobrych przepowiedzeń, równie jak krwi mierne z nosa płynienie, lub kiedy wszędzie zawilgotnioną bywa skóra, a członki równie ciepłe, stolec nieco wolny.

Niepomyślne — Kiedy ten kaszel napada dzieci wielką chorobę i Angielską cierpiące, dzieci słabe, mające rodziców do suchot skłonnych, kiedy wyrzuty flegmy albo szczupłe albo obfite bywają, kiedy już poprzedniczo krótkiego tchu doznawały, obfitych krwi z nosa płynień, słabych rodziców dzieci im głośniejsze bywa tchnienie, kiedy wymioty i wyrzut flegmy nie przystępują łatwo, wtenczas płuc zapalenie przystąpić może; kiedy się do tego kaszlu przylączają odra, szkarlatyna, ospa, lub przy wyrzynaniu się zębów, chociaż ten kaszel zwykły takowe przyspieszać.

### Staranie około chorych.

Małe dzieci za każdym paroxyzmem podnosić trzeba. Jeżeliby paroxyzm obawę uduszenia nabawił, za plecy lekko niby wzruszając uderzać, w oliwie lub olejku migdałowym umaczaną chusiką obwinięty palec lub pióro w usta dla zrządzenia wymiotów wkładać. Ścisłe zachowana dyeta jest półleczaniem. — Dla tego iak długo trwa ten kaszel, żadnych mięs ani ryb dostać do jedzenia nie mają, toż samo się ma rozumieć o ciastach tłustych, nie potrzeba nawet dawać tłustą, chociaż dozwolonych pokarmów, iakoż popełniony błąd w dyecie polepszoną już chorobę mocno pogorsza, lub kiedy ustaje, na nowo w swę srogości powraca, a co liczne ztwierdzaia doświadczenia. — Przy piersiach nawet jeszcze zostaiące dzieci, niepowinny być często, a tym bardziej do woli karmionemi, ogólnie wszystkim dzieciom nie dać razem wiele pokarmów, starszym lekkie pokarmy i to miernie udzielane służyć, iako to: szpinak, marchew, pasternak, owoce, ryż, kaszy owsiane i ięczmienne. — Do tego często pić mają, a tu służyć kwaskowcy natury napoje, iako to:



woda z miodem czyszczonym octem winnym do miłej kwaskowatości zaprawna, odwar z korzeni pyrzu, klęy z kaszy ięczmiennéy, ale nigdy zimno, tylko letnio dla niepogorszenia kaszlu, równie od zaziębnienia ochraniać dzieci potrzeba, wszelako nie należy ich zagorąco trzymać, szkodzą zatym pościel pierzowa, odzież futrzana, czapki barankami lub inném futrem podszyte, przestrzegać, aby dzieci zapoconych z pościeli nie wyymować, kiedy w izbie chłodno bywa, przepocną zaś koszulkę zrzuciwszy, natychmiast dobrze ogrzaną odmienić, równie być baczny, aby się dzieci we śnie nie odkrywały, także przestrzegać, aby nogi ciepło utrzymywać, a latem przy czystém powietrzu wynosić z izby, — zalecam nadto, ieżeli bydz może odmienić mieszkanie, np. z miasta na wieś, aby tylko nie w zimne słotne wietrzne czasy.

Kaszel ten zwykł nieraz panować epidemicznie, przenosić się nawet z jednego do drugiego kraiu, nieraz tak ziadliwie panuje, że znaczna część dzieci pada śmierci ofiarą. — Jakoż w Szwecyi r. 1755. — 5832. dzieci przez srogość iego życie utraciły, — napada od roku do 2. i starsze, przecie sta-

rym przepuszcza. — Zaraza iego bywa ulotna, że nie raz dosyć iest być tylko w domu chorego. — A Rozenstejn utrzymuje, że się nawet sukniami razić można. — Tak zaś bywa upartym, że przez przeciąg miesięcy dręczy, nie można się zatym dziwić, że obok najskuteczniejszych leków wyboru, polepszenie nader powolnie idzie. — Dla tego to Sydenham i Werlhoff, oba sławni w świecie Lekarze, nader roztropnie utrzymywali niepodobieństwo, tenże kaszel w przeciągu czterech niedziel uleczyć. — Powszechny iego przebieg trwa blisko trzy miesiące, ustaie, zostawując po sobie zwyczajny kaszel.

### *Leczenie iego.*

Podawszy rzetelny opis kaszlu tego, iego przedziały przepowiedzenia, dyety, starania około chorych i dostrzeżenia, podać teraz wypada domowy sposób iego leczenia. — Tu tylko na wstępie nadmienić muszę, że nie ma prawie żadnéy choroby, w którejby użycie częste leków wymioty sprawujących, tak dzielnie iak przy nim służyło. — Dla tego rodzice dzieciom



co trzeci lub czwarty dzień w roku lub dwóch dawać po trzy lub cztery ziarka pieprzu proszku z korzenia Ipekakuany, starszym dwa razy tyle, w pokarmie przy piersiach będących, dobrze takż służy proszek przy kaszlu towarzyszącym wyrzynaniu się zębów podany; starszym zaś w tyżeczce od kawy osłodzonej herbaty lub letniej wody, nie ma tu potrzeby obowiazać się, chociażby i po razy kilka za jednem proszku nżyciem womitowały, za to można dniem spóźnić wzięcie drugiego proszku — w dni znowu wolne od brania wymiotów, dawać nakoniec noża 2. 3. lub 4. razy przez dzień następującego proszku. Wziąć siatkowego korzenia, magnezji Angielskiej, cukru, każdego po dwie drachmy, kerimesu mineralnego ośm ziarek i tyleż szafranu bardzo mialko utartego, zmięszać to wszystko i dawać dniem przy piersiach dzieciom na mały koniec noża w pokarmie, starszym dwa razy tyle, powiększać można, po dwu lub trzydniowem dawaniu, jeżeli będą przy jego użyciu womitować, co gdyby nastąpiło, wtenczas przy początkowey dozie proszku, tak pozostać należy. Dnia znowu 4. lub 5go ponowić proszek z Ipekakuany.

Nózki często w wolney wodzie moczyc, a dzieci młodsze po razy dwa na dzień w ciepłej wodzie kąpać, które były przyzwyczajone do zimnych ciałek obnyciów, na nowo do ich użyciu powrócić, lecz zaraz dobrze cialko osuszywszy w wygrzaną pościółkę włożyć, dawszy im dziewanny kwiatu ciepło się napić, żeby tak przynajmniej dobrą godzinę w pościeli leżały. — Można robic wcierania na piersi moczeniem z gorczycy z octem, i też po kilka razy na dzień powtarzać, aby w tém miejscu ciało ciągle czerwonę utrzymywać, wszelako brodawki pominąć należy, bywa dość często, że się krosty iątrzące na tém miejscu okazują, przy tém octem nacieraniu, takowe znowu pomiać wypada, a wolne od ich miejsca nacierać. —

Nie zapominać o wolnego stołeczka utrzymaniu, do czego pomagają davanja enemków wyżej wspomnianych, aby nie w czasie, kiedy dzieci zapocone bywają. — Z niemalym także skutkiem służy smoła, w wielkości dwuzłotówki lub nieco większej, pomiędzy łopatki na płótno smarowana, i tę przyłożyć, odświeżając co 3. lub 4. dni raz.



Bywa nadto, kaszel przy katarycznych wyrzutowych i zapalnych febrach, lecz że te są tylko towarzyszkami tych chorób, a leczenie ich stosuje się do natur chorób, na swém miejscu ku temu podane zostaną środki. — Jeden tu jeszcze gatunek umieszczam

#### *Kaszel Żołądkowy.*

Ten się szczególnie poznaie po utracie apetytu, po nudnościach, gnieniu żołądka, zwłaszcza po iedzeniu, a nieraz i wymioty następują. — Kaszle takowe nie przepuszczają starym i młodym, tu lekkie wymioty służą z proszku Ipekakuany, jeżeli przy pierśsiach, w powyższy dozie od 8. do 10. i 12. ziarek w latach 8. 10. i t. d. a po nich dawać im potrzeba wzmacniające żołądek leki, iakiemi są nalania pomarańczków niedoyrzałych, i te są dostateczne do iego zniesienia, ale przy ich użytku powyżey nadmienionych pokarmów wystrzegać się mają czas nieiaki, iako to: niestrawnych, tłustych, mącznych, ciast i t. d.

#### *O Bólach Głowy.*

Boleści te u dzieci i młodych najczęściej pochodzą z przeładowania żołądka, gdzie nie ma nad niem przyzwoitego dozoru, a może też i pochodzić z potraw użytku przechodzących siłę żołądka do ich strawienia potrzebną, iako też i odbytności robaków, o których się iednak pewności iak odejściu dobrowolnem tychże, naylepięj się przekonywamy, inne bowiem oznaki, iako to: cikliwości, śliny, obfite wodnistę, utrata apetytu, czasem wymioty, błądść twarzy, słabość często napastująca, nie zawsze o ich przytomności zapewniają. — Bywają nadto tak przykre cierpienia w skutku zaziębień głowy i nóg, a nieco rzadkię od krwi napływu, do nię i wtenczas zwykły towarzyszyć szum, pisk w uszach, a czasem i zawroty głowy, czerwoność twarzy, i oczów zapalenie.

Co do pierwszey przyczyny, to jest z przeładowania i niestrawności, niezwłocznie dać na wymioty, np. Ipekakuana w proszku po 4. 6. do 10. ziarek od 3. do 6. lat, po wymiotach wypada w ścisłey dyecie zachować dzieci dni kilka, a dopiero do zwykłego potraw użytku powracać, wszelako



nie dopuszczać ich do sytości używać. Wskazanie to na wymioty niezawadzi choćby i w dni kilka po popelnionym w dyecie błędzie powtórzyć, wszakże wsteczne w żołądku wzruszenia zwykły uwalniać tenże z zamuleń flegmistycznych, a które także do tego bólu być mogą przyczynami, zawsze iednak pomyslniejszy sprawia skutek, kiedy prędkiej przedsięwziętemi zostaną. — Jeżeli znowu tenże ból bywa skutkiem zaziębnienia samej głowy lub nóg, uważać go należy za reumatyczne cierpienie, nóg moczenie pod noc z dodatkiem soli i gorzycy całej po łyżce lub dwie do wody wrzącej, w której się ma nogi moczyć, po czem roztwożyć wodą zimną i tak od pół godziny do trzech kwadransy co dzień raz rano drugi pod noc powtarzać, aby tylko po nich zaziębnienie tych części ciała nie nastąpiło, dać im miasto herbaty kwiat bżowy, dla starszych i powidła bżowe *np*: pół łyżki lub i całą rozpuściwszy w wodzie czystej *np*: kwaterce, osłodzić i dawać po łyżce od iedzenia co parę godzin, żeby lekkie poty nastąpiły, w miarę zaś silniejszych głowy bólów położyć Synopizma na karku, rękach, łytkach, na prze-

przemian, których robienie umieszczone jest przy przepisach lekarstw Nr. 18. Na głowę przykładac materacyki z brzozowego kwiatu, rumianku na w pół zmięszane i drobno pokraiane. — Co znowu się dotyczy od napływu krwi do głowy, które byź może skutkiem upadnienia lub wystawienia głowy na gorącość słoneczną. Na tę znowu przyczynę służą okładania głowy Nr. 20. to w chłodnym miejscu powinno byź utrzymywane, maczać w nim chusty w czworo złożone i dobrze wyždżawszy często okładać, aby głowa ciągle chłodu doznawała, z pod której poduszki z pierzem wyjąć potrzeba, i lepiej albo włosem lub sianem wypchane podłożyć, do tego głowa wysoko leżeć powinna.

Do tych środków w pomoc przybrać przyłożenie Synopizmów na łytkach, Nr. 18. nóg moczenia w wodzie, iak się wyżej podało, a gdyby potrzeba było za uszami po kilka piawek przystawić i krwi sączenie pół godziny po ich odpadnięciu utrzymywać. — Z leków brać kamień winny na wpół z cukrem zmięszany i na proszek starty co dwie godziny po sporę łyżeczkę od kawy z wodą, i wodą popić,  
Część II.



lub kremortartary wzięwszy pół łyżki do kwarty wody gotować do zostania się pół kwarty, po ustaniu się zlać, cukrem osłodzić, miasto lemoniady w braku cytryn używać, lub też kremortartary z boraxem preparowany (*tartarus boraxatus*) albo sól istotną z kremortartary (*sal epensentiale tartari*) dla kwaskowatości wody wysypać, cukrem osłodzić, albo powyższe mleka sztucznie z migdałów, z nasion bani i ogórków, z dodatkiem saletry, albo owoce kwaśnej natury, iako to: syrop kwaśnicy, lub suszoną kwasnicę w wodzie gotować, sok z téż wyciśniony do wody: wszelako przy tych środkach użyciu, nie zapominać o utrzymaniu stolca wolnego, na ten znowu zamiar, można użyć soli Glaubera, np. łótów dwa rozpuścić w kwaterce wody dobrze zlecony, i z tego dawać po łyżce od iedzenia lub dla starszych, po dwie, co parę godzin, pokąd wolnych kilka stolców nie nastąpi. — Znowu bywają bóle głowy przy bytności robaków, a tu znowu w pomoc przybrać lekarstwo, które niżej przy robakach zaleciliśmy, równie i ból głowy zwykły towarzyszyć wyrzutowym febrom, nawet przed nastąpić mianami wyrzutami, iako to:

w odrze, szkarlatynie, i znowu w gorączkowych febrach, iako to: przy zapaleniach żołądka, kiszek, płuc i t. p. takż towarzyszy przy reumatycznej febrze, lecz o tych głowy bólach iako Symptomatach chorób, przy których się one zwykły przyłączać, przy udzieleniu rady na te choroby obszerneć się mówić będzie.

#### *O Biegunkach i Dyssenteriach.*

Pierwsze i drugie nie przepuszczają żadnemu wiekowi, nieraz panować zwykły Epidemicznie, to jest powszechnie, lub tylko Endemicznie, czyli w pewnym tylko obszerniejszym lub pomniejszym okręgu, a drugie zaś opatrzone są pierwiastkami zarazy uczestnictwo mającemi. Ze zaś wiek dziecinny nierównie jest drażliwszym, czulszym, stąd też podlegają nader łatwo tak przy piersiach, iako i od nich odstawione dzieci, a przy zaniedbanym początkowym ratunku, na liczniejsze daleko szkodliwości wystawionemi bywają, i które same sobie dość często dobrowolnie lub mimowolnie przysposabiają; nie wychodząc iednak z porządku, staniemy przy wieku dziecinnym



zaczawszy od dzieci piersiami jeszcze żywionych, aż do wieku 6. 8. 12. 16. a później przy chorobach przy-padkowych, niekiedy i panujących, przepomnianym nie będzie, zaczniemy więc

### O Biegunkach

Towarzyszących przy wyrzynaniu się zębów, na które przy tej materii wyżej podałem doradcze środki, do których się odwołuję, zwłaszcza dla dzieci przy piersiach będących, aż do lat dwóch, dalej, gdzie już wypada nie tylko mocniejszych, ale i większą ilość leków w pomoc wezwać. — Leczenie wszystkie zawsze się stosować powinny do przyczyn, które też biegunki zrzędały, a środki takowe skuteczniejszymi się okażą, im prędzej i pośpieszniej przeciw usunięciu przyczyn działać będą. Przeydziemy najpospolitsze, i przy każdej z nich wskażemy potrzebne rady.

- a) Wszczęć się mogą przez niestrawność, albo z nadużytku potraw, iako to: latem owoców niedoryżających, potraw kwaśnych, przy użyciu mlecznych, tłustych, a po nich zaraz picia i t. p. alboliteż

choć i przy szczupłym użytku potraw przechodzących siły żołądka do ich strawienia. — W obu tych przypadkach spieszenie dać radę dozę z proszku Ipekakuany, rachuią na każdy rok od 2. do 3. ziarek w łyżce wody, i wodą zimną popić, iak przystąpią nudności, wodę ciepłą pić, aby ułatwić wymioty. Można nawet z dobrym skutkiem tenże dać zażyć proszek chociaż i później, a to dla uczynienia wstecznego ruchu żołądka i kiszek, dopiero krople rhabarbarowe z wodą lub winem robione, których przepis w apteczce domowej umieszczony zostanie, samych przez się co do wieku po łyżce od kawy do dwóch, a popić z miętki herbatą, biorąc po 5. razy na dzień, lub sam proszek rhabarbarowy, np. od gran 6. do 15. rano nadczezo w łyżce wody zinnéy i takóž popić herbatą z miętki. Równie służy odwar jagód czarnych, odwar krzyżownicy gorzkiej z korzeniem kalmuśowym, np. każdego z nich po łócie iednym, a dla starszych po dwa, gotować w pół kwarcie wody do zostania się połowy, prze-



cedzić, dolać spiritusu nitri dulcis kropli 30. i brać co trzy godziny po łyżce, iednak przy braniu tych lekarstw potrzeba kilkadni ścisłą zachować dyetę, nie iesć nic tłustego, więcey pieczonego niż gotowanego, wszelako wieprzowin, gęsi, kaczek wcale nie używać, iarzyń żadnych, rosół nawet tłustym być nie powinien, a nawet i gorący, tylko przestudzony, z kaszami klęć mającemi.

- b) Takóž pochodzić mogą od zaziębienia, wtenczas użyć można ziół lekki pot sprawujących, iako to: rumianku, melissy, miętkwi, iak herbaty, w pomoc przybrać i ciepłe kąpiele, których brać można raz lub dwa na dzień, smarować całe ciało wódką kamforową, i nie dać się dzieciom na nowo zaziębiać, wreszcie i tu zaraz z początku użyć można proszku z ipekakuany rano naraz, iak się wyży namieniło, nie dla przyczyny wyprowadzenia iakowych z żołądka i kiszek nieczystości, lecz dla zdziałania powszechnego wzruszenia aż do naczyń parniących skóry, co ułatwi powrót potów przez zaziębienie tego organu

wstrzymanych. — Przy tych środkach nadewszystko na przyczyny usunięcia działających uważać się ma: można w pomoc przybrać powyższe lekarstwa, iako i dyety wzwyż położonę zachowanie, a to dla prędszego biegunek utamowania, i gdy te trwając, niezmiernie osłabiają cały mechanizm trawności, niszczy odżywienie całego ciała, osłabiają organizm, i siły iego nadwerężają, do opuchlin, obrzmienia nóg, twarzy, rąk, a w końcu i do zupełnego wyniszczenia doprowadzają.

- c) Na wzbudzenie przeziwu skóry i samych nawet potów, z wielkim skutkiem służy moczenie kozłku, w sposób następujący robione. — Wziąć korzonków tych np. pół łota, od 3. do 6. lat: a dla starszych do łota i półtora, nalać wody wrzącej pół kwaterki, naczynie dobrze przykryć, aby tak mokł do przestygnięcia, przecedzić, cukrem osłodzić, dodać spiritusu nitri dulcis, albo likwor anodini kropli 20. 30. i z tego co dwie lub trzy godziny dawać, młodszym po pół, starszym po całej łyżce od iedzenia, pokąd po-



ty nie nastąpią, i te utrzymywać wypada, wszelako zostawić potrzeba do wolnego natury działania; niewypada więc pościelami otulać, tłoczyć, przez co chorzy bardziej słabieją. — Ustawianie z téj przyczyny pochodzący biegunki, skaznie coraz późniejsze tegoż moczenia branie np. dwa lub trzy razy tylko na dzień, iakoż za wymuszone poty przez ogrzewania pościłek, nadto organ skóry rozczulając, a to czyniąc, usposabiają tenże do nader łatwego powtórnego zaziębnienia; przez co znowu albo powrotowi do téjże biegunki, lub nabywaniu reumatycznych cierpień, otwieramy drogę. — Poprzedzać nadto zwykły biegunki febry wyrzutowe, iako to: odry, szkarlatyny, fryzłów białych lub czerwonych (*purpura alba, rubra*), lub też i w czasie samych wyrzutów: takowe znowu biegunki uważać należy za Symptomatyczne, i nader szybko iak skutecznie takowym zaradzać wypada. — W takowych więc wypadkach użyć radzę ciepłych a nawet i nieco cieplejszych iak zwykle kąpielek, i te dwa lub

trzy razy na dzień powtarzać, pokąd wstąpione na wewnątrz nie wystąpią wyrzuty. — Do tego można użyć nacierań całego ciała, albo flanelą lub chustą dobrze wprzód kamforą natartą, albo przykładac na rękach i łydkach Synopizma Nr. 18. wizykatorye, a wreszcie używać leków, które przy zaziębnieniu i z téj przyczyny powstały biegunki, za pożyteczne umieścilem.

- d) Bywają znowu i biegunki powszechne mające swe przyczyny w niedościgłej powietrza szkodliwej własności, lub na przemienionych a dość szybko po sobie następujących powietrza odmianach, iako to: po gorących i upałach, zimnie po suchych dniach ciągłych ulewach lub naprzeciwnie. — Przy takowych biegunkach najwięcej działać potrzeba na organ skóry, i jego czynności, poniekąd przez te wpływy uszkodzone, wzbudzić i utrzymywać. Na ten zamiar służą lekkie przeziwy, zrzadzające środki iakie się powyżey umieściły przy biegunkach z zaziębnień pochodzących, także i branie powyżey zaleconego proszku z ipe-



kakuany, nacierania suche flanelą, chustą, całego ciała rano i w noc: melissy, miętkwi, iak herbatę używać z dodatkiem araku w małej części, lub wina po raz kilka przez dzień pić, osobliwie zaś pod noc ciepło. — Znowu bywają:

- c) Biegunki żółcianéj natury, zwłaszcza przy silnych upałach, znowu poznawac się zwykły z utraty apetytu, ekliwosci, smaku gorzkiego w ustach przy używaniu napoiów, pokarmów, tu znowu służy zalecony proszek z ipekakuany raz, a przy upartości w dni 4. 5. i drugi raz powtórzony. — Przy tym gatunku biegunki owoce dojrzałe używać radzę, i te, aby tylko w miarę iedzonemi były, a do tego obierane, dobrze pożute, dziwnie służą, mniéj się tu o nie obawiac potrzeba, iakoby też miały biegunków trwanie, lub ich zrzadzeniu dopomagać, uczyły i uczą doświadczenia, że przy obfitych owoców urodzaiach, albo bywają w leczeniu łatwe, mniéj lub wcale nie napadają. Służą takż napoje kwaskowéj natury, iako to:

gotowane w wodzie suszone owoce, iablka, gruszki, kwaśnica, do których można dodać wody lnianéj wyżéj opisanéj, lub odwarów korzeni ślazu, sterczyku.

Jeżeli znowu bywają przy upałach z boleściami, co oznacza stan żołądka i kiszek zbyt drażniony, a zatym i skłonność do zapalen tych części; równie i tu służą używania owoców, napoje chłodzące, kleykowe, iako to: sztuczne mleka z bani, ogórków, migdałów, do których można z wielkim skutkiem dodać odwaru z korzeni sterczyku, lub z ślazu, z którymi dobrze przestudzonemi robić można nadmienione mleka, i pić ie za napóy, enemki kleiowe z ślazu ziela, korzonków, mleka samego lub z dodatkiem żółtka od iaia dobrze rozbitego, lnianego nasienia, a w przypadku upartości wziąć wosku żółtego lót ieden w móździerzu dobrze rozgrzanym rozpuścić, dodać zaraz żółtków od iay dwa, mięszac powoli kwaterkę ciepłéj wody, lub kleiu lnianego dodawać, i to na dwie enemki podzielić, dając po części co 3. lub 4. godziny, a jeżeli są



silniejsze boleści przylączyć na żywot Synopizm Nr. 18. nie w wielkiéy obszerności, np. iak dłonie dwie, i te żeby leżały pokąd skóra nieco nie zaczerwienieie, poczem śmietaną kwaśną lub niesłone masło na toż miejsce przykładać raz, dwa dniem, aż do zblednienia. Słusznie i tu enemki wyżéy podane, podług częstości stolca, dawać raz, dwa lub i trzy na dzień, nie w większey iednak iak się iuż nadmieniało ilości, to iest po filizance naraz. Znowu napadają biegunki przy febrach katarycznych, reumatycznych, a tym zaradzać wypada przez środki, które przy biegunkach pod literą *b.* podane zostały, i tych użycie niedość zalecam.

*f. g)* Są nadto biegunki tak zwane wyniszczające ciało (*Dijaria Coliquativa*) i te równie napadają wiek dziecinny iako i starszych Wiekiem, często powstają z zaniedbanego ratunku początkowéy biegunki, chociażby ta od 20. do 30. dni trwać miała. — Dla tego w cześnie iéy zapobieżyc należy przez środki, które wyżéy podam pod literami *a. b. c.* a gdyby

te za słabo skutkowały, do monejszych daleko środków ratowania przystąpić, iako to: odwaru z kaskarilli, np. wziąć przetłuczony łót, gotować w pół kwarty wody do zostania się kwatarki, przecedziwszy, ostudzić, dodać do tego odwaru alunu czysszonego gran 20. 30., gumy Arabskiéy łót, i dawać co trzy godziny, młodszym po pół łyżki, starszym po pełnéy, i ieszcze starszym aż do lat 16. i po półtory na raz, dać popić kleiem z żywokostu w ten sposób robionym: łót ieden pokraiać, i w kwarcie wody zagotować razy kilka, przecedzić, pić za napóy i do popiiania powyższego odwaru użyć. Gdyby nie było pod ręką kaskarylli, miejsce iéy zastąpić mogą kraio-we kory: wierzby, łoziny, kasztana dzikiego, dębowéy, z młodych gałązków odzieranych. — Te kory równie co do odwaru ilości i sposobu iego robienia, użycia do powyższéy kaskarilli zastósowane mi bydź mogą bez lub z dodatkiem alunu. W pomoc takóž przybrać do okoliczności i enemy robione z odwaru kurzego ziela, np.



wiąść pół łota do wody kwaterki, gotować do połowy, przecedzić, i na dwie enemy podzielić, dając iedną z rana, a drugą pod wieczór.

Dyeta przy téy bieguncce powinna się składać z rosółów nietłusłych wołowych, niekorzennych, ciętych, z ryżem, wszystkie artykuły żywności kleistey natury, o których się już przy biegunkach mówiło: dla możniejszych tak zwana kasza Segu. Za napój woda Salcerska i t. p.

Jeszcze nakoniec są skutkami przytomnych robaków w żołądku i kiszki biegunki, lubo takowe stosownie do przyczyn leczycy wypadło, że zaś umorzenie iako i wyprowadzenie robaków nieraz bywa trudne iak długiego czasu potrzebujące, po przekonaniu się dostatecznem o ich w tychże częściach bytności, wypada pierwey leczyć biegunki, do czego i względne razem dołączyć można środki np. proszek nasienia wrotyczy (*semen Tanacetii*) (*paprocki sanica*) (*filix mas*) wierzby, łoziny, każdego w równych częściach, np. po pół łota zmieszać i młodszym dzieciom dawać na koniec noża 2. lub 3. razy, starszym po dwa razy tyleż w wodzie czystey, a napo-

jami kleiowemi powyżey położonemi popiić.

### Przestrogi.

We wszystkich tu gatunkach biegunek wypada mieć wzgląd na dwie ważne okoliczności, z tych iest:

*Pierwsza.* Zachować się w przyzwyczajonych dyetach, które w téy materii podałem, takowe ściśle dochowywać, po ich nawet ustaniu czas nie mały przy nich pozostać, zwolna postępować i powracać do brania potraw i napoiów, których w stanie zdrowia się używało.

*Druga.* Przy początkowych biegunkach na ich zatrzymanie wraz nie używać olejów lub tłustych rzeczy, iako to się dziać zwykło często, że dajemy tłusto pić olęj lniany, masło, oliwę i t. p. nie dawać korzeni ani z niemi żadnych przypraw, iako to: pieprzu, angielskiego ziela, cynamonu, kwiatu muszkatolowego, galki z winem lub wódką, a z leków zaś Dryakwi Weneckiey, lub Konfektu z polnego czosnku (*teucrium Scordeum*). Przez te i tym podobne środki niewiadomi dobroczynnych natury zamiarów, przez które w początkowych bie-



gunkach uwolnić się z szkodliwościów znajdujących się w żołądku i kiszkiach usiłując, zrzucić nader łatwo można daleko niebezpieczniejsze od samych biegunek choroby, iako to: silne kolki, obrzmienie twarzy, rąk, nóg, opuchliny podskórne powszechne, a nawet i wewnętrzne, zatkanie wnętrzości, wątroby, śledziony, gruczołków kaldonowych, a nawet zapalenia żołądka, kiszki, i samą nawet apoplexyą nerwową.

### *O Dysenteriach.*

Różni się od biegunek dysenterya przez febry przytomność, która iey towarzyszy, iakoż przypadłości są charakterystyczne, zimno, gorączka, silniejsze lub mniejsze, nudności, pragnienie, gorycz w ustach, boleść w żywocie, i te się powiększać zwykły początkowo; stolce odchodzą rzadkie, wodniste, kleiste, oblicie z krwi żyłkami, a każdy ich odchód połączony bywa z boleściami żywota przy nieustannem chceniu, mocne wydymanie się dokuczające, niekiedy i robaki przy tych stolcach odchodzą odpływy  
cza-

czasem nie tak częste, a czasem tak częste bywają, że w godzin dwadzieścia cztery następuje ich do 100. Kiedy dysenterya do najwyższego stopnia dochodzi, sama nawet krew ciekąca lub też zgęsniona odpływa, iakoż w tym już stopniu następują obrzmienie żywota, wyniszczenia ciała, sił opad zupełny, spazmy, i sama śmierć. Choroba ta trwa dni kilka, niekiedy znowu kilka tygodni, przyczyny ią zrzadzające są zbyteczne upały, dżdżyste lato, własność szczególna powietrza, a oddawane stolce zarazy uczestnictwo mają, i do rozszerzenia się znacznie przykładają, dla tęg też przyczyny nader wielką ostrożność zachować radzę, aby miejsce, na które choroby do oddania stolców chodzą, lub kiedy już chodzić nie są wstanie, nikt do nich pozbywając się stolców swych nie chodził. Zwykła ona dość często bywać zgnitęj natury, i ta iest pomiędzy inne iey gatunki najzaraźliwszą, niekiedy żółciowęj i nerwowęj. Leczyć wszystkim zapobiegać dzielnie i wcześniej potrzeba. Szkodzą zatem w najwyższym stopniu rozgrzewającej natury napoje, iako to: wina, araki, wódki, równie szkodzą i pokarmy do



strawności za ciężkie, iakoż osłabienie żołądka, kiszek, ile wtenczas, stan powiększonéy drażliwości jest przytomny, znacznie szkodzą, i do iéy trwania przyczyniają się, początkowy zaś a do tego roztropny ratunek w tych trzech dysenteryi gatunkach dalszemu wzrostowi, a zatém i niebezpieczeństwu życia silnie zapobiega. Skoro się zatém okaże, niebawnie dać proszek z ipekakuany co do wieku iak się to przy biegunkach wyżey podało, do tego chorzy ciepło trzymać się powinni, ale lepićy ieszcze kiedy w łóżku pozostaną, za napóy dawać in lnianą wodę, któręy przepis robienia przy biegunkach, a nawet i w wyborze roślin krajowych umieściłem, i to letnio, do téy wody z lnianego nasienia można część małą np. do kwarty łyżeczkę od kawy wpuścić kamienia winnego, i zmieszawszy, dać pić starszym, a młodszym dwie lub trzy części téyże wody z czwartą częścią mleka. Równie służą i tu owe wzwyż podane sztuczne mleka z bani, ogórków, nasion, do których kwarty dodać można kleiu z storczyka, filiżankę, i pić często po łyżce lub pół filiżanki, stosując się w tém do wieku. Gotowanie także kwaśnicy, osłodzone

za napóy dobrze służy. Za posiłki, rosoly nietłuste ani korzenne z żółtkami od iay zabite, albo kasze kleiowe, nie zaś z mięs nieużywać. — Z leków zaś, czynić powierzchowne żywota okładania, które nie dopuszczają żołądku zaziębnienia, iako to: kasza ięczmienna, owsiana, gotowana z wodą, mlekiem, do których można latem garści dwie dobre świeżych przybrać szaleiu czarnego (*Hyosciamus niger*) a zimą suszonego. Takoz i enemy służą raz lub dwa na dzień z mlekiem z żółkiem od iaia, z wody, z lnianego nasienia, kleiu kaszy ięczmiennéy z dwoma łyżkami oleiu lnianego. Z leków zaś wewnętrznych służą następujące lekko ściskające, iako to: zioła rzepak (*agrimonia*) czosnek polny (*scordeum*) liście dębowe, kwiatu różowego, wierzbin, łożiny, wziąwszy któregokolwiek z tych, lub i każdego, po garści dobréy, pokraiawszy drobno w kwarcie wody gotować do zostania się połowy, do tego odwaru dodać wody z lnianego nasienia wyżey nadmienionéy, i kwasu solnego (*acidum mariaticum*), kropli 20. 30. osłodziwszy cukrem lub sokiem lukrecyowym, zmieszać, i dawać co parę godzin po pół łyżki młodszym, star-



szym po łyżce, a jeszcze starszym o tymże czasie po dwie łyżek, na przypadek upartości następujące iako bardzo skutkujące w pomoe przybrać radzę: suszone jagody czarne w wodzie gotowane, np. dobrą garść wygotować w półtory kwarty wody do zostania się kwarty, przecedzić, osłodziwszy cukrem pić za napój, lub mieć tak skuteczne z nich powidła, dawać po łyżce od kawy dla młodszych, a po dwie dla starszych, co dwie godziny zieść i popić wodą: można też i pół łyżki do całej rozpuścić w kwaterce wody, i dawać po łyżce, w tymże czasie przybrać w pomoc kory wierzby, łoziny, kasztanów dzikich, a nawet i dębowe, z których wzięwszy np. łót jeden, dwa, gotować tymże samym co powyżej sposobem, i do tych odwarów także można dodać wody z lnianego nasienia drugą połowę, zaczawszy od pół łyżki do całej, a starszym i po dwie w też same godziny. Z wielkim skutkiem służą pół kąpiele letnie, to jest po za pępek nieco, i do nich radzę przybrać kory też same po garści dwie, trzy, mocno gotować, przecedzić, rozтворzywszy wodę, aby wolna była, dać siedzieć pół godziny raz lub dwa dniem. A gdyby i te środki

za słabo skutkowały, można do nadmienionego kor gotowania, np. do kwaterki iednéy rozpuścić alunu czyśczonego pół, a dla starszych i całą kwintkę, także dawać po pół do całej łyżki, często podług skutku, a ten gdyby nastąpił, spóźniać toż branie potrzeba, a zupełnie poprzestać, iak tylko nie ma znaków odeyscia krwi, wszelako przy użyciu odwarów powyższych, rozpoczynszy ich branie, czas nieiaki pozostać radzę. Można nadto i Synopizma Nr. 18. na brzuch i lytki na przemian przystawiać, aby drażnienie skóry uczynić, a przeto i cieków przypływ do tego tak ważnego organu zdziałać. — Dyetę powyższą radzę jeszcze kontynnować, a nadto powoli do twardszych pokarmów przystępować, do niéy to jeszcze w czasie trwania dysenteryi papki mączne, żytnie, na posiłek zalecam.

Przed opuszczeniem téy choroby, jeszcze powtarzam, ażeby stolce wylewać na oddalone miejsca, zaraz ie głęboko przysypywać ziemią, wapnem, popiołem. Naczynie takowe dobrze ukropem za każdą razą wyparzać, i to zawsze powtarzać, ile razy chory sam lub też osłabiony na niego swoją odda potrzebę, równie ostrożność zacho-



wać radzę nawet z kanką, którzy się do dawania enemów używa, aby przez nie innym nie dawać takowych, wystrzegać się obmierzliwości, i pościeli, bielizny chorego, ponieważ i te do zarazy, lubo nie tak iak stolce przyczynić się mogą, nie zapominać także o czystości powietrza i jego odświeżaniu w izbie chorego, a nawet radzę pokrycie chorego, podłogę, octem kamforowym często przez dzień pokrapiać.

### *O wyschnieniu ciał dzieciennych.*

#### *(Atrophia Infantum).*

Samo nazwisko daie poznać charakter tej choroby, która niekiedy okazuje się po odstawieniu dzieci od piersi, oznakami iéy zwykłemi są twardy wygórowany lub też i wciągnięty żywot, mocne uszkodzenie w całym trawności mechanizmie. — Nicraz téy chorobie towarzyszy niedosycony apetyt, szczególniéy do chleba i innych pokarmów mącznych, lub też wstręt do iadła, a w końcu i zupełna iego utrata. — Jeszcze się do czasu utrzymania pełność twarzy, chociaż rączki, uda i nóżki zaczynają niszczyć, skóra

właśnie marszczeie, fałdków nabiera, albo zatkania stolca towarzyszyć zwykły, lub przyłącza się biegunka, a ta kiedy trwa i w leczeniu iest upartą, powszechnie całe silki wyniszcza, albolitę i obfite poty przy napadach febry i gorączki, życie przecinaia.

Są ieszcze i inne oznaki towarzyszące temu ciała wyschnieniu, iako to: częste na stolec chcenia, boleści żołądka, po brzuchu uczuwać się macaniem daia twardawe wyniosłe nieco zawalki brzuszne (*glandulae mesentericae*), przyłączaią się osłabienia coraz powiększaiące się, bledosc twarzy, obrzmiałość nówek, rąk, a potém i całego ciała. Przyczyny naypospolitsze téy choroby są, uszkodzona trawność z przyczyn zapchanych powyżéy nadmienionych brzucha zawalków, osłabienie coraz wzrastaiące, powszechne iako i żołądka, kiszek, zawalków, niedogodne zdrowiu i iemu nader szkodliwe pokarmów użycie, iako to: chleba osobliwie świeżego, w którym też naywięcéy smakuia, zacierki, klóseczki guiecione, kartofle i t. p. Wszystkie staią się daleko szkodliwszemi, kiedy dzieci doroslejsze nie używaią świeżego powietrza i ruchu.



*Leczenie.*

To im prędkiej iest rozpoczęte, czynić może nadzieję do zdrowia powrotu, iak nader wątpliwe, spóźnione, a tém bardziiej zupełnie zaniedbane. Główną czynią podstawę ratunku u przątnienia zupełne zapchania gruczołów brzusznych, wzmocnienia doskonałego narzędzi do trawności służących, i urządzenia przyzwoitej dyety, bez której pożądanego skutku nigdy spodziewać się nie można.

Srodki ku temu celowi są następujące: kąpielki z mydła, które poraz codziennie czynić radzę, nie powinny być ani za ciepłe, ani za chłodne, lecz tylko dobrze wolne, półniżej zaś coraz zimniejsze, wcierania w żywot oleju lnianego np. łyżek dwie, pół łyżki mydła taslowego dobrze przesuszonego, kamfory 20. ziarek na proszek starty, zmieszawszy, smarować cały żywot rano i na noc, jeżeli kąpać się mają dzieci z rana, coby było skuteczniej, smarowania czynić w dobre pół godziny po kąpielce, z wielkim użytkiem służą enerków dawania z rosółów i żółtka od iaia, a te nie mają być większe nad filiżankę. Takowe enemki dopomagają żywności,

i znacznie choć przez też drogi pośpieszniejszą czynią, za nim zapchania zawałków brzuszne rozwolnionemi, i dobra trawność przywróconemi nie zostaną, a do tego dzieła długiego czasu potrzeba, gdy tém czasem coraz z ciała i sił spadają. Jak tylko zmniejszają się i niknąc zaczęły owe twarde brzucha zawałki, pół garca siodu mielonego, garść dobrą chmielu, gotować mocno, przecedziwszy, rozrzedzić wodą, aby była wolną, i w tej kąpielce codziennie świeżo robionej, siedzieć mają choć pół godziny, nadto przynajmniej nie dziel 4. 6. mają być kontynuowane.

Z lekarstw wewnętrznych dla dzieci młodszych nie miałem skuteczniejszego nad krople rhabarbarowe, które dawać im radzę po małej od kawy łyżce raz lub dwa na dzień, niezawadzi, choćby w dzień miały po raz, dwa stołeczki. — Dla starszych znowu też same krople po pół łyżki tyleż razy, dalej jeszcze starszym dla zdziałania pośpieszniejszego skutku wziąć następujące zmieszanie, np. wyciągu (*Sucus Taraxaci inspisatus*), wołowego oka pół do całego łota, wody czystej pół kwaterki, kropli rhabarbarowych z wodą lub winem robionych łyżek 3. 4. osłodziwszy, dawać



po 2. lub 3. razy na dzień, to jest: na godzin dwie przed, w 4. po iedzeniu, i na noc spać idąc, popiwszy albo wodą czystą lub herbatą z rumiankowego kwiatu. Można takż dzieciom starszym z wielkim użytkiem dać rano na śniadanie, i po obiedzie w godzin parę kawę z samey żołądki do picia sposobem zwyczajnym robioną, aby tylko nie była zbyt słodką.

Nacierania całego ciała chustą, flanelą, które w przód albo natrzeć kamforą, lub okadzić nad dymem macierzanki, lewandy, rozmarynu, melissy, miętki. — Na dyetę służą rosóły nie tłuste dobrze przestudzone z kaszami kleiowymi, grzankami, lub z żółtkami od jaj, ich żółtka miętko gotowane. — Dla starszych marchew tarta, szpinak drobno siekany, łoboda, gdzie się znajdują szparagi, kółek, sałatka (*valeriana locusta*), te wszystkie z masłem niestarłym gotować, równie można im dawać pieczone mięsa wołowe, i te lepiej służą niż gotowane; — drób, wyjąwszy kaczkę, gęsi, ale i te nie powinny być tłuste, a do tego dobrze pożute, wstrzymać ich należy od użycia chleba, a tym bardziey świeżego, za napój woda czysta, w której ugasić można goź-

dzi wielkich, kilka razy dobrze upalonych, dla możnych dawać takż razy dwa, osobliwie przy iedzeniu lub i po niem po łyżce 1. 2. do 3., starszym nieco więcey porteru, takż odwar z iałowcu, dla pospółstwa za napój użytkiem dawać. Oprócz tych środków używanie świeżego powietrza i ruch do wieku stosowny dzieinnie leczeniu téj choroby dopomagają.

### O Wymiotach.

Wymioty u dzieci przy piersiach zostających często napadać zwykły przez przessanie się pokarmem, przy wyrzynaniu się zębów, przez kwas żołądka, gniew, i popełniony błąd w dyecie pokarmiających, nieraz są one Symptōmem nastąpić mianych wyrzutów, ospy, odry, szkarlatyny i t. p. dla tego z daniem rady niepośpieszać się, pokąd się dostatecznie nie zawiadomi, czyli takowe wyrzuty odbyły dzieci lub i starsze, równie iak wiedzieć, czyli właśnie te lub owe wyrzuty panują, albo czy nie pochodzą takż od bytności robaków w żołądku i kiszkiach, w starszych i dorosłych



od mieszaniny potraw sobie przeciwnych, np. przy kwasie mleczym, ilości i natury ich przewyższających siłę trawności żołądka od nadużycia trunków rozgrzewających, bywają także iako Symptoma zapalenia żołądka samego, albo poblížszych części, i w tenczas tak bywają natarczywe, że żadnego lekarstwa, choćby nawet czystej wody żołądek nie przyjmuje, a nieraz przylacza się i czkawka, febra silna, gorączka, małaczenia, zwłaszcza u dzieci młodych krwistych, dobrze żywnionych, pomniejsza u dzieci słabowitej konstytucyi, towarzyszą kaszlowi tak zwanemu spazmotycznemu (*Tassis convulsiva*) powyżej umieszczonemu, wypadkom przełknięcia, gniewu, i złości, potraw niestrawnych, ich nadużycia, i w tenczas daie się uczuwać nieiako łechcące uczucie około żołądka, to się przedstawia najczęściej po iedzeniu lub po pełnionym błędzie w dyecie, a równie pochodzić mogą od zamuleń, nieczystości żołądka flegmistycznych, kleistych, żółciowych, iak pochodzić mogą od zaziębienia nóg, i przy mocnych katarycznych cierpieniach,

## Leczenie.

Zawsze się stosować powinno do przyczyn, a tak jeżeli przy piersiach zostają dzieci, służy proszek Nr. 1. z tego nakoniec noża w pokarmie dawać podług potrzeby co pare godzin, i popić dać pokarmem, starszym np. 3. 4. i t. d. miesiącach największy koniec noża, a matki lub karmicielki w tenczas zachować się mają w dyecie, iak się dla nich w Części pierwszej, Rozdziałku drugim, Częstce szóstej podało. — Można także przykładać na żywot miętkiew, iaka się w domu znajduje na w pół z piołunem iak materacyk, nie zawadzi także dać enemkę z rumianku, kleiu z kaszy ięczmienniej lub otrębów, z masłem słonem, olejem lnianym, oliwą. — Jeżeli od robaków, dawać enemki z proszku korzenia kozłka, którego wziąć można łyżeczkę od kawy do poł filiżanki wolnej wody, mleka zwolnionego, i takowe dawać raz dzień, do zażywania zaś proszek nasienia wrotyczy, np. drachmę iedną, i tyleż cukru zetrzyć na proszek razem i zmięszać, dla starszych np. od roku 1. po łyżce od kawy raz dać na dzień, a przy tém i enemki tu podane albo z czosnku i mł.



ka, smarować żywot cały pare razy na dzień wołową żółcią do w pół wyparowaną. — Jeżeli znowu pochodzą od mięszaniny potraw, przeladowania żołądka, lub użytku niestrawnych, nie radzę ich zaraz wstrzymywać, są one wtenczas usiłowaniami natury, równie iak przy flegmistycznych, kleiowych, lub żółciowych, a te naylepięj się znoszą przez dyetę, nie używać żadnych do strawienia twardych pokarmów, tłustych, pozostać tylko przy owocach suszonych, gotowanych, lub świeżych dojrzałych, obranych, wszelako niedosytości, rosółach nietłustych, kwasami roślinnemi do miłej kwaskowatości zaprawnych, iako to: z barszczami, sokiem cytrynowym, kwaśnicy, kaszach kleiowych, za napóy zaś woda z grzanką, temiż samemi kwasami zaprawna, lub z niemi kleie z tychże kaszów cienkie. — Dla starych nieco za napóy służy lemoniada z kamienia winnego, np. wziąć łyżkę samego, wsypać do kwarty wody wrzącej, zmieszać, żeby w nięj mokił do ostygnięcia, czysto zlawszy w naczynie, osłodzić, i pić po pół filiżanki trzy lub cztery razy na dzień, oraz i proszek Nr. 6ty. — Służą także moczenia w wrzącej wodzie miętkwi, melis-

sy, iak herbata do picia, a w upartościach przybrać w pomoc kropli Nr. 3. z dodatkiem Spiritus nitri Dulcis w części trzeciej, i z tych po 15. do 20. kropel w łyżce wody co półtóry godziny brać, i herbatą z miętkwi popić, przez te środki usmierzaia się wymioty, a na wzmocnienie żołądka służą lekarstwa umieszczone przy biegunkach i dysenterjach, pochodzące zaś od zapalenia żołądka, te iako Symptomy uważane, leczyć się powinny iak samo zapalenie, a o tém przy febrach zapalnych mówić się będzie, gdzie środki podane zostaną. Od przelęknienia zaś wszczęte wymioty usmierzaia się, dając młodszym po łyżce wina Francuzkiego, starszym po dwie, a ieszcze starszym po łyżce, i dać co pare godzin, pokąd nie ustaną. Dobrze także służy Spiritus nitri dulcis, Likwor Anodini, po 15. do 20. kropel co pare godzin na cukrze zżuć, i wodą popić. Wymioty znowu żołądkowe przez wzmacniające rzeczy leczonemi bydz muszą, a że te iuż powyżej podalem, użytek zatem ich i w tym gatunku wymiotów zalecam.



*O wystąpieniu kiszki stolcowéy.**(Prolapsus intestini recti).*

Samo nazwisko czyni go nie trudnem w poznaniu, a bywa skutkiem ciągłych i częstych biegunek, nieraz i dysenteryków, lub też przy oddawaniu ciężkiem stolca twardego, a nie tak rzadko pochodzi i od mocnego upadnienia. — Wszystkie zatym przyczyny osłabiające muszkuł obrączkowy téy kiszki, wyprowadzają wystąpienie iéy, iakoż zwykło nieraz i przy ciężkim rodzeniu przystępować. — Najskuteczniéy się zapobiega, kiedy w razie użycie się środków do tego służących, a te są następujące.

*Leczenie Ręczne i Lekarskie.*

Ręczne, kiedy się około palca obwinie cienkie płótno, i powoléy się wprowadzi, aby téy kiszki nie obrazić, jeżeli przy oddaniu stolca już trwa długo, nawet i przy oddawaniu wiatrów można kompresse z płótna cienkiego razy kilka złożonego na toż miejsce skropiwszy przez dzień często

albo

albo pontakiem, albo odwarem korzenia kurzego ziela (*tormentilla*), kory dębowéy, kasztanu dzikiego, wierzby, łoziny, dla możniejszych i China, co czynić wypada przy ciągłym téyże kiszki wystąpieniu, można też kompresy maczać w zimnéy wodzie, nadto często toż miejsce nią przemywać, a żeby się zaś powyższa kompressa utrzymała, zrobić pas na trzy lub cztery palce szeroki z płótna, któryby do koła brzucha obstawał, a porobiwszy w nim od przodu dziurki obrzucone, naprzeciw którym przyszyć parę, trzy guzików podług szerokości pasa, tak opiąć, aby żywot znacznego niedoznawał obcisku, np. na trzy palce odległe, od tyłu zaś przyszyć pas poprzeczny szerokości 3. lub 4. palce, którymby kompresse wzmiankowaną przycisnąć można, prowadząc tenże ku przodowi, i tam do pasa około brzucha idącego przymocować. — Cały tego pasa opis może bydź z literą T. porównanym.

Dla utrzymania czystości można takich pasów mieć na odmianę kilka. Bywa wszelako też kiszki wystąpienie co do iéy wprowadzenia nie tak łatwe, a co przystępuje, kiedy

Część II.

10



nie zaraz wprowadzenie iéy następuje, iakoż zwykła obrzmiewać i dokucać nieraz tak mocno, że małe wzruszenia febryczne, a nawet i znaczniejsze przystępują, wtenczas nie można wprzód pomyśleć o iéy wprowadzeniu, ale trzeba, żeby chore dziecię w łóżku leżało, kışkę zaś okładać kataplazmą z lnianego nasienia i mleka robioną, co czynić należy, pokąd obrzmienie i boleść nie ustąpią, wtenczas można nieco oliwą lub masłem młodem kışkę nasmarowawszy, powoli wprowadzać, znowu opaskę założyć, i którą też długo nosić wypada, jeżeliby jeszcze przy oddaniu stolca miała z miejsca swojego wychodzić, a za postrzeżeniem radzę jeszcze do koła bardzo miłąkiem proszkiem z Chiny, kory dębowey, wierzby, łoziny, posypować. — Jeżeliby zaś przez twardość stolca i iego odchód tenże wychód trwał, radzę, aby niekiedy dawać enemy ułatwiające stolce, z wody rumianku, kleiu z kaszy ięczmiennéy, z oleiu lnianego, w przypadku iego kilkodniowem wstrzymaniu, nie używać potraw tenże stolec wstrzymujących, iako to: ciast, klósek, i innych mącznych, iak nie byđz dalekim od częstego wody lub zwyczajnego napoiu picia, kawy, co

potocném bywa dla ułatwienia stolca i t. p. daię tę przestroę, że iaki z tych napoiów muiéy służy, i do wstrzymania stolca dopomaga, od użycia takowego wstrzymać się wypada, iak pozostać przy tych, które z doświadczeń własnych do wstrzymania stolca się nie przykładają, i owszem ułatwienie iego sprawują.

*O boleściach w żołądku, kışkach  
i wiatrach.*

Pochodzą te cierpienia od gniewu karmicielek, wykroczenia w jadle, przełknięcia u dzieci przy piersiach zostających, od wstrzymania stolca, równie iak i u starszych z téyże przyczyny, albo też z użycia potraw wiatry sprawujących, napoiów nie dobrze wyrobionych. — Z tych to przyczyn pierwéy położonych, te boleści daleko silniejsze u młodych dzieci bywają, z powodu znaczney drażliwości, którą są uposażone, że dość często mimo rozděcia żywota, krzyczą, silnie się unoszą, rzucają nóżkami, w gorączki silne i nieraz konwulsye wpadają, u starych zaś dzieci, dorosłych, chociaż



tych gwałtownych wzruszeń nerwowych nie ma obawy, lecz przystąpić krótkie tchnienie, odbijania, rozdęcia żywota, iego twardość, kolki wietrzne, głowy bóle, febra, gorączka.

### *Leczenie.*

Dla dzieci przy piersiach zostających jest, aby karmicielki w celu uniknienia tak dokuczających dla niemowląt boleści, i wystawiania ich na niebezpieczeństwa utraty rozpoczętego życia, nie dawały ssać piersi zaraz po gniewach, ale ile bydy może z pokarmu je uwolnić, i dopiero nowo wydzielonym dzieci pokarmiać, gdy tym czasem na zaspokojenie wzruszeń nerwów, napić się powinny melissy, rumianku, jako herbaty po razy kilka, tymczasem napastowanym od boleści, torsiów, dzieciom skuteczną uczynić pomoc, to jest: dać enemkę z rumiankowego kwiatu, jedną i drugą podług potrzeby, żywotek okładać gotowanym w wodzie rumiankiem, co często czynić wypada, można też i samego rumianku, cukrem osłodzonego, dawać często dzieciom po łyżce. Smarować cały żywot olejkim ru-

miankowym gotowanym, do którego np. łótów 1. 2. dodać olejku przekro-pionego kminkowego, kopru włoskiego, miętki swoyskiej lub pieprznej, któregokolwiek z nich kropli 20. i kam-fory, tyleż pieprzu ziarek, zmiesza-wszy dobrze, smarować żywot co go-dzina, dwie podług potrzeby, niedość przy tem, zalecam i kąpialki ciepłe, wreszcie niezawadzi zaraz wrazie tego przypadku, to jest: kiedy dadzą przez nieostrożność głodnemu dziecięciu ssać piersi, dać w łyżce od kawy rumian-kowej herbaty, proszku ipekakuany, od 1. ziarka pieprzu, starszemu zaś nad kwartał dwa ziarka, a dalej do trzech pieprzu ziarek, i dla pozbycia się prędkiego szkodliwej natury z żo-łądka pokarmu, bynajmniej się tu o kilka lekkich wymiotów obawiać nie należy. — Dla starszych znowu dzie-ci już odstawionych od piersi, które już o swoim pożywieniu utrzymują się, w przypadku przeładowania żołądka potrawami niestrawnymi, lub w nadu-życiu ich, chociaż nie tak z natury, ia-ko raczej z ilości szkodzić mogących, wrazie dawać proszek nadmieniony takż w rumianku od 3. do 6. i 8. zia-rek, co do wieku aż do 3. 4. i 6. ro-ku, na przypadek gdyby ieden nie



miał dostatecznie skutkować, w parę godzin dać drugi raz w połowie ilości, iak był pierwszy wzięty. — Po wymiotach napastujące jeszcze boleści rozdęcia żywota; usmierzyć można proszkiem Nr. 1. którego dla dzieci do dawania przeznaczyłem, albowi też kropel z rhabarbaru po łyżce od kawy dla starszych od kwartalu do pół roku, a starszym po dwie co parę godzin, co 3. podług potrzeby dawać, w końcu i dla nich nader będą użyteczne kąpiałki, iak się to powyżey namieniło.

#### *O zatrzymaniu Stolca.*

Przy piersiach dzieci podlegają temu dość często z przyczyn rodziców, kiedy iedne z nich do tego bywają u-  
sposobionemi, lecz pochodzić może od gęstości pokarmu, od użytku przez karmicielki mącznych potraw, zwłaszcza kiedy te żadnego kisenia nie-  
przeszły, od szczupłego napoiów uży-  
cia, potraw korzennych, trunków zbyt rozgrzewających, braku ruchu pokar-  
miających. U starszych znowu oprócz téj wady od rodziców odziedziczonéj pochodzić może od użytku pokarmów

grubych niestrawnych, chleba świeżego, kartofli i t. p.

Z obojga tych przyczyn powstają wiatry, rozdęcia żywota, boleści iego, a nieraz i wymioty u dzieci przy piersiach zostających; okazują się daleko siłniejsze, wszelako nie są wolnemi od nich i starszego wieku dzieci, zwłaszcza kiedy bywają za długo wstrzymane stolce, nieraz i u tych przyłączają się silne boleści, wymioty, febra, gorączka, boleści żywota, zapalenia żołądka, kiszek, niebezpieczeństwem życia zagrażające. — Dla dzieci przy piersiach radzę, aby karmicielki wystrzegały się używać powyżey tu nadmienionych pokarmów, a zamiast ich często gotowanych śliwek i iabłek, lub z nich robionych powideł, iezeli im mleczywa robią wolne stolce, tych takż używać powinny. — Dzieciom zaś przy piersiach dawać enemki z rumianku, kleiu kasz owsianey, ięczmienney, otrąb, z masłem, oliwą, oleiem lnianym, lub z serwatki, okładać żywotek często gotowanym w wodzie rumiankiem, do czego kawałek mydła rozpuścić, używać takż mydlanych kąpiałek, a do zażywania wewnętrznego naydzielniéj służy proszek, którego że oprócz wolne sprawia stolce, ale



nawet do ich ułatwienia przysposabia. Wziąć mydła Weneckiego niestarego, lepiej białego np. ziarek 5. 6. do 10, 20. zaś do 30. proszku liławkowego korzenia, cukru twardego pół łóta, zmieścić wszystko na proszek, i z tego dawać dzieciom przy piersi na mały koniec noża dwa lub trzy razy na dzień, dla starych na dobry koniec noża, po uwolnieniu stolca do dalszego użytku w potrzebie zachować, aby nie w cieple, ponieważ zwykły gorzknąć. Oprócz téj własności, uśmierza on boleści, i wiatrom odeyscie daleko łatwiejsze czyni z téj przyczyny pochodzące. Starszym znowu dzieciom dawać nieco mocniejsze enemki z powyższych rzeczy robione, z dodatkiem soli kuchennéj, lub masła słonego, a nawet i w upartości mały kawałek mydła w nich rozpuścić, i takowe raz lub dwa na dzień, a nawet i częściej dawać, lub i z serwatki robić kąpialki, rhabarbarowe krople po łyżce na raz, a jeszcze starszym po dwie od kawy, do otrzymania skutku. W czasie boleści, twardości żywota, nie zaziębiać okładania, które powyżéj są podane, i owszem takowe często odmieniać, zawsze jednak być mają dobrze ciepłe.

## O wstrzymaniu Urynki.

(Stranguria).

Dzieci i starsi z różnych przyczyn podlegają téj chorobie, o ostatnich w inném miejscu pisma tego mówić się będzie, a tu o dzieciach przy piersiach, i starszych od nich.

Przyczynami do tego być mogą, wstrzymanie stolczyka, wiatrów, użycie trunków gorących przez karmicielki, a nieraz i z zaziębienia nóżek, żywota. — Silne te boleści towarzyszą chceniu urynowania, gdzie ta ciecz w małej ilości po zagrzaniu ciała odpływa, lub też i wcale wstrzymaną bywa. — Co prędzéj zaradzić temu potrzeba w sposób następujący.

## Leczenie.

Kąpialki ciepłe często dniem powtarzać, a po między niemi na łonko nieustannie przykładąć ciepłe mleko, lub też robić papkę z białego chleba, mleka, masła niesłonego, i szafranu, a w niedostatku tego, liści szaleiu świeżych, lub suszonych drobno pokraianych, garść dobrą, gdzieby nie było



bulki, lniane nasienie przetłuczone takż na papkę sposobem opisanym robioną na toż miejsce przykładać, enemki dawać często z mleka słodkiego i masła, a karmicielkom radzę pić mleka sztuczne z nasion bani i ogórków, lub z lnianego nasienia wodę, który sposób robienia wyżey inż iest podany. — Wewnętrznie zaś dzieciom dawać odwar z dziewanny kwiatu, cukrem osłodzony na w pół z śmietanką często połyteczce, 2. lub ile chcą z tego napoju do siebie przyymować. — Odstawionym znowu od pierśi, lub i starszym dzieciom równie w tenże sposób dopomagać radzę, lecz że inż same używać mogą lekarstwa, a zatym też mleka sztuczne wyżey podane z nasienia konopi, wodę lnianą, lub na przypadek obmierzliwości, użyć picia odwaru z korzenia storczyku (*radix orchis morio*) albo kleie z kaszy ięczmiennę, owsianę, które z dodatkiem korzonków pietruszki gotować, cukrem osłodzone, za napój dawać.

Można takż z niemałym skutkiem wziąć oleju lnianego, świeżo prasowanego, oliwy przednię w niedostatku oleju, migdałowego łyżek 3. 4. z żółtkiem od iaia, iak naylepię, doda-

jąc po trochu oleju, zmięszając cukru stłuczonego łyżek dwie, i z tego mięszania dawać po sporę łyżeczce od kawv często, można takż rozcięczyć tę mieszaninę wodą czystą lub kleiem z kaszów tu wymienionych, np. kwarterkę, saletry czyszczoney na proszek ztartej na koniec noża, zmięszawszy iak naylepię, dawać często po pół filiżanki pić. gdzie iest pod ręką (*Spiritus nitri dulcis*) pomiędzy tém mieszanieniem dawać w łyżce wody po 10. do 15. kropel, w upartém iednak téj choroby trwaniu wziąć stronę kwintę, przeciągnąć w wosku roztopionym kilka razy, po zastygnięciu za każdym razem i z tego kawałek urznawszy, gładko wytrzeć masłem niesolonym, lub oliwą, oleiem, co iest pod ręką z rzeczy tłustych, aby te nie były stare, posmarować, i w kanalki urynowe nie głębię iednak iak na cał, półtora wprowadzać i nazad wyprawdzać, dla uczynienia łechtania w tychże kanalkach, wszelako przestrzegam, aby głębszego wprowadzania nie czynić, a w potrzebie częstszego, głębszego, znawcy przywołać.



*O mimowolnym urynki odpływie.**(Incontinentia lotij)*

U dzieci przy piersiach jest, iak bydź musi zwyczajnym, i o tym tu się nie mówi, a zaś u starszych przy zaniedbanu początkowem staie się obrzydłym nałogiem, któren i pozostać może tak w stanie czuwania iako i w nocy. — Przyczynami tego bydź mogą zaniedbana okolo dzieci czystość, i niewczesne ich do wstrzymywania wprawienie, iako i przydługie wstrzymywanie urynki, przez co napętniony mocz pęcherz wraz z swoim ściskającym muszkułem, utracą swą sprężność, a zatym i moc ściskania się czyli osłabienia, a co zwykło przystępować im częściej i dłużej takowe odpływy wstrzymywanemi bywają.

*L e c z e n i e.*

Jego stosuje się do usunięcia przyczyn, które też mimowolne odpływy zrzędały, a tak jeżeli od nieczystości kąpielki, a przynajmniej ciała obmywania wodą letnią czynić, pod noc osobliwie nie dać wiele pić dzieciom

równie iako i w nocy do picia nie przyzwyczaić, unikać dawania słonych i korzennych potraw wiatry sprawujących na obiad, tymbardziej na wieczorny posiłek, temi bowiem napętnione kiszkki znacznie się do tego przyczyniają, trunków rozgrzewających dawania niedopuszczać, twar do sypiać, a jeżeli już przystępuje osłabienie, zaniedbać nie wypada, aby się też miało wkorzeniać, obmywania miejsca łonowego zimną wodą czynić, często w nię maczaną gębkę na też przykładć zwolna i kąpień całego ciała w wodzie zimnej w pomoc przybrać po raz na dzień. — Z wewnętrznych znowu leków służą lekko ściskające z ziół odwary, iako to: rzepek (*agrimonia eupatorium*) liści dębowych, złocien, krwawnik (*achilea millefolium*) kwiat iego, róży ogrodowej, wziąwszy którego się podoba, lub razem pomieszać po garści, gotować w pół kwarcie wody czystej, do zostania się połowy, przecedzić, osłodzić, i dawać po łyżce, starszym po 2. 3. 4. razy na dzień. — Gdyby te lekko zmniejszające rzeczy za słabo skutkowały dobrać do robienia tego odwaru kory wierzby, łoziny, kasztana dzikiego pół uncji; wreszcie gdzieby



wypadało mechanicznie dopomódz, tam się do porady znawcy udać potrzeba.

### *O Żółtaczce dzieciennéj.*

#### *(Icterus infantum)*

Często z tą chorobą przychodzą na świat dzieci, kiedy zwłaszcza matki w czasie ciężaru doświadczały zgryzot, zmartwień, smutków, nędzy, niedostatku i t. p. lub jeżeli w tychże smutnych położnicach znajdowały się pokarmiające osoby, o innych żółtaczkach, napadających dorosłych i starszych oddzielnie się mówić będzie, a tu tylko stanieny przy dzieciach zostających przy piersiach, lub od nich odstawionych od lat 2. 3. 4. do 6. 8. aż do 12.

#### *L e c z e n i e*

Pierwszych dzieci tém pośpieszniey idzie, kiedy matki pokarm swój na dni kilka zestrzykną, gdy tymczasem nowo-narodzonemu za pokarm da się pić serwatkę z słodkiego mleka robioną, cukrem lub syropkiem rhabarbarowym osłodzoną, w przypadku nie

mienia syropku, pokąd jeszcze jest gorąca serwatka, np. kwaterkę iey nałożyć na rhabarbarum drobno kraiane, którego wziąć ziarek 10. 15. a dopiero cukrem osłodziwszy, zasilać, i to dopóki żółtawość ze skóry, oczów, nie zeydzie, dawać codziennie, czynić kąpiałki ciepłe, a późniéj wrócić do zwykłego pokarmu, gdy témczasem matka używać może samego kremortartari subtelnie tartego, po małej łyżeczce od kawy 3. lub 4. razy na dzień, popiiać lekkim klejem z kaszów wydaiących tenże.

#### *L e c z e n i e*

Znowu starszych dzieci, wymaga, ażeby żółci obfitość z żółdka wyprowadzić; iako i iey pierwiastki do soków i krwi w ssane po za granice ciała wyprowadzić, tu służą np. proszek z ipekakuany od 3. 4. do 6. 8. 10. ziarek rano nadczezo w osłodzonej herbacie, iak zacząną womitować, dawać im, często dziewanne popiiać. — Zdarza się, że starsze dzieci są przykre do brania lekarstw, na taki znowu przypadek weźmie się iedno ziarko lub dwa weinszteynu antimonio-



wego (*tartarus Emilicus*), rozpuścić w 3. lub 4. łyżkach wody czystej, o-  
słodziwszy dobrze, bez ich wiedzy,  
co się dość łatwo uda, że toż rozpu-  
szczenie nie ma żadnego zapachu ani  
smaku, dawać młodszym często po  
łyżeczce od kawy, np. co pół godziny,  
starszym po parę łyżek, a jeszcze star-  
szym po wielkiej łyżce od iedzenia,  
pokąd wymiotów dwa lub trzy nie na-  
stąpi, i te dzieci codziennie kąpać na-  
leży, dawać im pić serwatkę samą  
przez się, którą robić można z kre-  
mortartary, lub za napój lemoniadę z  
niego robioną, dawać po razy dwa  
lub trzy kropli rhabarbarowych z wo-  
dą przygotowanych po parę łyżeczek  
w dni inne, starszym jeszcze po całej  
pomiernej od iedzenia łyżce parę razy  
na dzień, lub też wziąć wyciągu woło-  
wego oka (*extractum taraxacis*),  
np. pół uncyi rozpuścić w kwaterce  
czystej wody osłodziwszy cukrem,  
dodać kropel rhabarbarowych uncją  
iedną z wodą robionych, Spiritus ni-  
tri dulcis 30. kropli, i z tego brać 3.  
lub 4. razy na dzień po pół lub całej  
łyżce, dobrze wprzód zamięszawszy,  
wodą czystą popić. — Znowu taż żół-  
taczka powstaie z przyczyny nade-  
wszy-

wszystko na części odosobniające żółć  
wpływ mające. — Żółtaczka ta nazy-  
wa się (*icterus idiopaticus*) np. mo-  
gą takową zrządzić zbyteczne upały,  
po nich nastąpione nagłe zimna i cią-  
głe ulewę.

### Leczenie

Takowey ze wszystkiem iest toż  
samo, które się tu podało. — Mogą  
znowu byc żółtaczki z gorączką, z  
febrą silną, a nieraz i z bólem, obrzmie-  
nieniem około położenia wątroby, i tu  
służą kąpiele po dwa razy na dzień  
wolne okładania mleka ciepłego, w  
którem chusty często maczane, na  
mieysce dolegające czynić, dawać e-  
nemy z serwatek robione, napicie  
kwaśney natury, które się już wyżej  
przy tęj chorobie podały, bynajmnięj  
żadnego lekarstwa na wymioty nie u-  
żywać, znowu bywa łagodną lub u-  
partą, obie tu podług nadmienionych  
środków leczyć się powinny, z niema-  
łym skutkiem służą żółtka od iay świe-  
żych surowo z cukrem tłuczonym zbi-  
te, a gdzie łatwo dostać można i z  
wodą cynamonową rozrzedzone i ob-  
ficie przez dzień 3. 4. do 6. na dzień  
Część II.



takoż z cukrem osłodzone wypijać po łyżce, po dwie łyżek na raz, i to lekarstwo domowe ciągle używać, pokąd żółtaczka nie ustąpi. — Nieraz znowu panują epidemiczne lub rozproszone, wszelako i przy nich, co do wieku młodociannego, podług przepisów tu udzielonych postępować wypada, a co się dotyczy ostatniego gatunku żółtaczki, któren zwykł być przytomnym wątroby zapaleniom, przy febrach zapalnych, leczenie iego oddzielnie podanym będzie.

W wszystkich tu nadmienionych żółtaczkach wystrzegać się potrzeba tłustych i solonych mięs, ciast, wieprzowiny, rosół zaś niekorzenne ani tłuste, na w pół z kwasami, iako to: bu-rakowym, zaczynianym, lub cytrynowym sokiem zaprawne, owoce, kaszklejkowe naydzielniey służą, i przy téy dyecie długo zachować się należy dla zapobieżenia nowemu téy choroby powrotowi.

### *O Angielskiéy chorobie (Rachitis).*

Choroba ta naypierwéy w Anglii około r. 1630. dostrzeżona, zkąd nazwisko swoje otrzymała, i dalej się

rozszerzyła, dawniéy była daleko częstszą iak w naszych czasach, nader rzadko zwykła się okazywać przed 5. miesiącem życia dziecinnego, a naypowszechniéy w peryodzie rewolucyi natury fizycznéy, przy którém wyrzynają się zęby, lub zaraz po odstawieniu od piersi aż do końca roku trzeciego, w którym to czasie wywinać się zwykły ciała i duszy siły, od niéy starsi wiekiem są wolnemi. — Zwykła się daleko częściej okazywać w zimnych wilgotnych położeniach, iak w suchych i ciepłych, częściej w zimie i na wiosnę, aniżeli w lato, także w nieczystych, wilgotnych pomieszkaniach. — Wszelako oprócz tych wpływów wyprowadzających téż chorobę, uczą doświadczenia, że dzieci stały się nabywcami, kiedy ich matki w powyższym czasie, to jest: w dziecinnym latach na nią chorowały, kiedy w czasie brzemienności rozmaitych doznawały słabości, równie doświadcza-no, że prędcy po oycu iak po matce odziedziczały, toż się i dało stwierdzać: że słabowitych rodziców dzieci, że szkrofuliczni i niegdy weneryczną chorobą rażonych, bardziéy są do niéy nad inne usposobionemi, są znowu



doświadczenia, że i otyłych, dobrze żywionych rodziców dzieci, takż iéy podlegaią, i znowu dostrzegano, że rodzice zupełnie byli od niéy wolnemi, wszelako ich dzieci napastowanemi były tą chorobą, nie tak rzadko da się widzieć cale familiie Angielską chorobą tknięte, a ieżeli raz się znajduie do iéy mienia usposobienie, za przyczyną nadarżającą się rozwiać i przedstawiać się w swych charakterystycznych znamionach zwykła, a te zaraz dołączymy. Wziąwszy to wszystko, co się dotąd o téy chorobie i iéy przyczynach mówiło, dodawszy to co stwierdzaią doświadczenia nader częste, że pomieszkanie, że położenie, że pory roku wyżéy nadmienione, że zaniedbana okolo dzieci czystość, że grube, niezdrawe, mączne potrawy, iako to: zacierki, klóski gniecione, kartofle często i w obfitości używane, przy braku ruchu, i użytku czystego świeżego powietrza, że ssanie niezdrawéy karmicielki, że nakoniec ta choroba znaczłą z wyrzynaniem się zębów ma styczność, przekonać nas powinny, że zawsze z powyższych przyczyn powstaie.

*Charakterystyczne iéy znamiona.*

Zaczynaią dzieci byđz ociężałemi, niespokojnemi i nudnemi, nader drażliwemi, iak ciągle siedzenie nader lubiące, chudną, skóra staie się obwisłą, marszczy się, i blednieie, lice tracą swą żywość, kwitnienie, apetyt dosyć dobry, i nieraz niedosytny, żądaią powiększéy części na posiłki surowych i niestrawnych rzeczy, i pić w nocnéy porze. — Zaczyna obrzmiewać twarz, lice żółkną, rozrasta się głowa szpecąca wiek, iakoż równa się wielkością dorosłego ciała, dar niepośledni władzy umysłowéy, którą są udarowane dzieci nad inne w téy chorobie, iawnie niknie pożywność reszty ciała części. — Rozchodzą się błoniste części (*fontanellae*) czaski, czoło naprzód występuie, szyja staie się długą, słabą, że głowa równo utrzymać się nie może, muszkuły twarzy coraz bardziéy obwisłości nabieraią, opada szczéka niższa, wzroku organa staią się coraz na weyrzenie sinutnieyszeimi, kości okolo stawów grubieią, iakoby nadęte, ponieważ długie ich środki cięczeią i słabieią. — Wyrzynanie zębów nie odbywa się zwykłym porządkiem, a nawet i wstrzy-



mywanem bywa, nieraz i stowarzyszone z konwulsjami, małe stawy kości drobnych u rąk stają się grubszemi, zebra po obu stronach zakłęśniają się, tracą swą obłonczystość przez nabranie płaskości. — Kość piersiowa (*os sterni*) bardziey występuje, a reszta kości zmieniają swą formę, iakoż krzywią się i nader są łatwe do złamania, o czym Storck o chorobach dzieciennych w Części 3. stronnicy 271. wspomina, że dzieci przez kilka niedziel sześć razy wnet nogi, wnet ręce łamały. — Zęby coraz żółknieją, łatwo wypadają, powiększa się słabość powszechna, i która wnet po szczęśliwym téy choroby wychodzie ieszcze czas nieiaki pozostaie, zdarzają się iednak przypadki, że po dwuletnim czasie téy choroby, muszkuły, więzadła unoszące głowę, tak były osłabione, że ią rękami podpierać musiano. — W wyższym stopniu téy choroby, nie mogą biedne dzieci łóżek opuszczać, i zostają w nich ciągle, przystępują obfite nerwy osłabiające poty, a pod wieczor febra — wtenczas całe ciało zaczyna puchnąć, tchnienie przystępuje krótkie, częste bicie serca, żywot iak bęben nadęty, dość często ciągly kaszel dręczy, i wszystkie znamiona fe-

bry niszczacéy się przedstawiają, a co większa po śmierci nie tak prędko iak zwykle przy innych chorobach trętwieją, i ziębną ciała dziecinne, — co zaś szczególniejszego dostrzega się przy téy chorobie, że dowcip, poiętność, pamięć, i wszelkie dary duszy są podwyższone obok słabości ciała, co większa, że się nawet prędzéy też rozwijać zwykły, niż u innych dzieci, iakoż i chodzić prędzéy i mówić zaczynają. — Lecz chcąc w téy oznace troskliwość rodzicielską zaspokoić, ostrzegam, ażeby sobie nie mieli za poselki do téy choroby, ieżeli ich dzieci prędzéy chodzić iak mówić, i tak nawzajem rozpoczynają, ponieważ nie równy czas natura wszystkim dzieciom do wywikania się siłek oznacza, iakoż niezwykła wyprowadzać choroby, iak zmuszona czyni przez przetężanie w odchowcie, co chorobliwą zasadę przyspiesza, a skutki dają się dostrzegać na wstrzymanym i uszkodzonym wzroście, pokąd tylko (iako się zdarza) pokrzepiona w swych siłach natura w roku czwartym życia wszystkie skrzywienia kości, inne oszpecenia nie znosi, i wzrostowi dopomaga, a to bez najmniejszey pomocy, ieżeli w tychże siłek wyprowadzeniu nie by.



wa uszkodzoną aż do roku piątego, po tym już czasie przeciągać się zwykła choroba aż do 7. i 11. roku, i już o zupełnem wyprowadzeniu pomyśleć nie można.

### *O postępowaniu z chorym.*

Nie masz téj choroby, którejby podstawą leczenia nie była dyeta, a w téj samo prawie stanowi leczenie, co więcéy jest najskuteczniejszym środkiem przeciw iéy wybuchowi, a którą rozpoczynać wypada od pierwszych lat życia. — Lubo już daleku temu przepisy w Części pierwszej, Rozdziałku drugiego, a Częstce trzeciej, o odchowcie dzieci w pierwszych latach. — Nie będzie zatem od rzeczy w krótkości powtórzyć, iak główniejsze z nich położyć zasady, to jest: codzienne kąpiele, obmywania od głowy całego ciała zimną wodą, wybór zdrowej karmicielki, w dalszym czasie pokarmy zdrowe, łatwe do strawienia, czyste powietrze, czysta a nie wilgotna dziecinna izba, zachowana około dzieci czystość w ich odchowcie, zupełne zaniechanie powiślań, pasków, sznórowek, obcisłych sukienek, iako

i z nagleń zbytucznych do chodu i biegania dzieci.

Te to zapobiegawcze środki albo uprzedzają samą chorobę, a przynajmniej, gdyby u dzieci miało się znaydować do niey usposobienie; takowe ułagodzić jest w stanie. — Chociaż wybór tych środków wspólnie celowi pomaga, dzielnie wstrzymuje, zapobiega; ostrożność iednak zaniedbaną być nie powinna co do ich porządku, a zatem rozpocząć pierwéy kąpielki ciepłe, daléy i coraz wolniejsze, aż nakoniec zimne, (przecie nie iak lód). Wierząc zaś doświadczeniom sławnego Kullen w Szkocyi, któren zapewnia, że właśnie w modę upoważnioną weszło w znacznych familiach użycie zimnych kąpielei, przez codzienne w wannę, w zimną wodę, wsadzanie, że nigdy pomiędzy dziećmi Angielskiej choroby nie dostrzegł.

Kto zaś usiłuje w postępie leczenia téj choroby ostrożnie działać, bacznym być musi na dwa peryody, i ich rozróżnienie, w których ta choroba musi być rozmaicie leczoną.

Pierwszy peryod saméy istotnéj choroby.

Drugi peryod początkowy ozdrowienia.



Pierwszy tak długo trwa iak febra, przy nim ciągła jest słabość, trawność i pożywność zupełnie uszkodzone, stolec bywa albo wstrzymanym lub rozwolnionym, nieraz zbliża się do biegunki, skutku zatem spodziewać się należy naypewniéy w początku téy choroby, przeto dostrzegając obrzmiałości twarzy, bladeści liców, żółtości ich, już się z pomocą pośpieszać należy; inaczéy w miesiący kilka okazują się twarde obrzmienia około stawów.

Skoro u dzieci dostrzegamy téy choroby początków, co prędzéy pośpieszać z odchowu sposobem, a przy nim następujące w pomoc przybrać środki.

Zadnego dnia nie opuszczać w którémkolwiek bądź porze roku, aby dzieci świeżego nie miały używać powietrza, iakoż to staie się prawie dla nich balsamem zdrowia, i tylko wstrzymać ie należy w domu w czasach ulewów, deszczów, wilgotnych, lub i w zimném powietrzu. — Równie silnie dopomaga umiarkowane słoneczne ciepło. — Kiedy ieszcze dzieci swéy w chodzeniu mocy używać nie są w stanie, dać im na słońcu siedzieć, lecz nie w czasie upału, i wtenczas głowę uchronić wypada, starać się a-

by pomieszkania były suche, żeby łóżeczka dzieci nie stały blisko ścian, muru, trzeba często dniem w pomieszkaniach odświeżać powietrze, nawet i w zimie tego nie zaniedbywać, latem zaś godzinami osobliwie przy słońcu ogrzewaniu okna mieć otwarte, a jeżeliby się wilgotne pomieszkание znajdowało, co prędzéy o suche starać się należy. Ruchy ciała i inne do wieku i siłek stosowne poruszenia do silnych środków policzonemi być mogą, a co czynić wypada ile możności na świeżém powietrzu, tém skuteczniéy w suchém i pogodném, pomnieysze zaś dzieci wnosić na nie, lub często z niemi ieździć, naylepiéy iednak w korszyczkach, aby tylko w nich ciągle nie siedziały, ponieważ garbiéią, starszym zaś dzieciom dozwalać ruchów podając im różne zabawy, przy którychby musiały takowe odbywać, a nigdy nie dopuszczać długiego siedzenia, niedość zalecam codzienne ciała całego nacierania czynić chustami, flanelami, które wprzód anodynami naspuszczać, z iałowcu lub iego gałązków, niemniéy nakadzenia z goździków, alboliteż dobrze kamforą całe takowe nacierając, można tezsame chusty lub flanelę umaczawszy w zimnéy wodzie



całe ciało pare razy na dzień nacie-  
rać, lecz niebawnie suchemi wilgoć o-  
cierać.

Ile możności starać się o utrzyma-  
nie wesołości umysłu, i ten wspierać  
przez różne rozrywki, a przeciwnie  
stają się nader szkodliwemi wszystkie  
natężenia umysłowe, iako i zmuszenia  
dzieci do chodzenia, co tém jest szko-  
dliwszém, im są dzieci młodsze. — Po-  
karmy i napoje powinny być zdro-  
we i czyste, wszelako matki nie po-  
winny spuszczać się na służące, ale  
raczćy same bydź przytomnemi, aby  
dziecom na raz wiele iedzenia, cho-  
ciażby te do klas niewinnych należa-  
ły, nie dawać ich używać do niedo-  
sytnego apetytu, któremu powiększćy  
części chore dzieci w tym stanie po-  
dlegają. — Pokarmy zaś są dla nich  
zdrowemi następujące:

Rosoly nietłuste i inne zupy, z  
ryżem, owsianą, orkiszową, ięczmien-  
ną, kaszami; można też same kasze na  
wodzie gotować, dolać do nich czwartą  
część wina, i cukrem osłodzić, pole-  
wki piwne, aby tylko te były dobrze  
z wystąłych niekwaśnych robione, ia-  
rzyzny, pieczone mięsiwa częścię ani-  
żeli gotowane, a ostatnie na odmianę  
z chrzanem lub musztardą starszym do

iedzenia dawać, wszelako zawsze w  
trzecięj części z ogrodowinami. Szko-  
dliwemi zaś są dla takowych dzieci  
tłuste mięsiwa, wieprzowe, kaczek,  
gęsi, mleczne i mączne potrawy, kar-  
tofle, sér, chleb lub bułki świeże,  
potrawy wszelkie masłem rumienio-  
nem podlewane.

Za napóy służą piwo czyste wy-  
stałe nie mające żadnego kwasu, wo-  
da z grzanką, dla możniejszych Sal-  
cerska, słodkie serwatki, szkodzą zno-  
wu ciepłe napoje, iako to: kawa, her-  
bata, a nayszkodliwszym wódka i na-  
poje, do których mieszaniiny wchodzi  
choć w najmniejszćy ilości. Su-  
kienki niepowinny bydź obcisłe, ani  
za letnie, ani za gorące, najlepićy  
służą z lekkich flaneli na golém ciał-  
ku noszone, ale tych mieć dostatek,  
aby je prać można, a przed wdzianiem  
okadzać, iak się wyżej nadmienilo. —  
Równie i miękka pościel pierzowa jest  
szkodliwą, oprócz, że rozwalnia, ie-  
szcze i przysposabia do potów, które  
dla nich są bardzo szkodliwemi; le-  
pićy się daleko uczyni, dając im sy-  
piać na włosianych, lub z siana ro-  
bionych materacykach, znieść zupeł-  
nie wszystkie osłony około łózek lub  
kołysek dziecinnych, a to dla nie,



wstrzymywania wszelkich przeziwów skóry, płuc, odeszłych wiatrów.

Jeszcze tu przypominam kąpania, o tych należy pamiętać, równie o pokarmach i napoiach, a lubo już powyższy potrzebne z niemi postępowania umieściłem, tu jeszcze i te do nich dodać mam za obowiązek. — Można bowiem wielce skutecznemi takowe pozynić kąpiele, wzięwszy do nich mydła albo ziół pachnących, np. melisy, miętki, macierzanki, piołunu, combru, lewandy kwiatu i t. p. każdego po garści zawiązać w szmatę, nałać wrzący wody w naczynie, w którym się dziecię ma kąpać, przykryć takowe, aby dobrze pół godziny mokło, poczem dobrze roztworzywszy wodą zimną, zawinięcie to z ziołami, mocno wycisnąwszy, wyrzucić, w takię wodzie za każdą razą świeżo robionę kąpać. — Jeżeli zaś dzieci są słabe, znowu następujące kąpiele brać zalecam. Wziąć siodu np. pół garca, korzenia Tataraku łótów 4., dla starszych i dwa razy z każdego, gotować z wodą, przecedziwszy w wanienkę roztworzyć zimną wodą do umiarkowania temperatury wody, która właśnie służy do zamiaru wzmacniania (przestrożę tu już wyżej umieściłem)

można do téj kąpielki dolać kwaterkę okowitki, alboliteż wody, w której zioła podane mokły.

Nadmienić tu muszę, a oraz i dać upominek, o którego dotrzymanie w imieniu tych dzieci proszę rodziców, aby się żadnemi nierozsądnemi radami nie dali uwodzić względem użycia cisnących machin części z swej formy wychodzące, takowe stan tych lub o-wych części zawsze pogorszaia, zamięczam.

Drugi period początkowy ozdrowienia.

Co do zimnych użycia kąpeli, o których się przy pierwszym periodzie mówiło, znajduje tylko miejsce, kiedy żywot i rozdęcie tegoż zaczyna się zmiekczać i zmniejszać, a stolec codziennie lub podług urządzeń natury rodzicielskiej odbywa się, wszelako gdyby tego nie było, starać się o utrzymanie ich wolne, i na ten koniec nad wszelkie inne lekarstwa uwielbiam, wziąć rhabarbaru kwintę jednę, pokrajać w drobne kawałki, lekko związać w płócienco, i wpuścić w kwaterkę wody zimnej, aby się tylko zafarbowała od niego, wyjąć zawiązanie i z niego rhabarbarum, które



ususzysz do dalszego takowego użytku, pokąd tylko farbuje wodę, zachować można, w téj napoionéj wodzie, upaliwszy gwoździ żelaznych dwa, ugasić i wyjąć, co powtórzyć można, osłodziwszy cukrem, dawać po razy kilka dniem, młodszym po dwie łyżeczki od kawy, starszym po pełnéj łyżce od iedzenia, co czas niemały kontynuować.

Srodek ten leczenia bynajmniej laxowania nie sprowadza, lecz tylko do odbytu naturalnego przysposabia, i może, a nawet powinien być użytym z niełakniami pauzami, n. p. na dni dwa lub trzy wstrzymanym. Początkowo zimne kąpiele co drugi lub trzeci dzień czynić wypada, i to nie długo, kródszém dla młodszych, dla starszych dłuższém, wszelako pilnie uważać, iak takowe służą temu lub owemu dziecięciu, czyli staie się żywszem, weselszém, silnieyszém, w przeciwnym skutkowaniu należy poprzestać, lub przynajmniej stopniowo postępować, to iest: od ciepleyszych do zimnieyszych przyzwyczaić, w czasie kąpieli cały krzyż wodą zimną po razy kilka obmywać, a po wyściu z wody, co prędzém ocierać do suchości, i w ciepłą

ciepłą pościel włożyć, po chwili flanelą, chustami, całe ciało nacierać.

Równie ważny iest peryod rozpoczęcia potrzebnego wzmacniania i użycia ku temu zamiarowi pomagających środków, a te zaraz się podadzą, nieprędzém iednak do nich przystąpić radzć, aż febryczne i gorączkowe wzruszenia, dreszcze czysto napastujące, zupełnie na dni kilka dzieci nie opuszczą. — Tu pomiędzy inne lekarstwa zalecić mogą marzankę farbiarską (*rubia tinctorum*), wziąć téj łót ieden, gotować w pół kwarcie wody do zostania się kwaterki, precedzić, i ostudziwszy, trzy razy na dzień młodszym po pół łyżki, starszym po całém dawać wodą popiwszy, w którém palone gwoździe po razy kilka gaszone były, a miasto marzanki, radzć brać korzenie i liście szczawiu wodnego (*rumex aquaticus*), Lekarze Szwedzcy dają mu w téj chorobie niepoślednią zaletę, rośnie on u nas obficie przy błotach i rzekach, korzeń iest drzewiasty, gruby, wewnątrz żółty, i dla tego powinien być długo gotowanym, wart on iest, aby się w apteczce domowém suszony znajdował, w leczeniu iest skutecznieyszy niż liście, iezeli



są świeżo zehrane korzenie półtora łota, suszonych łót ieden gotować z ilością wody, i codziennie starszym dać wypić łyżkę dużą, iak przy marzance się podać.

Nadmienić tu muszę, aby odwar ten marzanki farbiarskiéy w zimném miejscu stał, i naydaléy co trzeci dzień był świeżo robionym. Gdzieby trudność była w dostaniu iéy, następujący trunek przedziwnie służy. Robi się z rumienionéy mąki owsianéy z mlekiem, aby ten napóy środek pomiędzy rzadkością a gęstością otrzymywał, można do niego dodać czekolady bez korzeni, np. do pół kwarty łót ieden, i dawać pić po pół filiżanki, aby codziennie starsze dzieci, a młodsze połowe iego wypijały. — Takżę za napóy woda z gaszonemi gwoździami, wyżéy położona, służy, a można też i kąpiele żelazne używać, w sposób ten robione: upalić duszę od prasowania, lub kawał szyny, gasić i znowu palić, co razy kilka powtarzać.

Otóż to jest nader ważny punkt w rozróżnieniu peryodu saméy choroby, od peryodu rozpoczynającego się ozdrowienia; w pierwszym, jeżeli w zamiarze wzmocnienia przystępujemy

do użycia środków tego skutku, wszystko niewątpliwie pogrążemy. Wszakże i tu o wolnym stolcu odchodzie, iak się wyżéy nadmienilo, nie zapominać.

Naostaték przepomiec nie mogę podania środka ze wszechmiar użytecznego, przez liczne doświadczenia stwierdzonego, szczególniéy, gdzie się nadaie zręczność dostania i ciągłego użyciu, zawiera on w sobie kąpiel elektryczną, do téy jeżeli jest za młode, i z koszyczkiem położyć, dać do niego komunikacyą od przewodnika, aby cały ten płyn spływać mógł na dzieci wraz z iego koszyczkiem i pościółką. On to pomnaża krwi krążenie i ciepło naturalne, wolnieysze czyni tchnienie, znosi wszystkie zapchania, ułatwia przeziwy skórne, słowem: całemu ciału nowéy udziela siły: ponieważ nazwanym bydz może za źródło życia.

Można go w obu tych peryodach z wielkim skutkiem i nierównie bezpieczniey nad wszelkie inne lekarstwa używać, rozpocząć wypada od kwadransa czasu a po tygodniu do pół godziny, ale przestrzegam, że trzeba tak skutecznego środka przez miesiące, do pół roku, a



nawet i dłużej kontynuować. i toż samo czynić wypada w wszystkiem, co się podać, nie żałować starania, dołożyć prawie Herkulesowey cierpliwości, a skutek pomyślny uwieńczy wasze prace, iak radością napoi serca rodzicielskie, zapatrując się na owe przez wyćięzione u swych dzieci kalectwa, w którychby na zawsze pozostać musiały.

Dać tu jeszcze przestrozę, ażeby wczesnie dzieci na nóżkach nie stawiać, chcąc ich w chód wprowadzić, to nader skutecznie przyczynia się do nakrzywienia kości nówek, a w przypadku tym sławny wieku naszego lekarz Hufeland radzi, aby takż z cierpliwością i bez znudzenia często dniem nóżki rękami nieco ściśnionemi nacierać z góry na dół w równi, iakoż ten mąż mówi, że zna kilka nader pomyślnych zdarzeń, gdzie matki przez ten sposób po kwartale czasu i daléy użycia jego, z zakrzywionych nówek dzieci swoje zupełnie uwalniały, iakoż są wieloliczne doświadczenia, że cierpliwe i przywiązane do swych dzieci matki, naśladowując podany tu środek w ósmym roku życia nogi prostowały.

Z opisu leczenia téy choroby, w którę nader szczupłe podane zostały lekarstwa, przekonać się możemy o prawdzie, że urządzenie diety przyzwolitéy, i zachowanie podanych, iak pomagających dzielnie środków, nieinny ostrożność w postępowaniu i zachowaniu dwóch peryodów, całą osnowę pomyślności skutków stanowi.

### O S z k r o f u ł a c h

*Czyli Chorobie obrzmienia i zatkania zatwań albo gruczolków.*

Opisawszy przy konstytucjach i ich rysach charakterystycznych konstytucją szkrofaliczną co do znamion odsyłam Czytelników do Części pierwszey tego pisma, tu tylko nadmieniam, że dosyć często bywają po rodzicach odziedziczane lub przez pokarm karmicielek nabyte, a powszechnie przy téy chorobie dostrzegać się dają, rozsądek zawczesny i szczególną odezwę do płci polubnéy, miewają do tego wielki apetyt, iakoż iedzą i piją obficie, a do czego ich kwas żołądkowy zachęca, wszelako coraz bardziey chudnieją, często słabieją, dostają płynień krwi z nosa, zapaleń oczów, i



różnych wyrzutów. — Wnet znowu obrzmiewaia, różne części ciała nika, i znowu powracaia, a to należy do poznawania pomiędzy inne téj choroby oznaki, i za zasadę do nich służy, iak na uwagę zasługuie.

### *Opis samey choroby.*

Dostrzegamy nabrzmień gruczołów osobliwie za uszami i po innych ciała częściach które nie są na obwiew zimnego powietrza wystawione, są to okrągłe lub okrągławe obrzmienia, a różniące się od innych podobnych, że pod skórą mogą bydź wnet w tę lub ową stronę ruchawemi, że nie sprawiają żadnych boleści, chociaż się ich pomiernie, mocno dotyka, a przy tym kolor skóry w niczym zmienionym nie zostaje, i że w tym stanie bez zmiany przez lata pozostają. — Wszelako wprzeciągu czasu zwiększają się, twardnieją, powstają w stawach małe boleści, przedstawują się oczów cierpienia, a najpierw nabiegają gruczołki za uszami, przyczym zaczyna skóra czerwienić, a same gruczołki przechodzą w ropienie, niekiedy znowu iedne z nich zamykają się, gdy

drugie się otwierają, zostawiwszy po sobie blizny, a po których można poznać chorobę.

Niekiedy też złe daje się poznać osobliwie w stawach łokcia lub na kościach upalecy rąk i nóg, niekiedy znowu zdaie się iż choroba zupełnie opuszczać, lecz na wiosnę znowu nowe obrzmiewania gruczołków powstają. — Niektórzy z chorych, zwłaszcza kiedy rozchodzą się obrzmienia, dostają wrzody po innych ciała częściach, lub wpadają w zupełną opuchlinę, a najgorzej jest, kiedy też choroba napastaie kości i sprawia ich zepsucia, równie iak kiedy soki lipkie naruszone bywają, i wtencz przystępuie trawiąca gorączka, suchoty i śmierć.

Są nadto ieszcze i wewnętrzne Szkrofule, a tych poznać równie ważnem się staie, i to tém więcej, że gdzie się powierzchownie nie dają dostrzegać, a cała choroba ukrytą bywa w częściach wewnętrznych. Jakoż obok pomienionych znaków przy opisie téj konstytucyi, dzieci dostają częstych oczów zapaleń, rozmaitych wyrzutów, a do tego i na boleści w żywocie narzekają, iako i na pragnienie nie łatwo ugasić się mogące, niektóre z nich utracają apetyt, tchnień cu-



chnących dostają, bladych twarzy, zepsucia zębów, przebiegających po stawach boleści, coraz chudnieją, kości i stawy grubieją, ręce, nogi puchną, w końcu umierają.

### *Dostrzeżenia ogólne nad Szkrofułami.*

Jest prawie właściwą chorobą dzieciinną, a ile nas doświadczenia przekonywają, przy piersiach dzieci tę nie doznawają, i dopiero w drugim roku rozpoczyna się, nieraz i w trzecim, a ledwie nigdy po latach dojrzałości. — Należą do chorób odziedziczonych, dla tego rodzice płodzą już dzieci swe z zarodem do nich, czyli zaś oyciec mniej jak więcej matka się do tego przyczynia? wszelako są dostrzeżenia, że po dziadach spadały na wnuki, kiedy średnie rozmnożenie od nich było wolne, dzieci znowu rodziców szkrofulicznych nader rzadko ochronieni bywają. W Anglii i Pays de Vaud więcej udziału do tej choroby płci kobiecej jak męskiej przypisują, i dla tej to przyczyny w wyborze żon wielką ostrożność, lub jeżeli z takowej familii pochodzi, zachowują.

Oprócz tego więcej się daleko w wielkich miastach niż po wsiach okazuje, nie dziw, że modne dziś małżeństw związki interesem powodowane, życie rozwiozłe i t. p. a właściwe ludnym i wielkim miastom są tej choroby przyczynami, iakoż sławny wieku naszego lekarz Hufeland o nich mówi, że są grobowcem nienaylepzych obyczajów, ztądto rozwiozłego ale modnego życia rodziców dzieci stają się ich wad, ułomności, a nawet i chorób ofiarą, tak jest, nadprućniałe drzewo nie może zdrowych rodzić owoców. — Okazują się ledwie nie powszechnie wtenczas, kiedy dzień naydłuższym jest, i kiedy ubywa. Obrzmienia zaś na wiosnę przedstawiające się niknąc zwykły latem, a w następny znowu wiosnie powracają, jak otwierac się zwykły.

Po większej części choroba ta jest właściwą kraiom położonym w bagnach i wilgociach, iako to: w Anglii, Hollandyi, właśnie gdzie Angielska choroba jest zagęszczona, i wielkie ma z nią powinowactwo, nawet co do rzędzeń i przyczyn.

Zważywszy ię opis, i porównawszy z poprzedzającą chorobą Angielską, i przyczyny do nię, że są też same, np. niezdrowość pokarmów, ma-



czne i mleczne famuly, zaprędkie i zaobite łupinastych legumin, iako to: grochu i t. p. użycie kartofli, z takowego użytku dostrzeżono w Hollandyi, że w Prowincyach, gdzie dzieci karmione bywają takowem iadłem daleko liczniéj chorobie szkrofulicznéj podlegają, równie się przykładają pomięszanie potraw, przesylenie niemi, siedzenia ciągłe, niedostatek świeżego powietrza, zatęchłe, wilgotne mieszkania, nieczyste tychże utrzymywanie, zaprędkie natężenia w naukach, zimny lub nad potrzebę ciepły dzieci odchów.

### L e c z e n i e.

Wspiera się na dyecie, i tę za stosować należy do wieku, bez niéj najsukuteczniejszych lekarstw użycie zostanie nadaremne, tym to końcem przy konstytucyi tego nazwiska umieściłem ją, aby uczynić wybór z niéj co do wieku. — A że już nadmienitem, iż u dzieci nayeściej ta choroba po wyrzynaniu się zębów rozwija, lub i przed tym peryodem, lubo rzadziej, dostrzegana bywa, ztąd to daleko szczęśliwszemi dzieci bywają żywione zdrowym matek lub kar-

micierek pokarmem, niżeli przez smoczki, i że tym sposobem karmione, nadewszystko téj chorobie podlegają, a Hufland w dziele swém o téj chorobie na karcie 26. mówi, że pokarm ma coś początkowego życia (*vitalitas*), dla tego ile tenże ma zdrowe przynioty, silnie dzieci od niéj broni, a gdzieby zachodziła trudność w dostaniu takowego, lub kiedy się zdarzy ważna przeszkoda w karmieniu zdrowym pokarmem, lepiéj służy karmić dzieci lekkimi pokarmami, i te ja w Części pierwszój podałem, iakoż tego zdania jest wzmiankowany lekarz w swém dziele nadmienionym na karcie 26. — W tym więc peryodzie użytymi bydz powinny i kąpielki, nacierania ciała, wynoszenia na świeże, suche, pogodne powietrze, i to wszystko dochować należy, co zaś dla starszych wiekiem zaraz podam.

Dla starszych znowu dzieci do brze służą i niedość zalecenia są war-te ogrodowiny, a mianowicie korzenie, iako to: marchew, pasternak, pietruszka, selery z mięsem wołowém, mięsa nietłuste, woda żółtkami od jaj, np. iedno do pół kwarty wody, którą osłodzić można, woda czysta, lub lekkie a do tego należycie wystałe piwo,



odmienić takż wilgotne na suche pomieszkanie, któreby słońce oświecało, i wszelką czystość tak w izbie, iako i około dzieci zachować, pozwalając im czynić poruszenia ciała, a tu lepięysłużyć ich własne iak w powozach, te daleko skutecznieysze się stają na świeżem i wolnem powietrzu, niz w zamkniętych chociaż czysto utrzymywanych pomieszkaniach.

Po między liczne przykłady skutków naysymyślnieyszych Gimnastyki, dla przekonania umieszczam tu wiarygodne zdarzenie o iednym młodym na Szkrofuły chorującym, którego przez obrzmienie dosyć znaczne po iednę stronie dla gruźcoiu szyi, głowę nakrzywioną na drugą stronę wolną od niego nosić był przymuszonym, posłuchał rady, uczył się fechtowania, i przez ten środek nie tylko owe nakrzywienie głowy zniknęło, ale nawet obrzmienie stawów u nóg, dla których miał chód trudny i szpecący.

Jeszcze i tu zapomnieć nie radzę o przyszłości przy odchowcie dziecinym, dla tego służą częste ciała obmywania, kąpiele wnet ciepłe, a w postępie czasu i zimne, ieżeli po ostatnich dzieci czerstwemi, wesółemi, silnieysze się bydyć czują, w przeci-

wnym przypadku przy pierwszych z ziołami (iak się tu przy Angielskię chorobie podalo) pozostać radzę, często odmieniać bielizny, pościeli, znieść wcale pierze, nacierać flanelą ciała, noszenia flanelowych koszulek, są to wiele zmieniające leczenia, a które ciągnąc bez uprzykrzenia i zmordowania długo, i aż do zniesienia całej choroby potrzeba.

Równie uczą doświadczenia, że odmiana powietrza, n. p. z miast na wsie, osobliwie latem, wcale się do pospiesznego i skutecznego leczenia przykłada. — Środki zaś w tęg chorobie podane są następujące, iako to:

- a) Kawa z żołądzi robiona na wpół z prawdziwą, zmieszana w ten sposób: wziąć całą łyżkę pomieszanę, w pół kwarcie wody gotować iak się powszechnie robi, po ustaniu się, pić z cukrem i śmietanką lub mlekiem dobrém, podzieliwszy na dwie połowy, iednę przed obiadem, drugą po obiedzie dawać dzieciom wypijać.
- b) Drugi środek stanowi czyszczony antymon na subtelny proszek starty, a tego wziąć np. pół uncyi, tyleż siałkowego korzenia w proszku, i uncją cukru, zmieszając



dobrze, dodawszy drachmów dwie magnezji Angielskiej. — Z tego proszku młodszym dzieciom dawać dwa razy na dzień na mały koniec noża, starszym o tymże czasie małą łyżeczkę, a jeszcze starszym po większey z górą, z wodą zmieszawszy dać żażyc, i wodą popić. — Srodku tego nieprędzcy używać radzę, aż mała febra i gorączka, które téy chorobie towarzyszyć zwykły, zupełnie nie ustaną.

c) Trzeci środek zawiera w sobie soki z ziół tu położonych, z podbiału pospolitego (*Tussilago Furfura*), szanty pospolitey czyli białey (*marubium album*), rzeżuchy wodney (*nasturtium aquaticum*), tribuli (*chaerosolij*), kokoryczu lekarskiego (*Fumaria Officinalis*), brodownika mleczowego (*Leontodon Taraxacum*), soki z nich prasowane mają się pić od dwóch do trzech a nawet i czterech łyżek od iedzenia; zagotowawszy takowe pierwéy i przecedzić, hiorąc z nich z rana łyżkę iedną, drugi przed obiadem, 3 raz zaś w godzin trzy po obiedzie, a czwarty na noc,

popiwszy wolnym rosołem. Chcąc odnieść z nich skutek ile potrzebny w tak upartéy i do tego ciągléy chorobie miesiącami, ale bez przerwy brać wypada. Lecz że to tylko przez lato może bydź użytém, można więc w zimową porę wyciągi (*extracta*) iako to: z szonty, kokoryczu lekarskiego, brodownika na to przeznaczyć, wziąwszy którego z tych, np. pół uncyi lub i więcéy, w kwaterce wody czystéy, i z tego rozpuszczenia, zamieszawszy, brać po łyżce od iedzenia raz lub dwa przed obiadem, a trzy w godzin 4. po nim, młodszym zaś po pare łyżeczek od kawy o tymże czasie — Nadmienić tu muszę, że liście z podbiału świeże z niemałym skutkiem przykładac na obrzmienia i otwarte guzy tego rodzaju. — Jeżeliby trudność była w dostaniu wyciągów wyżéy nadmienionych, można odwaru użyć z podbiału pospolitego, suszonego, wziąć np. łółów 3. 4. gotować w kwarcie wody do zostania się pół kwarty, przecedzić, osłodzić cukrem, miodem, i z tego odwaru dawać dla starszych po łyżek 2. od ie-



dzenia na raz; powtarzając o powyższym czasie, młodszym po połowie téj ilości. Takoz dobrze ten odwar służy do przykładania na otwarte rany szkrofaliczne, na ich zatwardnienia.

Do tych środków takoz zaleca Hufeland gębkę, którą upalić iak kawę, i téj wziąć łótów dwa, nalać pół kwarty wody wrzącej, moczyć godzin 12. poczem przecedzić, osłodzić, i brać po pół łyżki od iedzenia co trzy godziny, dla starszych po całej łyżce. Moczenie to można ieszcze używać tymże sposobem, z dodatkiem któregokolwiek z nadmienionych powyżey wyciągów, np. do ilości téj wziąć łót 1. a nawet 2. 3. stosownie do wieku, i rozpuścić, biorąc potrzebą za każdą razą dobrze zmięszając i wodą popić.

Zaopatrzyłem chorobę tę licznemi środkami, i tych właśnie potrzebuję; mogąc z niemi skuteczną czasową czynić odmianę, lub też iezeliby iednych z tychże dzieci używać nie chciały, aby mieć ich podostatkiem.

O Ki-

### O Kile Pępkowey

(Hernia Umbilicalis).

Że ta pomiędzy innemi łatwieyszą jest w poznawaniu, samo to iey miesce potwierdza, poiedynczey zatym wymaga pomocy, w bardzo rzadkich przypadkach z tą kiłą przychodzą na świat dzieci, daleko zaś częściej powstają zaraz po urodzeniu przez silne krzyczenia, przez boleści i rozdęcie od wiatrów kiszek, przez mocne powiiania. Pierwszego zdarzenia staraniem być powinno odbierającego dziecie, a w drugim naśladować pozostaie sposób Levreta. — Wziąć wosku białego, z którego urobić kształt guzika stosownie do obszerności kiły, obwinąć go w cienkie płótno kilka razy złożone, aby płaska część tego z wosku guzika kiłę przykrywała, tak iednak, żeby guzik ku stronie pępka raz tylko płótnem mógł byđz pokrym. — Co przyrządziwszy, starać się, aby środek tegoż guzika na środku kiły pępkowey leżał, poczem pępkową opaską zwykłą kilka razy żywotek obwinąć. Całe to opatrzenie oprócz wosku pozostać musi bez naruszenia, a opa-

Część II. 13



sek kilka mieć gotowych, aby ie dla czystości dziecięcia odmieniano.

*O krwi płynieniu z mieysca uciętego pępka.*

Zdarza się dosyć często kiedy sznurek pępkowy za lekko, lub kiedy iest miekki, słoniasty, zamocno podwiązany i przerzynany, lub wcale oderwanym bywa. — Na pierwszy zatem przypadek powinien być na nowo podwiązany, w drugim przyłożyć płatki octem lub wódką na w pół z wodą skropione. Jeżeli zaś krew się sączy znacznie, przyłożyć hupkę i palcem przytrzymać długo, pokąd krew zupełnie zatamowaną nie będzie, dopiero położyć zwykłą opaskę, kilka razy około żywota oprowadzić, i obwiązać.

*O wystąpieniu pępka.*

Występuie pępek więcéy iak zwykł przez płacze i krzyczenie. — W takim przypadku wyśledzić trzeba przyczynę tego płaczu lub krzyku, jeżeli więc bywa powinięte mocno, co prędzcy z takowego uwolnić, jeżeli wiatry lub

stołeczka zatrzymanie, dawaniem enemek, takowe uśmierzyć, a na wystąpiony pępek obwinąwszy trzygroszówkę miedzianną w płótno obwinęta, lub też dębiną potłuczoną, napelnwszy poduszeczkę skórzaną, na pępek przyłożyć, i takową opaską pępkową obwiązać. Trzy lub cztery niedziele czynić to należy, a po tym czasie pępek do swego powraca dołka.

*O Czkawce.*

Bywa dosyć często wypadkiem zaziębnienia, przekarmienia dziecięcia pokarmem i innemi posilkami, często iest skutkiem mokrości pieluszek dziecięcia. Czasem ustaie niebawnie, czasem trwa długo, a po ustaniu nieiakiem powraca. Można na uśmierzenie dać po łyżeczce od kawy herbaty z rumianku, kwiatu lipowego, melissy, miętkwi, lub cukru miałkiego, nakoniec użyć w pomoc ciepłych kąpielek, przykładać często w ciepłym mleku maczane chusty na piersi, na żywot, dawania po kilka kropel wódki nie radzę, a jeżeli z mokrzalni, co prędzcy o-suszyszy dziecko, w wygrzane powinać płaty.



*O rozeyściu się szwów czaszki.*

Najczęścięj zdarza się ten przypadek uniewczesnych dzieci, lub mających wodę w mózgu. — Natura sama nieraz takowe spaja, rozwijając coraz więcéy kości czaszki, co gdyby w czasie 5. 6. niedziel nie miało następować, nie radzę żadnego czynić gwałtu, ponieważ takowe zbliżenie się, i spoienie szwów zapomocą obciskających czapeczki następuie. — Przestrzegam więc matki, aby odbierającym ich dzieci kobietom nie więcéy czynić nie dozwalały, obciskanie zaś to w żaden sposób nie ma być zamocne początkowo, lecz coraz mocniejsze.

*O przyrośnięciu Języka.*

Przytrafia się, lubo rzadko, że dzieci na świat przychodzące mają wiązadło pod językiem nader krótkie lub i zadługie, że przez to dzieci ssąć nie mogą. — Niekiedy znowu nie bywa tak krótkie, że ssąć mogą, wszelako w późniejszych czasach mowa uszkodzoną bywa, a w tym przypadku potrzebna jest operacya. — Powinna jednak odbierająca dzieci osoba uczy-

nić zwiedzenie, ostrożnie wprowadzić swój palec w ustka dziecinne, czyli się nie znajduie coś niezwyčajnego, i czyli też dziecię wystawić może język, czyli dobrze ssąć może, uważać to powinna. — Wszelako daie i w tém przestroę, że albo twardość, albo wielkość matezynéy albo karnicielki brodawki stać się może tego przyczyną. A gdyby się to zdarzyło, bynajmniey nie dopuszczać podcinania nikomu czynić, iak szkodownemu ran Lekarzowi, i wzbronie rozdrapowania paznokciem, przez takowe to powstają zaraz wrzodeczki, lub mocne krwi plynienia, a dość częste bywają zdarzenia, że się obejdzie bez operacyi, ponieważ późniéy dzieci ruszając coraz więcéy językiem, powoli przerywają wiązadelko, a gdyby to nie miało nastąpić, z operacyą można do dalszego czasu przeciągnąć.

*O zapaleniu Oczków.*

Zwykłe zapalenie oczów samo od siebie ustaie, co gdyby po kilku lub kilkunastu dniach u przychodzących na świat dzieci nie ustępowało, czynić okładania wolne wody z mlekiem



zmięszawszy. — Lecz zdarza się, że i późniéj dzieci dostają toż zapalenie, kiedy patrzą na ogień lub słońce. uchylenie téj przyczyny i unikanie a iéy też okładanie lub przemywanie są środki pomagające.

### *O ropieniu gruczołów powiek.*

Nabrzmiwają nieraz dzieciom powieki pomiędzy 3. a 14. dniem po urodzeniu, iakoż stają się czerwonymi powieki, a zostająca lepka ciekość w ich gruczołkach gęśnieie i zakleia powieki, że się otwierać nie mogą, przez co zapatrując się na iakową choć umiarkowaną iasność, doznają boleści, a kiedy toż zlepianie trwa długo, utracają dzieci apetyt i sen, doznają wstrzymania stołeczków, mocno się pocą, chudnieją, wpadają w biegunki koloru zielonego lub zwarzone oddają stołeczki. Te symptomy nieraz trwać zwykły długo, gdzie oczy od powiek zamkniętymi zostają, a zwykła nieraz błonka rogowa przechodzić w ropienie, przez co reszta organizacyi oka się psuje. — Choroba ta iest długa, leczenia wymaga od 6. 12. tygodni. — Przyczyną téj choroby byđ może za wcześnie dzieci na mocne światła za-

patrywanie się, zanim się do rady powoła znawce, można z niemłą pomocą zastrzykiwać pokarimem powieki, i wpuszczać tenże pod powieki, alboliteż i przemywać rumiankiem z wodą na wpół zinieszaną, i w tym dźbło szafranu moczyć.

### *O zatkanii nosa czyli sapce.*

Kiedy toż zatkanie iest przytomném, dzieci powszechnie miewają ustka otwarte i ssać nie mogą. Niektóre z nich wydają ton podobny kurom mającym pypeć, czasem rozwalnia się dość prędko flegma, zatykająca otwory nosowe, wydrążenie ust, powietrzny kanał, i do uduszenia przyczynić się może. — Jakoż doświadczył tych smutnych wypadków Schäfer, *über die gewönlichsten kinder krankheiten* na stronie 32. gdzie w dwóch miesiącach dość silne dziewczątka, iedna w godzinie, druga dnia trzeciego życia, nagle siniąły, czerniały, i pomarły, otwarte ich piersi krwią napelnione znaleziono. — Przykład ten niechay służy Rodzicom za przestroę, iak naukę, ile mogąc temuż nieszczęściu silnie i niekosztownym sposo-



będę zapobiec; iakoż dostrzegłszy, uhiąć główkę w górę, i klę z ustek palcem obwiniętym płótnem ile możliwości wydobyć, a z nosa umaczane wiakię tłuści piórko w nos wprowadzić, lechtając nim wydrążenie nosowe, przez co następujące kichanie uwalniające flegmę, a zatym i wolniejsze tchu branie następuje, można także strzykać w nos pokarm, i to często czynić wypada, dla wstrzymania powrotu nowego noska zatkania, kilka razy nos pokarm zimną wodą obmywać, i dać dziecięciu ię wachać, trzymając gąbkę w nię umaczaną.

### *O Róży nowo narodzonych.*

Ledwie nie zwyczajnie po narodzeniu dostają dzieci na palcach, rękach, stawach u nóg lub samych nogach różowych zapaleń, a te w kilka dni nikną, wtenczas się tylko niebezpiecznymi okazują, kiedy okolice pępka lub części rodne napastują, a późnię i na cały żywot się rozszerzają, takowe przechodzić zwykły w gangrenę, kąpiele z rumiankiem, otrębami robione bardzo są pomocne, iak temu nieszczęśliwemu wypadkowi zapobiegać.

### *O wzruszeniu nerwów czyli konwulsjach.*

W nowo narodzonych bywają nader niebezpiecznymi, a w gorących klimatach śmiertelnymi. Za nim znawca przywołanym będzie, służą następujące środki naprzeciw takowym, rumiankowa herbata osłodzona, po łyżce od kawy dawać często. — Równie z dobrym skutkiem służą enemi z rumianku, oliwy, oleju, lub z masła, w przypadku gwałtowniejszych gorączkowych ciasto Nr. 18. naprzemian na ręce, łytki przykładac. — Na powierzchowne znowu wzruszenia służą powyżę zalecone środki, do których dobrać radę okładania żywota ciepłym rumiankiem z winem, a w końcu i kąpiele, do których można dodać potażu czyszczonego pół łota, lub zagotować z wodą, popiołu łyżek dwie od iedzenia, dawszy się ustać, wodą czystą zlać, zimną rozтворzyć i w nię kąpać podług potrzeby dwa lub trzy razy na dzień. — Do sympatycznych środków, z doświadczeń w podobnych zadrzeniach umieszczam radę lekarza Szwaycarskiego Gisar, wystarać się o młodego gołębia, którego tyłek oczyścić należy, a ten właśnie na



części chorego tu i owdzie przyłożyć, wnet gołęb dostaje niewyuczynego tchnienia, zdycha w kilku minutach, uwolniwszy chorego od konwulsyów, przynajmniej na ten raz.

*O Spazmie szczęk Dziecinnych czyli  
szczękowości.*

Ta choroba bywa właściwą dzieciom nowo-narodzonym, a nawet i starszym. — Opis iéy: krzyczy silnie, oddycha iakoby przytłumiono, twarz dostaje blado-żółtawego koloru, chociaż pierś porywa, wszelako bez ssania, szczęka staie się nieporuszną, opada że usta otwarte bydź muszą, a dziecię nieco spokojnieyszém bydź zaczyna, wszelako połykanie uszkodzone a dość często i niepodobne. — Dziecię bardzo słabieie, nie wydaie żadnego głosu, wszystkie muszkuły szyi, karku, stają się wyprężonemi, rzenica wryta, wstrzymanie stołeczka i urynki, oddychanie krótkie, ciężkie, tak dalece, że przy każdém cała pierś się unosi. — Choroba ta trwa niekiedy godzin kilka, bywa dość często i zabijającą. — Wszystkie tu lekko lażujące rzeczy uważać można za tru-

ciznę, iakoż nieraz śmierć sprowadzały.

*L e c z e n i e.*

Nayskuteczniejszym środkiem na przeciw niéy iest częste szczęki ręką nacieranie, dawanie enemków z rumianku, oliwy, masła, wolne kąpiele na w pół z mlekiem i wodą, w której wprzód gotować rumianek, otręby, które ledwie nie co godzina powtarzać należy, a dzieci zakrapiać herbatą z bżowego, lipowego kwiatu. Innych oprócz tych środków naprędce użyć nie radzę, i dla tego opuszczam takowe, a wcześnie wezwanie znawcy polecam.

*O przyciśnięciach i miejscach sinych.*

Bądź to przyciskiem, bądź uderzeniem miejsca doznające ich zwykły siniec, na te przypadki, zaraz na początku letnie okładania dla zmniejszenia bólu, z wody, dwóch części octu i wódki po częstce trzeciéy zmieszać, i chusty złożone umaczawszy w niéy często okładać, późniéy też okładania coraz zimniéy, a w końcu i wcale zimne co pare godzin robić. —



Jeżeli przy tych przypadkach żądny nie było ranki, i ciało niezbyt drażliwe, można do następnej ilości, np. pół kwarty wody, łyżek 3. lub 4. octu winnego i tyleż wódki czystej, a lepij jeszcze kamforowej z dwoma łyżeczkami od kawy soli kuchennej w tym rozpuścić, i na tenże użytek przeznaczyć. — Można na tenże sam zamiar wino Francuzkie same ciepłe, lub rozmarynem, lewandą, i innymi pachnącemi roślinami, a szczególnie służy kwiat tranku górnego (*Flores Arnicae*) kiedy jest pod ręką, lub go dostać można, domieszawszy do powyższych ziół, gotować, przecedzić, i takżę okładać początkowo ciepło, coraz chłodniej, aż nakoniec wcale na zimno.

*O zaięczy czyli rozpadłej wyższej wardze.*

Nie dla innego zamiaru umieszczam tę natury w utworze wadę, z którą nowo - narodzone dzieci na świat przychodzą, tylko ażeby wiedzieć, iak sobie względem ssania postąpić, aby dzieci przy życiu zostawić. — Rozpadłość ta powiększący części bywa przy wardze wyższej, czę-

sto pojedyncza, rzadziej podwójna, nieraz dochodzi pod nos, niekiedy przy tym rozpadnienu znajduje się kości podniebieniowej, i szczęki rozpadnienie, tak dalece, że wydrążenie ust, nosa iedno urabiają wydrążenie. Taki więc opis tej wady zrządza nie tylko w młodociannych życia dziecinnych chwilach, o których się zaraz mówić będzie, znaczne przykrości, ale nawet i w dalszym wieku, iakoż uszkadza toż rozpadnienie mówieniu, osobliwie słów wargowych, mówiąc zaś, ślina z ust wypływa, lecz obok tego ssać dzieci nie mogą, nawet i nie z ciekących pokarmów połykać, a każdą do ust wziętą przez nozdrze oddają, dla tego też dzieci nieraz po urodzeniu przez brak pokarmu umierać muszą. Lubo wcześniej temu zapobiecżyc można przez operacyą wiadomą Lekarzom ran, i którą z pomyślnym skutkiem, nie czekając dalszego czasu, uczynić można, z powodu że dzieci śpią wiele, przez co opatrzenie nienaruszonem zostaje. — Radzi w prawdzie Petit, ażeby takowe dzieci do w pół odłożonych kóz cyków przysadzać, ponieważ przez miękkość ich, długość i grubość rozpadnienie to przykrytem zostaje, wszelako często wyciągać po-



trzeba cycek, ażeby tchu nie uszkodzić, poniekąd myśl ta iest pochwałą godną, aczkolwiek z wielu przyczyn do wykonania trudną, lub wcale niepodobną, wypada więc dobrać karmicielki, któraby miała brodawki długie a do tego grube, a jeżeli bydz nie może, dziecię głodne kończyć życie musi.

W takim więc przypadku z pomyslnym skutkiem użyć radzę Reicharda karmiącęj flaszeczki, a któręj opis przy ssaniu dzieci w Części pierwszej tego dziełka umieściłem.

#### *O czerwonych plam wyrzucie.*

Dość często w pierwszych po urodzeniu miesiącach dostają ich po twarzy, plecach, a nieraz i po całym ciałku. Tylko się przy nich wystrzegać potrzeba dzieci nie zaziębiać, często kąpać, a oprócz tego żadnego innego leczenia nie potrzebuia.

#### *O pęknięciu skóry.*

Albo poychodzi od odmrożenia członków, lub iak się nacyzęścięj zdarza, kiedy dzieci z zimna zaraz do ciepła się udają same, lub przez nieostrożność

karmicielek i piastunek. Nayskutecznięj ku temu służą częste wodą zimną obmywania, przykładania lodu, śniegu w czasach ich mienia, a smarowania tłustemi rzeczami, iako to: oleiem lnianym, sadłem niesoloném, niestarem masłem, sprawuią ulgę, i których też na przemienne użycie pomyślnie służy.

#### *O ognipiórach (crusta Lactea).*

Wyrzut ten okazuje się na czole, policzkach, a późnięj zajmuie i całą twarz, są to pryszczę wielkości soczewicy, pojedynczo występuia, a powoli zlewaią się, otrzymuią w sobie żółtawą ciekłość, utwarzaią z wyrzutu tego skorupę dochodzącą nieraz do oczu, powiek, że w końcu na oczy dzieci patrzeć nie mogą. — Wichmann zaś dostrzegł, że szybko zajmowały wydrążenie ust iak grzybki (*aphtae*), że dzieci ani ieść, ani pić nie mogły. — Wszelako temu wyrzutowi nie bywa przytomną febra, nie tylko iemu podlegaią przy piersiach dzieci, ale nawet pięcioletnie i sześciolletnie nie bywaią od niego większe i dorosłe nawet wolnemi.



## L e c z e n i e.

Cała ta skorupa, powoli podsycając odpada, na przyspieszenie czego, smarowanie śmietaną słodką, kwaśną, masłem młode, mlekiem z wodą, w której rumianek, bżowy kwiat był gotowanym, w po pół zmięszawszy, odmiękczać, można nawet zlewania ogniopiórowe papierem woskowanym okładać, i to zwykło odmiękczeniu dopomagać. Powieki można albo tą samą wodą z rumianku, bżowego kwiatu na w pół z mlekiem razy kilka na dzień przemywać, i nigdy ich na sucho nie roztwierać, rzęsy bowiem przytem wydarte nie zwykły na nowo odrastać. Przyspieszy się podsychanie, i nowemu wyrzutowi zapobieży, nie dopuszczając dzieciom skubać, drapać, obwinać rączki chusteczkami cienkimi, a lepić jeszcze pęcherzem ciętym, wieprzowym, które pierwéj do miękkości rozetrzyć należy, wewnątrz zaś matki lub karmicielki, dla miłości pierwsze, drugie dla przywiązania pić powinny ziółka tak zwane Bratek z Siostrą (*viola tricolor*), tego wziąć garści dwie, drzewa *Sassafras*u łyżkę pełną, lub w zastępstwie jego łopio-

łopianu łyżek 2. 3. gotować w półtory kwarty wody do zostania się kwarty, przecedzić, codziennie takową ilość wypić zacząwszy od rana, a po obiedzie dopiero w godzin 3. 4. Codziennie kąpać dzieci w samej wodzie lub z dodaniem czwartéj części mleka. — Niezwykły ten wyrzut zostawiać po sobie oszpeceń twarzy, chociaż nie raz długo i uporczywie na twarzy osiada. — Przy tych środkach pozostać radzę, przestrzegając, aby się niepoważano obmywać wodą Gulardową, lub jaką inną maścią, w prawdzie przyspieszyć można tego wyrzutu zagubę, ale za nim zwykło przystępować krótkie tchnienie, konwulsye, paraliż rączek, nóżek, i sama śmierć. — Bywa nadto i drugi gatunek tego wyrzutu.

## Ogniopióra liszajowe.

Zupełnie jest różnym od powyższego, i napada tylko dzieci zdrowe, mocne, osobliwie przy piersiach, także bez febry, najczęściéj się okazuje na przodzie uszów, i to ma szczególnego, kiedy karmione bywają przez matki, rzadko przez karmicielki. Wiele z dzieci

Część II.

14



dość długo bez żadnej przykrości i wypadku znoszą ten wyrzutow gatunek. — Sposób powyższy postępowania w leczeniu i tu służy zupełnie.

### *O łupieżach na głowie, ich leczeniu.*

Powszechnie zwykły wszczynać się u dzieci, których główki za ciepło trzymają, kiedy tymże wdziwiają czapeczki puchem, futrem lub też bawełną przyszywane, kiedy obmywszy dla czystości główki, niebacznie na powietrze wynoszą, bywają iak małe krosteczki, a te nicraz, zlewając się, aż do czoła dochodzą, robią skorupki na sobie leżące, i te powoli odpadają, przy czem zwykły dzieci doznawać swędzenia, i lubią się drapać, i tu się daie przestroga, aby ten wyrzut przez się nie nieznaczący nie był z główek przeciwnemi rzeczami spędzany. A na odwilżenie iego nigdy nie radzę używać masła lub iakięć innęj tłustości, które zatykając pory, do oczów zapaleń, powiek, i głowy bólu przyczynić się mogą, dobrze się przeciw nim uczyni, kiedy się miękką szczoteczką codziennie szczytywać będą, lecz to niewiele pomoże, ponieważ nowe na-

stępuią, potrzeba więc to wszystko, co za wiele główki ogrzewa, zaniechać, i owszem często z głową otwartą dzieci na powietrze wynosić, — to jest całe leczenie. — Równie i dostrzegano, że dzieci często krzyczące temu łupieżeniu podlegają, ponieważ krzyk większy krwi i innych ku głowie cieków zwykły zgromadzać.

### *O zaognieniu uszów.*

Nietrzeba wiele bawgrać, lecz naturze zostawić, wszelako uszy w czystości zachować, a nadto wystrzegać się smarowania olejami lub tłustościami, dla uniknienia gorszych wypadków.

### *O Grzybkach (aphthae).*

Są to małe, okrągłe, białe lub żółtawe pęcherki bardzo do zsiadłego mleka podobne. — Najpierwéj powstają na wewnętrznym brzegu wyższej wargi, lub też w ich kątach, dalej w wydrążeniu ust, na języku nieraz zwykły się one rozszerzać, zajmują całe ust wydrążenie, a czasem gar-



dziel, żołądek, i cały kanał kiszek aż do stolcowey. Niekiedy znowu zginąwszy, dwa, trzy, i cztery razy powracają, a kiedy nowe wystąpić mają, powszechnie dawne po nich miesca białym klejem przykryte bywają, nie zrzędza iednak żadney obawy, kiedy są wilgotne i czerwone. — Grzybki te bywają dość często pierwszą dzieci chorobą, iakoż się zwykły już w pierwszym lub drugim tygodniu okazywać, niekiedy znowu piątego lub szóstego życia miesiąca. — Dzieci albo śpiące bywają, lub sen utracają, niespokoyne, wargi ich gorące, polykanie trudne, lub ssac nie mogą, albo dostają biegunek, obfitego urynki odpływu. — Drugie znowu cierpią na zatwardzenia, stają się niespokoynymi, płaczą silnie, ślinią się, mają mocne pragnienie, skórę gorącą, częstych dostają w żywocie boleści. — Pod takowemi znamionami przedstawiać się zwykły te grzybki, i coraz więcej się ich pomnaża, nakoniec dostają czkawek, chrapowatości głosu, i pozbywają się mocno cuchnącego stoleczka, chudną młode dzieci, łatwo napaastowane bywają od wzdrygań, wzruszeń i samych konwulsyów, co większa brodawki pokarmiające od ostro-

ści ssących naruszane bywają, i ranek dostają. — Niezawsze ta choroba tak zjadliwą bywa, a grzybki żadnych smutnych za sobą nie sprowadzają wypadków, dostają ich niewiele dzieci, niebywa przy nich uszkodzone polykanie, trwają powszechnie dwa lub trzy tygodnie, a są tym łagodniejszymi, im bywają rzadszemi, kiedy tylko w ustach się zneydują, a są przezroczyste, białe, wilgotne, prędko też zwykły odpadać. Bywają znowu niebezpiecznemi, powstając licznie tym więcej, kiedy się zlewają, a wewnętrzne ust części zajmują, boleści też daleko silniejsze towarzyszą, tchnienie bywa coraz trudniejsze, kaszel mocny, polykanie uszkodzone, biegunki boleści żywota przystępują, a kiedy brunatnieją, tém gorzej czerniejąc, dech cuchnący, opad siłek, a naygorzej kiedy się do tego fioletowe plamki po ciele okazują, jest niebezpieczeństwo dla życia prawie zapewnione.

Przyczyny do tych grzybków są: zaniedbana około dzieci czystość, niedobry zwyczaj matek karmiąc swe dzieci, dawać im przy piersiach zasypiać, lub po karmieniu nie wycyszczać ustek, ponieważ pozostałość



w ustkach pokarmu kwaśnienie, a kwas tak tkliwe iak drażliwe cząstki ust drażni i narusza, do téy przyczyny i następujące słusznie należą, iako to: kleiste, mączne posiłki, zaziębienia, za ciepłe dzieci utrzymywanie, namiętności karmiących, używanie trunków gorących, siedzenie ich w izbach nieczystych, nieodświeżanych, nieczystość około siebie zaniedbana. — Na szczęście, że niekonieczuie wszystkie dzieci mieć powinny też grzybki, iak ich łatwo dostać mogą przez powyżéy umieszczone przyczyny, a unikając ich, wcale od tychże bywają wolnemi. — Równie i tu pominąć nie mogą szkodliwości do tego mocno się przyczyniający, używanie smoczków, osobliwie kiedy takowe nieczysto utrzymywane bywają.

W celu zapobiegania im, trzeba dzieci najmłodsze nawet w pierwszych dniach życia, osobliwie latem, na świeże powietrze wynosić, a zimową porą często przez dzień świeże do izby wpuszczać powietrze, wszelako ostrożnie, aby dzieci od zaziębienia i ciągu powietrza ochronić.

*L e c z e n i e.*

Pomiędzy środki, które się tu podają, liczyć można częstych ciepłych kąpielek użycie, ile zaś razy ssie dziecię, zawsze wyczyścić ich ustka, obwinąwszy palec cienką szmatką w zimnéy wodzie umaczaną, a nie źle się uczyni, kiedy w pierwszym zaraz po urodzeniu tygodniu przyswoić dziecię co rano łyżeczkę od kawy wody czystéy zimnéy połykać. — Jeżeli się okazują częste, co prędzéy zaradzić potrzeba, ponieważ zwykły się szerzyć dość szybko, prze co nie mało dzieci umiera.

Dla zapobiegania téy stracie z nie-małym skutkiem, prócz powyższego w czystości zachowania, służy dobrze proszek dziecienny Nr. 1<sup>mo</sup>. po nim dzieci oddają kilka stołeczków, wtenczas na pare dni dawanie iego wstrzymać pokąd ulgi w cierpieniach i wstrzymania wyrzutów, szerzenia się iego i ulepszenia nie dostrzegamy.

Do ścierania zaś z dobrym skutkiem użyć można nieco ostrawego płótna, flory i t. p. Do tego smarować piórkiem razy 2. 3. na dzień umaczaném w następującym syropku. Wziąć Boraxu ziarek 15. na proszek



zetrzeć, rozpuścić w łyżce od kawy wody czystej, i dodać parę łyżeczek miodku różanego lub czyszczonego miodu praśnego, pokąd nie odpadną. Starszym nieco dzieciom dawać pomiedzy pokarmem mleko ciepłe z dwoma częściami wody zmieszane pić obficie. A co się dotyczy ochrony brodawek, tu służy smarowanie olejkiem migdałowym, śmietaną słodką lub i kwaśną, ale wtenczas dając ssać piersi, trzeba dobrze obmyć, jeżeli zaś brodawki nadzarte bywają, sztucznie ich pokrycia naśladowujące naturalne służą, a o tych już się w Części pierwszej namienilo, pokarmienia flaszeczką, lecz i o tej w pierwszej Części przy ssaniu dzieci opisaney do czasu zagojenia użycie téż niedość zalecam.

#### *O wewnętrznych głowy darciach.*

Zwykły dzieci, zdając się być śpiącemi, powiek zupełnie nie przy-  
mykać, i wtenczas dostrzedz można pod takowemi powiekami, że dzieci tu i owdzie oczy poruszają, tak dalece, że nieraz białko oka wgóre uniesionem bywa, przytém różne z twarzą czynią poruszenia, oraz i z wargami,

zdaie się, iakoby się uśmiechały. Małe nadto dzieci bywają niespokojnemi, i często zwykły się zrywać, chociaż by też lub lekko lub wcale ich się nie dotykano, do tego często kolanka ku żywotowi zbliżają, a ten bywa dość często natężony, twardy, od wiatrów pełny.

Daléy nabywają smutnego weyrzenia, tchu krótkiego, nieraz tenże przerywanym bywa, nos się zakończa, okazują się sinawe pod oczami obrączki, i dzieci umierają. — Zanim się te cierpienia w swoiey rozwiną zupełności, zwykły dzieci nie śpiąc głowę w net w tę lub ową stronę poruszać, osobliwie o poduszkę tylną iey części, znaki te bacności matek wymagające na kilka niedziel wybuch samey samey choroby poprzedzają. — Napady zaś iey nagle powstają, dziecię zaczyna mocno krzyczeć, lub wómitować, nakoniec powstają spazyny przechodzące w znacznieysze wzruszania, lub sen śmiertelny.

Radzę przeto matkóm, aby i same były na nie bacznemi, i toż dziecinnyim sługom czynić zalecały, a to dla niestracenia dzieci, które wczesnym ratunkiem od śmierci zabezpieczone być mogą, i to, że łatwe jest



zapobieganie, jeżeli więc od wiatrów wstrzymania, co się poznać przez odętość żywotka, lub wstrzymanie stolca, co prędzcy dawać enemki uwalniające stolec i wiatrów odeyscie, a te nie inne bydź mają, iakie już w tém piśmie podałem, lecz oprócz tego iak naydokładnięcy wypytać się, czyli dziecięcia żołądek nie iest przeładowany, w tém znowu zdarzeniu nie czekając dać proszek na wymioty z ipekakuany dwa lub trzy ziarka na raz, iak się to już pò razy kilka nadmieniło. — Ale na uprzedzenie téy choroby służy przestroga, któręy zapominać nie radzę, ażeby dzieci po karmieniu trochę pobawić, a nie kłaść ie iak zwyczaj do usypiania. — Do tych środków leczenia dzielnie dopomagają ciepłe i często dniem brane kąpialki, wolne nacierania ręką żywota, lekkie po krzyżu bicia, a nadewszystko mieć na te przyczyny wzgląd, lepięy ie w cześnie u-unąć, a przez co i wybuchowi choroby tak niebezpiecznęy zapobiec.

Równie ważną iest rzeczą, aby matka sama była zdrową, żeby się nie wystawiała na zaziębienia, unikała zmartwienia, zgryzot, smutku, raptownęy pociechy, przestraszenia, ta-

koż utrzymanie dziecięcia w czystości, nacierania całego ciała z iego członkami, rękami ciepłemi, niedość zalecać powinienem, wreszcie dobrze służyć przykładania materacyków na główkę z kwiatu rumianku, bżowego, nieco szaławii i macierzanki, przykładania na łydkach synapizmu bez dodatku chrzanu, z gorczycy, chleba i octu robionego. — Potężnym iest środkiem zapobiegawczym przyzwoity dzieci odchów, a tego warunki w Części pierwszcy pisma tego podane zostały.

#### *O ulatającym ogniu dziecinnym.*

I ten wyrzutu gatunek okazywać się zwykł na podbródki, wczasie wyrzynania się zębów, lecz nieraz przez dotykane się iego i rozszerza się, nie potrzebuie żadnego leczenia, dla tego tu umieszczam go, aby tegoż niczém nie roziaćtrzać, i zostawić sobie samemu, iakoż nieraz znaczną ulgę przynosi biegunkom przy wyrzynaniu się zębów.

#### *O boleściach oczów i ich zapaleniach.*

Zapalenie oczów zwykło się poznawać po ich czerwoności, nieraz i



powiek razem obrzmiałość bywa przytomną, iakoż dość często otworzyć ich nie mogą, a chorujące czują znaczną gorącość i ciśnienie, iakoby od obcego ciała, nieraz mniemają, że im coś w oczy wpadło, chociaż otém ani myśleć nie można; światło staie się dla nich nieznośnem, powiększa się coraz czerwoność zajmująca cały oka białek, a w najwyższym stopniu tenże białek iak sukno czerwone wygląda, a kiedy nie odstępuje czułość na widok, iest dobrym znakiem, iak obawa niemała przy utracie téjże czułości.

Równie takż iest niemałym niebezpieczeństwem, kiedy febra, mocny hól, małaczenia się dołączają, a prawie ledwie nie powszechnie bywa, że gdy iedno oko cierpi, że drugie różnem bywa.

Rozróżniać się zwykło wilgotne oczów zapalenie od suchego, przy pierwszym odpływała łzy, gdy przy drugim żadne, i to zwykło bywać, gdzie długie oczów zapalenia poprzedzały.

Może bydź zrażdżone zapalenie z przyczyny obrażenia oka, iako to: uderzenia, ciśnienia w niem czego, lub wpadłego pod powieki ciała obcego,

od zaziębienia, ostrości wiatrów, dymów, lub wpadnienia zręśców, daléy od wielu płaczów, tarcia oczów, natężenia wzroku przez szkła, czytania osobliwie wieczorami, nocami, od zbytowego światła, lub kiedy się rzęsy na powiekach zagną, że oko przez nie drażnionem bywa, od nadużycia trunków gorących. Niekiedy znowu zapalenie oczów bywa przytomnem wyrzucaniu się zębów, przy katarach, a bywa wypadkiem, wstępem wyrzutów skórnych, iako to: ospy, odry, szkarlatyny, świerzbów, zlew główek, dla tego to z wyrzutami główek nader ostrożnie się obchodzić, że nawet smarowania masłem, chroniczne czyli długie oczów zapalenie zrażdały.

#### *Sposób zachowania się przy zapaleniach oczów.*

Powszechną iak główną iest zasada przy zapaleniach oczów chronić się od światła i wiatrów. — Dla tego choroby znajdować się powinien w przyiemnem miejscu, przed oczami daszek zielonawy nosić, iezeli zapalenie iest znacznieysze, oczy nawet osłonięte bydź mają, lecz nie wtenczas, kiedy



przy nim powieki obrzmiewają, ponieważ się te zakleiać zwykły, gdzie obrzmiewania nie ma; lekką bindą obwiązać do koła głowy, mocna bardzo bywa szkodliwą, a pod opaską położyć kompresę z złożonego razy kilka płótna cienkiego. — Ale tu dać przestrożę, aby to opasywanie nie było za długo czynione, przez nie te wzroku organa stają się daleko drażliwszemi naprzeciw światłu, dla tego odiawszy opasanie, kazać nosić daszek zielony, a tak powoli wzrok do światła przywyka, a powracający do niego jeszcze izby ciemnej opuszczać nie ma. — Ledwie nie przy każdym oczów zapaleniu starać się przekonać, czyli iaki obce, a zatym i drażniące ciało się nie znajduie, dlaczego bynajmniej nie radzę czynić mocnego tarcia. — Ostrożność więc w tém następującą zachować wypada, nachyliwszy głowę nieco lekko powieki palcami przyciskając trzec, dla zmuszenia do wychodu obcego ciała, a to jeżeli wypływa, zaraz należy opatrzyć obwiązaniem, ale upominam, lekkim tylko, iakoż przez ten sposób przypływ łzów nieraz zwykły takowe ciała spłókiwać, co jeżeli zaraz nie nastąpi, lepiej się uczyni, kidy się oko bindką opasze,

iakoż nieraz takowe ciała z nocy na kompressie się znajdują, a jeżeli późniéj nie wypływa, pod powieki włożyć całe rakowe oko, lub pestkę od jabłka pod powieki, przez co przypływ łzów następuje, a z nim i spłókanie obcego ciała.

Srodki te bywają szkodliwe, jeżeli już czas nie mały ciało to pomiędzy powiekami a oczami zostawało, a do tego zapalenie dni pare przytomném było. — Jeszcze i tę dać przestrożę, aby tego nie czynić, jeżeli ciało obce niebywa okrągłe, a do tego gładkie, tylko kiedy bywa śpiczaste, ostre, ponieważ niepotrzebnie zapalenie powiększoném się staie.

Obok tu zalecanych z tą ostrożnością srodków, kiedy się jeszcze znajdują albo obce ciała, a do tego gryzące, iako to: wapno, tabaka, pył, kurzawa, że im prędzéj tém lepiej wolną wodą płókać, lub na w pół z ciepłym mlekiem zmieszaną, w której maczając gąbkę albo cienkie skubaniki, oko lekko nacierać skrapiać, można takóż jabłko pieczone na miazgę roztarte z dodatkiem ciepłego mleka pomiędzy cienkie płatecki na oczy przykładąć.



Po utąpieniu ciała obcego zwykły nieraz pozostawać ból i drażnienie, wtenczas znowu kąpać oczy w letniemy wodzie czas nieiały, lub bżowy kwiat w wódzie gotowany, przestudżony, i na w pół z mlekiem letniemy znięszany, a kiedy jeszcze ból trwa, uśmierza tenże klęzy z nasień pigwów lub pchlego z nieco szafranem bardzo mialko startym; jeżeli znowu toż zapalenie od rżesów pochodzi, nie zwykło też prędko ustawać, pokąd włoski te niebywają wyciągniętemi. — Kiedy znowu powieki zlepiają się, potrzeba ie w kątach wewnętrznych powoli roztwierać, aby wstrzymane łzy spływać mogły, przez co obrzmienie powiek zmniejszonem zostanie, i to po razy kilka na dzień czynić wypada. — Niekiedy znowu powieka wyższa tak mocno obrzmiewa, że się opuszcza, i niższą w części pokrywa, w takim znowu przypadku kiedy niekiedy przez dzień unosić wyższą powiekę wypadu, w spodniemy zanieczyszczenia znajdujące się lekko wolnym mlekiem spłokiwać, umaczawszy w niemy gąbkę lub cienkie skubanki. — I w tych tu bólach i zapaleniach oczów bynajmniemy od zachowania przynależniemy dyety.

odstę-

odstępować nie należy. — Nie można jeszcze chorym dawać wina, kawy, mocnego piwa, wódki, araków, pencezu i t. p. a nawet i żadnych korzennych potraw używać, nadto wszelkiego rozpalania, co większa moralnego unikać powinien, jeżeli wiek im przyciągającą siłę daje uczuwać, ma się nawet wstrzymać od czytania, pisania, płaczu i śmiechu. — Niektóre znowu dzieci są skłonne do bólów i zapaleń oczów, ale przyczynę tego wysledzić wypada, jeżeli ta nie jest zawartą w braku odchowu, np. kiedy pościółka blisko mury leży, lub jeżeli się w izbach dziecinnych z cegieł znajduje posadzka, lub jeżeli dziecinna izba nie jest wilgotną, iasną, jeżeli łóżeczko lub kolebka czerwonymi firankami a nie zielonymi bywa osłoniętą, lub jeżeli dziecię bywa w nich wystawione na światło wprost w oczy wpadające, jeżeli zbyt wielu głów rozgrzań przez zacieple tychże okrycia nie doznają, to wszystko iak bywa szkodliwe, prędko to złe nie może być usunięte, iak za zniesieniem cokolwiek tylko do przyczyn szkodzenia należy. Codzienne zmywania głowy wodą zimną nie prędko iak w dobre po wsta-



nia pół godziny, lub później, aby z pary nocnej dzieci zupełnie oschnąć i ochłodzić się mogły; częste ciała poruszenia, izby nie w czasie upałów słonecznych, naydzieńniej w celu zapobiegania zapaleniom i bólom oczów pomagają.

Te to są leczenia, atoli niedość upominać powinieniem, aby się żadnych innych, tak licznie zalecanych środków od ludzi nieznających sztuki, pomocy nie chwytając, przez takowe to nader licznie postradają na całe życie użytku organu nayprzyjemniejszego, ale że i poradnika jest powinnością udzielić, takowe iako nieszkodliwe umieszczam, a te są następujące:

*Srodki pomagające naprzeciw  
oczów bólu.*

<sup>1</sup>wszy. Zimna woda i téy w zapaleniach oczów bez obawy używać radzę, a w téy maczane chusteczki przykładac, co tém częściej czynić należy, kiedy toż zapalenie bywa początkowem, iakoż i częste nią czów przemiywania niezaniebdywać. Jakoż dzielnie służy, gdzie nie masz mocnej czerwoności, i mocnego bólu, a osłabienie

jest przytomnem, które powiększyć części wskutku poprzedniczych zapaleń przystąpić, lub i w konstytucjach flegmatycznych, wolnych ciał. — Bywa wszelako użytek zimnej wody bardzo szkodliwym, kiedy iak się namieniło czerwoność wielką, ból morderczy, i kiedy ten stan długo trwał, lub kiedy odpływ łzów ostrych jest przytomnym;

<sup>2</sup>gi Srodek zawiera rozmiękczające przykładania następujących rzeczy, iako to: rumianek, bżowy kwiat, lniane nasienie, bułka tarta z miodem na papkę gotowane, ale te zawsze chłodne przykładac; dając nie uiając przestrożę, zwłaszcza kiedy ból jest mocny, zapalenie i to niepożądane lecz kilka dni trwające, przeciwnie gdzie jest przytomne rozwolnienie, które i charakteryzuje zapalenie; iako to: przy konstytucji flegmatycznej, tam można z pachnących ziół, miętkwi, melissy, rozmarynu, lewand, bżowych kwiatów robić materacyki, i te suche więcey niż wilgotne na powieki przykładac.

<sup>3</sup>ci Srodek, jeżeli nie można powołać na prędce doradcy, a ratunek ten przy silnych bólach zwłoki bardzo szkodzić mogącey nie znosi, mo-



żna tymczasem, nóżki, moczyć w wodzie letniej, w której wprzód moczyć gorzycę całą, można na dydkach, na karku, rękach, przykładając naprzemian plastry z gorzycy, a tych robienie już w Nr. 18. Lekarstw umieściłem.

4<sup>ty</sup> Środek podaje się z powodu wyżey nadmienionego przykładania za uszami, lub pod i nad powiekami piśawek w czasie silnego zapalenia czerwoności oczów i ich białek.

5<sup>ty</sup> Środek, użycie lekko laxujących rzeczy, na ten zamiar kremortartari po pół łyżki od piersi dzieciom odstawionym dwa lub trzy razy na dzień z wodą dawać, lub w odwarze śliwek np. filizance moczyć w płócienko obwinięte liście Senesu, których wziąć można pół łota, aby w tym odwarze do przestygnięcia mokły, wycisnąwszy dobrze, dawać po łyżce; starszym po dwie co półtóry, co dwie godziny, pokąd lekkie stolce nie nastąpią.

### O Jęczmieniu.

Małe obrznięcia nieporuszałne na brzegach powiek, w wielkości ziarka jęczmienia, przechodzące nieraz w szczupłe ropienie nazywamy jęczmie.

niem, często zwykło napastować dzieci, iak nieraz bywa wypadkiem wyrzutów po głowie, lub przy szkroficznych chorobach. — Jak tylko boleć zaczyna, wszystkie bałamuckie rady zaniechać wypada, a naleyściy służy kataplazm z bułki, białego chleba, lniwego nasienia mlekiem i nieco szafranem przykładac, letnio nie zaś za ciepło, iakoż pod nim to obrznienie się zmiękcza, i dać się nader łatwo wycisnąć. — Kiedy zaś dzieci często i wiele ich na raz dostają, oprócz częstych kąpielek nie bez rady znawcy czynić nie radzę.

### O Zaięczém oku.

Nazywamy zaięczém okiem kiedy powieki zamykać się ani też oka przykrywać nie mogą, i owszem bywa nieraz, że całkowite oko zostaje bynajmniej niepokryte, a że podobnie tak sypiają zaięce, ztąd też i temu dzieci snowi, iaki bywa i u starych, nazwisko to nadano.

Nieraz dają przyczynę do niego położenie dzieci, że światło po za łóżeczkiem lub kolebką, przez okna na skronie dziecinne pada, przez co dzieci



przywykaia mieć otwarte oczy, chcąc się na światło zapatrywać, iakoż muszkuły powiek nabieraią nieporuszalności. Skuteczniejszy na to rady dać nie mogę, iak następującą, aby odmienić położenie sypiania dzieciniego, iżby światło od przodu padało, a wyższą zaś powiekę przez plaster lipki (*emplastrum adhaesivum*) na płótnie rozsinarowany w szerokości pół do całego cala podług wieku do niższej części twarzy naprzeciwnie przylepić, i tak odmienaiąc, przez kilka tygodni czynić.

#### *O płynieniu z oczów.*

Jeżeli to nie bywa zadawnione, gdzie wezwać rady znawcy potrzeba, samemu pomoc można, przemywaiąc często wolnym mlekiem na w pół z wodą zmieszaniem początkowo, późniéj coraz chłodniéj, a nakoniec i wcale zimno czynić potrzeba.

#### *O Zyzowatości.*

Dzieci nabywaią téj wady, kiedy na jedną stronę noszone bywaią, lub po iednéj stronie pierś ssą, w obu

tych przypadkach zwykli oko ku iednéj stronie światła natężać, równie i dostawać tegoż wzroku, kiedy kołyski stoia że promienie światła albo w tył główki dziecięcia przyświecaia ukośno padaia, lub kiedy około dzieci chodzące osoby przywykną z iednéj strony stawać, a dzieci w tę stronę oczy zwracać są przymuszone. — Lecz równie pochodzić może zyzowatość od wewnętrznój wady organów wzroku, od naruszeń iego, upadku, uderzenia, a nawet przestachu; iakoż są tego doświadczenia, że przestraszone od węża lub podobnych zdarzeń dzieci zyzowatości dostały, równie nie zbywa na obserwacyach, że po ciężkich konwulsyach, wielkiéj choroby napadach dostawały zyzowatości. — Ta zyzowatość wnet iednem, wnet obójch oczy znaczniéj lub słabiéj okazuje się, u niektórych znowu bywa więcéj dostrzeżoną opodal, iak w drugich z bliżką, kiedy się na co zapatruia, a przy gniewie i przestachu powszechnie się wzмага.

#### *Środki doradcze.*

Im zadawniejsza a starsza jest osoba, tém ciężéj dać się poprawić,



w ogólności dość często usiłowania staia się nadaremne, im się zaś śpieszniej przedsięwzima ratunki, tém pomyślniejszego spodziewać się można skutku iak naprzeciwnie, a zatym iak się tylko zasada do niego dostrzeże, zaraz dzieci nakłaniać do wpatrywania się nadal, i wprawiać ie do patrzenia na odległe przedmioty, zachęcając ie, aby to czas nieiaki czyniły dla lepszego przedmiotów rozpoznania. — Można im na tenże sam zamiar iakowe figury lub zabawki kłaść na stole, powiesić na ścianie, aby się w odległości sposobu na nie wpatrywały: nadto skłaniać dzieci kilka razy na dzień po kwadransie czasu kazde oko osobno w zwierciadle natężono trzymać, naostatek zachęcać ie, aby na przedmioty wprost wzrok kierowały. — Usunięcie powyżey nadmienionych przyczyn skutecznie się przyklada, dla tego potrzeba iest, wszystkie zabawki naprzeciw wzrokowi podawać, iak łóeczka lub kolebkę ku światłu i wzrokowi stawiać. — Girtaner w swém dziele szacowaném o chorobach dzieci w Części pierwszey kar. 132. udziela ku temu następującą radę, a tę mam ia sobie za obowiązek tu umieścić. — Ta zawiera w sobie takowy sposób. „Kazać dziecięciu zy-

„zem nie tknięte oko przymknąć, a „drugiem na osobę przeciw niemu siedzącą w kierunku prostym wpatrywać się, zalecając zyzowatemu, aby „tknięte oko nie poruszał, i wtenczas „szybko drugie otworzyć.” Ta rada na początku niemających doznaie trudności, gdzie potrzebuie długiego czasu, są przecie pomyślne przykłady z dzieci, że ta rada, w dziewiątym roku życia od zyzowatości uwalniała. — Wszystkie inne środki, iako to: noszenie masków, przykładanie na iabłko oka wytoczone z rogu, drzewa wydrążenia toż iabłko oka przykrywające, iak w środku znajdujący do wzroku otwór, i tych przez przywiązanie około głowy ciągle noszenie, wycięy się do zyzowatości iak pomocy przykładają.

#### *O bólu uszów i ich zapaleniu.*

Dość często dostają bólu uszów przy wyrzynaniu się zębów, lub i bez niego, a to się zwykło poznawać nieraz przez obrzmienie ich. — Bóle takowe bywają silne dla bliskości mózgu, i z niego pochodzących nerwów, iakoż towarzyszą febra, gorączka, głowy bóle, majaczenia, a te dość sil-



ne, co większa, jeżeli ten ból nieopuszcza, przystępować zwykły szaleństwa lub konwulsye. — Powierzchownie nie daie się dostrzegać często żadne obrzmienie, czerwoność, iako znamiona zapaleń, a wszelako iest przytomném zapalenie, iakoż iego skutkiem iest silny ból, którego zaniedbanie smutne zrządza wypadki. — Mogą bydź do tego zapalenia różne przyczyny, może bydź w uszach obu ciał, iako to: insekt drobny, ziarko iakie, może pochodzić od zaziębnienia, od upadu na głowę, uderzenia w nie, iakoż silne okolo uszów uderzenia zrządzały te bóle, a może powstać i w skutku wstąpiionych na wewnątrz wyrzutów, iako to: świerzby i t. p. nieraz bydź może przez współnictwo części ciała chociaż od uszów oddalonych, np. w żołądku, bądź z którychkolwiek tu wyliczonych przyczyn, przecie zapalenie to zawsze niedobrem iest znamionem, może chory w dni kilka na zawsze pozbawionym zostać słuchu, lub życie utracić.

### Leczenie

W użyciu środków ostrożnym być potrzeba, aby obce ciało, jeżeli iest

przytomném, dalej nie popędzić, a kiedy tenże ból nie bywa tak silnym, można mu dzielnie dopomódz przez materacyki z ruinianku, bżowego kwiatu, można wpuszczać w uszy przez lijek pare wolną z tychże samych kwiatów lub wody, mлека, a jeżeliby przypadkiem pochodził od wpadnienia iakiego insektu, nie masz skuteczniejszego środka nad wpuszczanie w uszy po kilka kropel oliwy, oleju na odebranie mu życia, razy dwa, trzy dniem, można takoz i włos ludzki wkładać w ucho, aby ponim wyszedł insekt, jeżeli od zaziębnienia, za uszami postawić synopizma, Nr. 19. w ucho włożyć małe ziarko kamfory bawełną obwinięte, pić miasto herbaty bżowy kwiat, nogi w wolnę wodzie moczyć, do téy nóg kąpeli można wsypać gorczycy całej garść i tyleż soli kuchenney, parząc ie moczeniem wprzód w gorącey wodzie, te moczenia nóg podług potrzeby dwa lub trzy razy na dzień powtarzać. — Jeżeli znowu bywa silna febra z gorączką, za uszami piiawek kilka postawić, i krwi dać odpływać, często mnyrysea, na których powstają znaki ukąszenia piiawek gąbką lub cienką szmatą w wolnę wodzie zmaczaną drażnić.



*O ciężkim słuchu i głuchocie.*

Dzieci są wystawione swój słuch poczęści lub też i całkowicie utracić, a to przez wzruszenia mózgu, za mocne dźwięki, kołatanie, zaziębienia, wpadnięcia obcego ciała, insektów, wstąpienia wyrzutów głowy, płynie-  
nia częste z uszów materyi, świerzbę przez osad wyrzutowey materyi, iako to: ospy, odry i t. p. upadnięcie na głowę, przez policzek mocny.

*Leczenie*

Mnięć się tu spuszczać wypada na różne rady, a do tego nierozsądne, iako nie odpowiadające przyczynom, i owszem dość często tymże przeciwnie, takowe stać się mogą bardziej szkodliwemi niż pomocnemi, wszystko przy powyższych uszów cierpieniach podać, służyć może i do tego cierpienia.

*O ostrożnościach przy Rupturach Dziecinnych.*

Opisując rupturę pępkową, wszelkie inne dla ważnych przyczyn opuścić, przecie podania ostrożności

pominąć nie mogę, chociaż takowym rupturom, zwłaszcza u dzieci, a do tego kiedy są początkowe, łatwo zaradzić i dość skutecznie można. — Położwszy wznak dziecię, część wystą-  
pioną bez żadnego gwałtu na swe miejsce za pomocą palcy wpowa-  
dzać. Jeżeli zaś dziecię nie ma wol-  
nego stołeczka, dać mu wypada enem-  
kę z mleka, oleju i t. p. Po wprowadzeniu, miejsce to często zimną wo-  
dą obmywać, i opaskę stosowną oko-  
ło żywota, lub gdzie wypadnie, potrze-  
ba za poradą znawcy przyłożyć. —  
Obok tego dzieci z rupturami osobliwie świeżemi, niepowinny używać potraw  
wiatry sprawujących, trzeba do tego  
na nie być baczniemi, i nie dopuszczać  
skakania, tańcowania, mocowania się,  
ieżdżenia, a nawet i prędkiego cho-  
dzenia, osobliwie w czasie upałów, ie-  
żeli doznają wstrzymania stołeczków,  
dawać enemki. — Wszystkie zatym  
plastry, smarowania, sympatyczne śro-  
dki, lub zabobonne, iako rozumowi  
przeciwnie, zupełnie odrzucić.

*O Zatruciach.*

Dzieci, osobliwie po wsiach, sobie  
bez straży starzych zostawione, nieraz



iedzą korzenie, liście, lub też i jagody moc trucia mające, lub też i na zatrucie much tak zwane muchary ziadaia. Takowe zdarzenia dość szybkiey, roztropney wymagaią rady, a spóźnienie iey, lub niedoleżna, niebawnie dzieci z życia pozbawia. — Zanim się ku temu skuteczne podadzą środki, umieszczam tu nader pożyteczną przestrożę, aby takowe zioła, korzenie i jagody w bliskości pomieszek wiejskich wytepić, a dorosłe osoby zaznamić z niemi. Jakoż dla tego użytecznego zamiaru szacowny lekarz Becker radzi, aby po wsiach nauczyciele szkółek parafialnych posiadać mogli wiadomość doskonałą o szkodliwych roślinach, i aby z niemi zawiadomić mogli swych uczniów, wraz z wystawieniem skutków, iakich się z użytku ich niemylnie spodziewać mają. — Oby ta tak zbawienna dla ludzkości rada mogła czynić wstęp do iey upowszechnienia, ileż było nieszczęśliwych, a dla braku znajomości padaiących śmierci ofiar, przy życiu ocalić można, iakoż łatwo daia się nieraz uwodzić smakowite zakosztowania wilczey jagody (*atropa Belladonna*), świniey wszy (*Cicuta virosa*) szaleiu i t. p. roślin.

Na wszelki zatem przypadek pod ręką mieć potrzeba podane środki ratunkowe, lecz takowe poprzedzać muszą zawiadomienia znamion okazuiących się z użytku takowego, lub podobnych zjadliwéy natury rzeczy.

### Znamiona przyiętych trucizn.

Na wstępie téy materyi ostrzegam, że te znamiona nie zawsze zwykły charakteryzować przyięte szkodliwości tych lub owych rzeczy, ponieważ tu same przy innych chorobach przytrafiać się mogą, wszelako naprowadzaią na ślad do mniemań przyięcia szkodliwości zbytecznéy, z tych znamion są następujące:

- a) Nagła słabość z silnemi do tego znamionami, a to bez żadnéy przyczyny dostrzedz się mogącéy, np. silne i gwałtowne boleści, niepokojności, duszenia, wymioty, spazmy, wesołość, tańcowania, skakania. — W takim więc razie chociażby się dostatecznie nieprzekonano o użytku tych lub owych szkodliwości, nie zawadzi niewinną uskutecznić radę, a to



bez najmniejszój obawy. — Przy-  
stąpić do zdziałania wyniotów,  
nie przez żadne leki, lecz przez  
łechtania sztuczne, przez umacza-  
ne w oleiu, oliwie, oleyku migdało-  
wym co się z tych pod ręką znay-  
duie piórko, i łechtanie nim kana-  
łu pokarmowego, czyli powszechniey  
gardzielą zwanego, czynić po-  
czym dać letnią wodę samą, lub  
z masłem, oleiem, i t. p. pić po-  
dostatkiem, pokąd wymioty nie  
nastąpią, a na przypadek uparto-  
ści w ich sztuczném zrzędzaniu,  
przystąpić do dania takż bezpie-  
cznego proszku ipekakuany w do-  
zie wyżey podaney; przytém nie  
przepomnieć dawania enemków z  
mleka i wody, a po ustaniu ich  
kleiowe napoje, iako to: z kaszy  
owsianey, ięczmienney pić podo-  
statkiem.

### *P r z e s t r o g i.*

Jeżeli trucizny już czas nieiaki  
wewnątrz zostawały, a powyżey ich  
znamiona trwały, już dawać na wy-  
mioty nie potrzeba, lecz kleie z ka-  
szów, a do tego tłuste służą piciu.

Chcąc

Chcąc do wanny ciepłej wsadzać,  
a na przypadek i gdyby usta i szczęki  
miały się ścisnąć, trzeba użyć mocy  
do ich roztwarcia, aby wlewać wska-  
zane napoje, a przyczem chorego  
wstrząsać, wszelako gdyby nie można  
w ilości dostateczney wlewać z powyż-  
szych kleiowych a do tego tłustych  
napoiów, miejsce ich zastąpią żółtka  
od iaja zbite z oleiem lnianym świe-  
żym, migdałowym oleykiem, i te zmie-  
szane często po łyżce dawać. — Kie-  
dy chorzy przy tém zostaną odurzone-  
mi, mdlejącemi, lub w stanie bez przy-  
tomności, wynieść ich na świeży po-  
wietrza obwiew, skrapiać ich ciała zi-  
mną wodą, lub octem winnym. —  
Przekonawszy się dostatecznie iakięy  
natury chory użył trucizny, potrzeba  
i stosownych użyć środków, iakoż ró-  
żnić się zwykły trucizny na ostre,  
gryzące, i opaiające.

### *1<sup>mo</sup>. Ostre i gryzące trucizny.*

Znamiona ich są: wynioty nieu-  
stanne, wielkie tęsnoty, lecz zupeł-  
na przytomność. — Do klasy téy na-  
leżą powiększay części trucizny z kru-

*Część II.*

16



szczowego wydziału, iako to: arszenik, szeydwasser, kwas saletrowy, siarczany, antymon, olów, ocet z niego i cukier. — Z roślinnego wydziału: potaż, ługowe sole, mydła stare; — gryzące: ług mydlarski, wilecze tytoń, a z gadów: muchy. Hiszpańskie, małowki.

#### Środki przeciw tymże.

Wymioty sprawujące, iako to: ipekakuana, gęste kleie z kaszów, olejne enemy, okładania żywota wódką kamforową, mlekiem.

Do tych ostrzych szkodliwości można doliczyć i wódkę, którą dla dzieci za truciznę uznać można. Jakoż nie mało znajduję doświadczeń, że dzieci same sobie zostawione, dopadłszy wódki, której dowoli używszy, niebawnie w śmiertelne wpadały konwulsye, a tu służy co prędzcy także wymiot, użycie mleka, cienkie z kaszów kleie, lub zimney wody picia.

#### 2<sup>do</sup>. Odurzającey natuły.

Znamiona ich są: pomieszania zmysłów i rozumu, głęboki sen, krzycze-

nia, śmiechy, tance. — Do téj klasy należą powiększcy części z roślinnego wydziału; szalęy, świnię wesz, bieleń, dziedzierawa (*Datura stramonium*) i t. p.

#### Środki przeciw tymże.

Tu nie czekając służy ipekakuana na wymioty, kleie, serwatki, maślan-ka, mleko obficie pite, ocet z wodą, i także enemy, a odurzonych mimo tego na świeże powietrze wyprowadzić, lub w nieprzryemney porze otworzyć okna, i trzęść skronie. — Uczą znowu liczne doświadczenia także smutne, że przez nieostrożność lub niedozor używać nader szkodliwych zdrowiu rzeczy, powinnyby lepszy ściągnać dozór, do tego nawet należy: cokolwiek do iedzenia dostaia, aby było czyste, iakoż uczy nas doświadczenie Huflanda o iednym chłopczyku, któremu dano gruszkę nie obraną, dostał okropnych boleści w ustach i gardle, iakoż język i wydrążenie ust niebawnie obrzmiały, a późniy przystąpiły bóle żołądka. Zaradził przez wymioty, i powyżey podane środki, a zatym równie i z obcego doświad-



czenia mieć należy przestrożę, innych iak obieranych do iadła nie dawać dzieciom owoców. — Tu także należą cukierki i zabawki szkodliwemi farbami uharwione, lub gliniane a do tego polewane kuchenne narzędzia.

*O uduszeniu przez różne wyziewy,  
iako i zagorzeniu przez węgle.*

Rzazzenie węgla, piwo robiące, mocno pachnące kwiaty, dym izb, mogą być także smutnych wypadków przyczynami, i do pozornéj śmierci przez zaniedbania, albo przeciwnie ratowania, a od téj i do prawdziwéj doprowadzić śmierci, tu stoją następujące ratunki:

- a) Co prędzéj otworzyć drzwi i okna.
- b) Prędkie także oddalenie z miejsca tego uczynić z nieszczęśliwym.
- c) Skrapiać części ciała zimną wodą, lub kroplami spuszczać przez lipek, a o tém inż się mówiło przy materyi nieżywo przychodzących na świat dzieci.
- d) Ostrożne a do tego powolne i ciągle ciała całego nacierania.

e) Drażnić gardziel piórkiem w oleiu umaczaném.

f) Po przywróceniu do życia, potrzeba zachować i te przepisy:

<sup>1<sup>mo</sup></sup>. Ogrzewania w pościeli.

<sup>2<sup>do</sup></sup>. Dawać ciepło pić herbatę, rumianek, lub piwną polewkę.

Oznaki zaś do życia przychodzących są: drzenia całego ciała, wymioty, tchnienie, nosem poruszenia.

*O połknięciu niezwyczajnych rzeczy.*

Uczę nas dość często i smutne nawet zdarzenia, że dzieci polykają obce ciała, iako to: igły, pieniądze, szrót wielki, pestki od śliwek i t. p. poczem następują wymioty, duszenia, czkawka, a nawet i konwulsye, co prędzéj dawać im obficie pić mleka, serwatki, olejów lub innych tłustych rzeczy dla dania śliskości gardzielowi, iak ułatwienia przez to do dalszego posunięcia się ich, a ku czemu małe często uderzenia lub wzruszenia pomiędzy łopatki służą. — Bardzo bywa niedobrze, kiedy połknięte ciało uwięza w gardzieli, silnych dostaje wtenczas boleści chory, ponieważ i kanał powietrzny ściśnionym zostaje, a przy-



czém i obawa uduszenia. — Dać się podostatkiem olejku migdałowego, w niedostatku oliwy, oleju lnianego, lub też i mleka. — Przywołać znawcę dla wydobycia uwiecznionego ciała, lub też popchnięcia onegoż ku żołądkowi. — Bywa nadto, że nawet ciała takowe wpadają w otwór powietrzny, wtenczas towarzyszy silny kaszel a przy nim i obawa uduszenia, a jeżeli są ciekące rzeczy, iako to: wino, piwo, lub t. p. dać co prędzcy suchy chleb do przegryzienia, także parę ciepłego mleka z wodą zmięszanego wciągać, oleie w zwyz wymienione z mlekiem do połknięcia, równie i tu lekkie pomiędzy łopatki wzruszenia, iako i kichania sprawujące rzeczy użyć radzę. Na przypadek stałych rzeczy, iako to: igiel i t. p. ułożenie z dziećmi takowe uczynić należy, ażeby iak najmniej kaszlały, a dopiero im zalecane tu rzeczy dawać.

### *Oparzenia.*

Temu dość często przez swą nieostrożność dzieci same, lub też i starszych podlegają, na przypadek jednych pomiędzy inne najszybsze, gdyby dziecię wpaść miało w naczyn-

nie z wrzącą wodą, lub z piwem, co prędzcy trzeba go do głowy zakopać w ciepłym gnoiu, lub włożyć do ciepłej wody z mlekiem, a późniéj mieszać olejem lnianym lub innym smarować, lub też wodą z octem mieszaną. Lecz gdyby się przytrafiło, że została iakoby bez życia, wtenczas postąpić wypada, iak przy pozornéj śmierci, a to się już w Częstce czwartéj, Części pierwszéj, w Rozdziałku drugim mówiło, i do tegoż miejsca Czytelnika odsyłam. — Jeżeliby zaś tylko pojedyncza część ciała oparzoną została, trzeba czynić okładania z chust w wodnej wodzie maczanych, albowi też część tę pół godziny w zimnej wodzie trzymać; w lżejszych zaś oparzeniach, miejsca te smarować olejem, albo do brze umaczane chusty w wodzie i occie przykładąć. Także i bęble należy igłą otworzyć, lecz nie trzeba bynajmniej cienki skóreczki zdejmować. — W przypadku znowu sparzenia ust wydrążenia przez gorące rosoly, zupy i t. p. zaraz im dać mlekiem, lub wodą z octem często usta płókać, a za napój wodę z mlekiem, lub też octem do miłej kwaskowatości zaprawną.



*O upadnięciu Dzieciinnem.*

Zwykły także dzieci do upadnięć częstych być skłonniemi, które do chodu kunsztownie były zmuszonemi, aniżeli inne niedoznające tego musu, i owszem wzwycaiały się do chodzenia w miarę postępu sił fizycznych. — Wszelako zdarzyć się może mocne upadnięcie, przy lekkim zatym upadnięciu lub silniejszym iakiękolwiek części ciała dzieciinnego przycisku. — W takim razie dać się ranie, gdyby ta się znajdowała, dobrze wykrwić i przykładać wodę z octem, wszelako zawsze obeyrzyć wypadu czyli przytémże upadnięciu wywichnienie nie nastąpiło, a gdyby było przytoinnem, zanin się znawcę przywoła, zimną wodą z octem téj części przykładanie, i to często niedość zalecam. — Upadnięcia głowy zwłaszcza z iakięj wysokości mogą się stać bardzo niebezpiecznemi, a i w tym razie także okładania wiele razy zalecane, dziwnie służą. Wreszcie zawsze jest lepiej stróżować przy dzieciach, a gdy domowe zatrudnienia dość często nie dozwalaiają noszenia burletków, jest tylko środkiem dzielnym w celu zapobiegania nieszczęśliwym

wypadkom z téj przyczyny pochodzącym.

*O Zranieniach.*

Przez rozmaite ostre lub tępe narzędzia zwykły zranienia następować, a wazność naruszonych w ten sposób miejsce i części należy do ratunku znawcy. — Wszelako umieszczam tu środki, o których obok téj przezorności zapomnieć nie wypada — Aby ciało obce przypadkiem w ranie zostawione co prędzcy wyjąć, jeżeli rana krwi dosyć oddaie, trzeba ją załamać, i wymywszy wprzód ranę wodą z octem zmięszaną lub winem Francuzkim, czynić okładania zimnéj wody, a na samą ranę maczaną w occie lub wódce gąbkę albo skubanki przykładać, poczem ranę obwinąć. — Wszystkie maści i plastry na świeżą ranę są bardziciej szkodzące niż pomocne, ran zaś wargi ile być może do siebie zbliżyć, przez przyłożenia plastrów lipkich, przeto i przeszkodzić, aby ropienie przynajmniej nieznaczne ani długie nie następowało, wazniejsze zaś zranienia nieodbicie rady i pomocy znawcy wymagają.



*O Dzieciach, które przez przyciski  
uduszone zostały.*

Niezbywa na smutnych przypadków liczbie, że dzieci albo od swych matek, karmicielek ssąc piersi, lub przyciskiem pościeli uduszone bywają. — Rozensztein w swém dziele o chorobach dziecinnych dowodzi, że w Szwecyi rachowano rocznie 650. dzieci tym okropnym sposobem z życia pozbawionych. — W tych tu przypadkach spieszyć o radę znawcy potrzeba, gdy tym czasem takowe dzieci na powietrze wynieść z pieluszków i opaszków, i ze wszystkiej odzieży uwolnić, ciało flanelą lub kuczbaią skropioną winem dobrze lub octem obłożyć, iak tylko te ostygną, natychmiast ogrzane i umaczane w nich świeżo przykładac podług potrzeby. — Dobrze jest zatem mieć pod ręką na odmianę kilka takowych płatów. — Można też i tak zmaczaniem ciepło w winie lub occie flanelkami ciało nacierać. — Dawać enemki z oleju, oliwy, mleka i soli. — Okolice serca skrapiać zimną wodą, lekko takowe miejsca nacierać, a tymczasem robić pośpieszne do kąpieli przygotowanie, wśadziwszy dziecko, ieszcze i tu nie odstępować od

rościerania ciała, woda nie inna iak wolna.

Jeżeli szczęściem dziecę do życia powraca, trzeba je w ograną włożyć pościatkę, wlać w ustka ciepłey herbaty, ieszcze czynić tu lechtania w gardle piórkiem w oleju zmaczanem dla wzruszenia wymiotów.

*O zawczesnem lub natężonem rozw-  
ianiu się władz umysłowych.*

Uprawa władzy moralnéj rozwiania się téyże, są i być powinny zasadą odchowu dziecinnego, wszelako ten staie się narzędziem nieszczęść i fizycznych i moralnych. — Kto usiłuje przetężyć przez nie proces odradzania, iakoz są niewątpliwe przykłady, że nadwczesny rozum, uprzedzający stosunek rozwiań ciałnych, ledwie nie za chorobę uznać wypada. — Właśnie dzieci okazujące bystrość rozumu nad latą, co w podziwienie zwykło wprawiać, ale też są nędznemi stworzeniami, a czego mamy dowody na Angielskiéj i Szkrofulicznéj chorobach. — Wczesie lat dziecinnych, gdzie natura wszystkie swe natęża usiłowania do rozwiań ciałnych, gdzie drażnienie, gdzie



krwi popęd do głowy się żywić odbywa, a przez co bez żadnej kunsztownej przesady sama toż dzieło do skutku doprowadza, gdzie rozpoczyna znaczną ilość pojęć obeymować, iakoby z zawiązkowego w żywocie swęj matki życia ocuczone, wraz z przeciągiem iego takowe wzbierać się stara, zmuszając ie do nadboru owego mnięj użytecznego słów zapasu, a przez natłok ten nieraz wyobrażeń siła przyćmiewa się, że w końcu poiednać, zastosować i w zgodność użytku uporządkować takowe nie iest w stanie.

Niedziw zatym, że dość zasmucające następują wypadki, iako to: wody w mózgu, konwulsye, wielka choroba, a w końcu głupowatość, samo nawet rozrastanie się i doskonalenie ciała uszkadza się, widocznie wszystkie wydzielania, trawność do nieładu doprowadzonymi bywają, nerwy doznają niezwyyczajnej drażliwości.

W pierwszych zatym latach, czyli po peryodach rozpostrzeń zmysłowości, ma właśnie na celu natura owo dzieło pielęgnowania cialnego. — Z przedstawienia tego przekonać się możemy, że równie do chorobliwości zasad mają takowe stanowcze wpływy; dla uni-

knienia tak smutnych wypadkow, nie potrzeba przed 4. 5. rokiem życia wpręgać w Systematyczną naukowosć, ale raczej pierwęj przysposabiać do pierwotnego otaczających rzeczy poznawania, a powolnym dopiero krokiem zbliżać ich poznanie do następnych i t. d. a i przy tém nie trzeba znudzać zniesmakowywać przez godzinę trwającemi objaśnieniami. Ale tu właśnie zachodzi pytanie, iak sobie postępować wypada, wrzecie kiedy popełniono błąd, przez którego wcześnie dojrzeniu władzy umysłowej niemalą położyli zagrodę? — Tu trzeba popełniony błąd poznać, i przywolać znawcę, aby rozpoznał stan istotny zdrowia dziecinnego. — Im więcęj i wcześnięj rozum się przedstawia, im więcęj usposobień i zdolności okazuje dziecię, a to nad lata, tém mnięj, tém powoli ich zmuszać należy, chcąc ów geniusz nadal w sposobności utrzymać, gdy tym czasem natura w swém coraz wzmagającym się ciałku rozwijaniu, żadnego uszczerbku nie doznaie, przez co się też i od chorobliwych cierpień ochrania.



*O gniciu ustek dziecinnych.*

Dostrzega się nieraz, że zaledwie dzieci odbyły dokuczające im zębów wyrzynania, a już się widzieć daie, że się te chwieją, czernieją. — Dzieci w tę porę doznają bólesci, tem więcej, kiedy na zęby coś się dostaje, dalej powstają na dziąsłach wrzodeczki cuchnące, i to jest wstępem gniciu ust dziecinnych właściwych. Ta choroba daleko bywa gorszą, kiedy przytomną jest szkrofuliczna w ciele dyspozycja, a wtenczas dziąsła boląc, czerwienieją, za małym nawet dotknięciem się krew sączą. — Wpółśród stanu tego dziąseł okazuje się biała plamka z obwódką mocno czerwoną, później plamka ta utracą swą czułość, rozszerza się coraz więcej, przechodząc w gangrenę, iakoż mocne następują cuchnące śliny z ust odpływy, w końcu części poblizsze zniszczone zostają, a które koniecznie odosobnić należy, dalej cała twarz uszkodzoną zostaje, policzki i nos, słowem: jest to stan, w którym ukończenia życia dziecinnego rodzice życzyćby powinni. — W najpierwszym stopniu choroba ta nazywa się wodnym rakiem.

Dany tu opis ięć nie ma innego w leczeniu domowem zamiaru nad poznanie ięć, aby wcześnie po dostrzeżeniu nieposledniego znawcą przywołać.

*O Gangrenie Dziecinnej.*

Przy ięć tak niebezpiecznej iak szybko zabiłającej chorobie dzieci blednieją, stają się ociężałemi, smutnemi, nocy bezsenne przepędzają, wpadają w silne gorączki, febry, pragnienie znaczne, utratę apetytu, lub przy nim zostają, biegunki zaś są ięć towarzyszkami. — Dalej na którejkolwiek ciała stronie, szczególniej zaś ku twarzy, u dziewcząt zaś na częściach wstydlivych, mała biała, żółta kropka twardawa. Taż sama sinieie, czernieie, utracą wszelkie czucie, a w swém rozszerzaniu dostaje żółto-czerwonej okolo siebie obrączki. — Bez wszelkiej bólesci poblizsze ięć części naruszone i zniszczone nawet bywają, przechodzą naciąki w cuchnące rozpuszczenie, a lubo ieszcze pozostają przy rzeźwości, wnet iednak opadają z sił, i umierają. — Ta z swego opisu okropna choroba, napada dzieci pięcioletnie, osobliwie ubogiej klasy, lub i



tych, którzy w zupełny swe dzieci odchowują nieczystości, lub ich rodzice z niemi w wilgotnych mieszczą się pomieszkaniach. — Jedna tylko czystość, zdrowe pomieszkanie, urządzenie diety, choć niekosztowne i iey wybór, którym Opatrzność nasybózsze obdarzyła, są te tylko środki potężne zapobiegawcze tęg srogię choroby, która i tak nader rzadko dzieci napastuje.

### *O wyrzutowych chorobach.*

#### *Ospa Ludzka.*

Dawnych czasów Lekarze sprawiedliwie ten gatunek wyrzutów powietrzem dzieciinnem nazywali, iakoż niedawne jeszcze lata, wyiawszy nader szczęśliwe rodziców zdarzenia, którzyby strat dzieci swoich nie mieli oplakiwać, a to tém więcéy, kiedy tęg choroby sroga panowała epidemia.

Szczęśliwe odkrycie Gennera pomiędzy inne, choć w zamiarze ulagodzenia tęg choroby srogości tamę iey silną na zawsze położyło. — Nie będzie iednak od rzeczy dla upartych

kró-

krótki opis tęg choroby umieścić, aby na wszelki przypadek mieć o niej dostateczną wiadomość, a przytem i szrodk doradzić.

Ospy wyrzut dzielić się zwykł na łagodny, ziadliwy i fałszywy.

Wkrótkości poznamy takowe. — Mają swoje trzy zakresy, to iest: zakres wyrzutu, któren poprzedza przyięcie zarazy pierwiastku, drugi wyrzutu samego, trzeci podsychania, a przy nim odpadnienia skorupiek ospianych.

#### *Opis łagodny Ospy*

##### *Period pierwszy*

Dziecię staie się ociężałem niespokojnym, pokłada się częstó, z oczków płyną łzy, porywa się w śnie, dostae częstych ograszek naprzemian z febrą, gorączką głowy bólem, osobliwie iey tylney części, boleści w karku, pomiędzy łopatkami, uczucia gniecenia w okolicy żołądka, utrata appetytu, wstrętu do iadła, nudności, wymiotów, biegunek lub wstrzymania stolca, swierzbień noska, krwi z niego plynienia, kolek w bokach, niekiedy wpadaia w konwulsye. — Te wszystkie znamiona ku-

*Część II.*



dniowi bywają łagodniejsze, w godzin jednak kilka powracają daleko silniejsze, osobliwie pomiędzy inne sama febra wyrzutowa; iakoż przedstawia się ona, a przynię: gorączka, że niejedne dzieci przytem zimnieją, drugie się pocą.

Wszelako przy tych wszystkich znamionach, ieszcze się o ię wyrzucie zapewnić nie możemy; wyjąwszy przepowiedzenie, jeżeli gdzie w bliskości panuje. — *Trwa ten zakres lub period wyrzutu. dni 3, 4. a przy nim wolnieją nieco te znamiona, okazuje się wyrzut pierwszy na twarzy, szyi, pierśsiach, a potem na całym Ciałku, wnet skóra pomiędzy temiż wyrzutami nabiera czerwoności, która pośród wyrzutów podnosi się, dając się chropowato pod palcami uczuwać, tak więc rośnie 3, 4. dni, i na tém się kończy pierwszy zakres.*

*Drugi nastaje w dni 4., po pierwszym, wyrzut się coraz unosi nabiera nieiako przezroczystości, całe ciało zaczyna obrzmiewać, a przy tém towarzyszy febra, nieraz ból gardła, głos chropowaty, a starsze i płynienia ślin. Febra ta nazywa się ropiąca (febris suppuratoria) iak pierwsza (Eruptionis)*

wyrzutowa, i ten period trwa takż 3, 4 dni, a przystępnie po nim:

*Trzeci około dnia 11go, zaczyna podsycać tym samym sposobem, iakim wyrzucały, to jest na twarzy i t. d. Niekiedy ta choroba bywa łagodniejszą, a periodi ię krótsze.*

#### Opis ziadliwej Ospy.

Zaraz przy wyrzucaniu się periodu, znamiona wyżey opisane są daleko silniejsze np. niespokojności, głowy bóle, wymioty, ołępienie zmysłów, i zupełna snu utrata, lub nieustanny do snu popęd, a przytem już na dniu drugim następnie wyrzut, nawet dość często pospiesznie, miewa on różną formę, wielkość, ilość, nie unosi się iak łagodney ospy wyrzut, i owszem wkleśa się a obrzmiewania idą powoli, sam wyrzut trwa dni kilka, zlewa się, później nagle upada obrzmienie, tchnienie przystępnie krótsze, chorzy stają się niespokojniejszymi, i to jest: nienaylepszym znakiem, powstają wzruszenia stawow, pęka wyrzut, wypływa cuchnąca ciekość, febra drżąca, polykania stają się co raz trudniejsze,



później zupełnie wstrzymane bywają, maiażenia daleko mocniejsze, konwulsye, śmierć.

*Różnice ziadliwéj Ospy.*

Bywają one różniące się od siebie, iakoż są:

*Pierwsze* kryształowe, te się skupiać zwykły i zlewać, lub też urabiają znaczne pęcherze.

*Drugie* pępkowe szerokie mające końce wklęsnięte, i które codziennie więcej zapadają, nabierają koloru szaro popielatego, brunatnego, a w końcu i czarnego, i to okazuje wysoki już stopień przystępu krwi rozkładu. Hasland przyznać, że na ten gatunek ospy najwięcej dzieci potracił.

*Trzeci gatunek* czerwonych te powoli podnoszą się, i robią pęcherki krwią napełnione, nikną, i znowu się okazują, nieodmieniają się, a zgniecione wydają ciepłość czerwoną. — Wnet odpadają zostawiwszy po sobie miejsce szarawe lub czarne.

*Czwarty gatunek* — *Lupienkowatych*, te lubo się podnoszą, niemają żadney ropy, i są czyste.

*Piąty gatunek* *Brodawkowatych*, zupełnie do brodawek mają podobieństwo, od których i nazwisko otrzymały.

*Przepowiedzenia.*

Im młodsze bywają dzieci, więcej się spodziewać należy nadziei do wyzdrowienia, tylko wdale młode z powodu większej czułości i drażliwości wystawione są na niebezpieczeństwa, a gdy od nich tknięte bywają starsze, już dojrzałe w czasie swych czyśczeń lub połogu, równie są niebezpieczne.

Miękka biała skóra jest do ich wyrzutu daleko łatwiejszą niżeli twarda. Blondynki lżej przebywają niż Brunetki, daleko pomyslniej dziewczęta iak chłopcy. — W niektórych familiach zwykły złe ospy być domowemi. — Tłuste, iakoby obrzmiałe, mocne dzieci, miewają dość często złe ospy, a niżeli chude, a dzieci daleko więcej cierpią na nie w czasie wyrzynania się zębów, lub mające robaki. — Kiedy znowu ospy pojedyncze napadają, ledwie nie są powiększey części dobremi, a im rzadziej w które strony przychozą, bywają śródze, a najgorsze przeniesione do okolic, w których przedtym niebyły. — Latem bywają w czasie zwłaszcza upału ziadliwszemi.



## Przepowiedzenie w pierwszym

periodzie.

Konwulsye dość często krótko przed wyrzutem powstające, uważane za usiłowania natury do pozbycia się przyiętego zarażającego pierwiastku rzadko obawy nabawiają, wyjąwszy przypadki przy wyrzynaniu się zębów i przytomności robaków. — Ledwie nielepiej jest, kiedy później wysypują iak za prędko. — Obawa jest, kiedy wyrzut za szybko i razem następuje, tym gorzej, kiedy się do nich następujące znamiona przyłączają, iako to: mgłości, obfite poty, mniaczenia, mocne wymioty, a osobliwie częsta i obfita biegunka, głowy bóle, żywota, krzyżów, bezsenności, lub popęd do snu, a naysilniejszym jest znakiem drzenie rąk i nóg za ich dotykaniem się, krótkie tchnienie, głos chrapawaty. — Równie niedobrem jest znamieniem, kiedy owe znamiona, a nadeszysztoko silna wyrzutowa febra, po nastąpionym wyrzuceniu ustaie, równie kiedy przed dniem trzecim wyrzut się już ukończy, a są obawy pełne im krwiotoki bywają obfitsze.

## Przepowiedzenia w drugim Periodzie.

Wielkiem jest niebezpieczeństwo, kiedy wyrzut ospiany zakłęsa się, kiedy żadnego swędzenia nie czyni, a skóra wraz z krostami nie są czerwone, ale coraz blednieją, kiedy się pomiędzy niemi purpurowe lub szare plamy mieszaia, a sliny płynienie zaprędko się przedstawia, lub wstrzymane bywa, kiedy twarz zapada, kiedy wargi i powieki oprócz twarzy tęchną, a nader rzadko utrzymują się przy życiu chorzy, u których kaszel, chrapliwość, ciężkie połykanie są przytomne, kiedy dzieci młodo zwyczajnie zębami zgrzytają, kiedy ich czkawka dręczy, kiedy przed końcem życia wnet twarz opada, a chorzy utracają mowę.

## Przepowiedzenie w trzecim Periodzie.

Bywa także niedobrze, kiedy pierwéy odpadaia krosty, zanim obrzmienie ciała ustępuje, kiedy się nader częsta przyłącza biegunka połączona z mocnemi bólami, stołeczkami krwią zafarbowanemi, lub wstrzymaniem iego, mniaczenia, konwulsye napadają, kiedy chorzy rzadko i mało co uyrnuia, kiedy trudne i pracowite dostaia poły-



kanie, kiedy chrapliwość głosu, odciecie stolca mimowolne przylączają się, śmierć powiększej części około dnia 11 lub 14 od wyrzutu rachując następuje.

### *Ogólne różnice pomiędzy łagodnymi i ziadliwymi Ospami.*

#### *Łagodne.*

Łagodne, dobre ospy w swym czasie napęlniają się, a przeto są wielkie, okrągławe, zaś w środku spiczaste, są białe na czerwonym gruncie, iakoż i skóra bywa czerwona, a do tego żywą, febra zaś umiarkowana.

#### *Ziadliwe.*

Ziadliwe ospy są małe, okrągławe kończate, leżą na sobie, nie unoszą się, dostają dość głębokich dotęczyków, później czarnego punkciku, a między krostami skórę błądą, wyrzuty zaś nie mają równy formy, nawet kolor ich niezwyčajnie zielonawy, fioletowy lub czarny.

### *Outrzymowaniu ogólném przy ospach.*

Dałem już na swém miejscu poznać istotne dobro Dyetetyczne i nieograniczony jego wpływ do wszystkich chorób, pewnie i w tej nie utracą nic z swego skutkowania, a ledwiebym niezapewniał, że gdyby iey przynależne upowszechnienie do każdej klasy chorób dawniejszymi laty było wprowadzone, przynajmniej w srogości swej stałaby się daleko łagodniejszą ospa, niechayże przynajmniej ściśle iey zachowanie przy periodach tej choroby będzie na celu, a jeżeli niezupełnie tzy wasze Cne Matki otarłemi zostaną, to przynajmniej ocalenie daleko liczniejsze zroszą lice wasze strumienia łez radości. — Przystępuje do rzeczy. — Skoro poweźmie się wiadomość, że w której okolicy dzieci zarazone zaczynają na Ospę chorować, już jest czas przez dyetę ich przygotować, jeżeli ta przy odchowcie zaniedbaną była. — Nie mówię ja tu o Lekarstwie przygotowaniu, lub odmianie tróskliwego, nagłego, dotąd oswoionego życia porządku, bo takowy w tenczas więcej szkodliwy iak pożyteczny być może. — Całe zatem przygotowanie zawiera w sobie co następuje, w czasie roz-



poczętego ospy panowania rodzice swych dzieci pomnić są winni, iaki ich dotąd był stan zdrowia? czyli ich cialny odchow był na zasadach rozsądku? czyli używały świeżego powietrza? Ale niepotrzeba zwyczaju nagle odmienić, i owszem powoli jeżeli iakowe zaszyły błędy winni takowe ulepszać *np.* wealeby się nierozsądnie postąpiło, gdyby dzieci dotąd zawsze w gorącéj izbie trzymane, a dopiero w tenczas na chłodne, zimne powietrze wynosić. — Wprzypadku iednak gdyby żadnego błędu w odchowie niepopelniono, nie więc do odmiany nie pozostaje. — Wszelako następujące utrzymanie co do periodow tej choroby umieszczam.

*Zachowanie w pierwszym periodzie.*

Bardzo wiele zależy, aby złożeni ospą mogli się w obszernéj zdrowéj niewilgotnéj, od ilości ludzi wolnéj znaydować izbie, w zimie żeby nie było w niej zagorąco, latem, jeżeli okna są na południe wystawione, takowe przyćmić. Daley chorzy iak najmniej pościeli pierzowych używać mają. miasto ich sienniki z siana, materace. — Położenie dziecięcia bądź to w kolebce, lub łódeczku powinno być, aby na oczy

światło nie padało, dla uniknienia dość często nieuleczonéj ślepoty, lecz nadto też leżysko stać powinno, aby wolny zewsząd przystęp mieć mogło. — Nietrzeba zatym bez oczywistego szkody używać przykryciow gorących, lub dawać rozgrzewiający natury napoje, iako to: wina, miodu, wódki, końcem lepszego ich wyrzucenia, wprawdzie następuje takowe dość często, i tak liczne, że ich skóra zaledwie obić może, cóż potym kiedy właśnie ta ilość pomnaża w czasie podsychania niebezpieczeństwo.

Przed wyrzucenia periodem ile możności przez dzień dzieci w łózkę zostawać nie powinny, wyląwszy mocnéj febry, konwulsyow i t. p., wszelako prędzey trochę iak zwykle do łódeczek udawać się powinny. — Nadewszystko starać się świeże powietrze w izbie chorego utrzymać, niemoże być nie szkodziwszego iak zanieczyszczone i prawie zapowietrzone wilgotne powietrze, dla uniknienia czego, częste odświeżanie zalecam, wszelako z ostrożnością; aby dziecięciu ciąg iego w niczem nie szkodził, a gdzie się znayduje z ręczność mienia innego schronienia w czasie otwarcia okien, tam ospą zarażonego choć mniej wygodnie przenieść należy. —



Jeżeliby się znajdowało więcej dzieci ospą, złożonych, przecie nad dwoje znajdowaćby się w jedney izbie niepowinno. — Wiele do poprawienia powietrza pomaga, częste przez dzień podłogi octem skrapianie, równie wszystkie nieczystości cierpianemi byźdź nie mają, ludzi także w izbie ile byźdź może niepowinno znajdować się wiele. A iako jest szkodliwe gorące, nie jest też pomocném i zimne powietrze, szczególnie kiedy kataryczne cierpienia są z ospą związane, wszelako umiarkowana temperatura jest naydogodniejszą, ale i w tem mieć potrzeba wzgląd, iaki był dzieci odchów, równie i baczny byźdź wypada na pory roku, byłoby nieroztropnie wszrod mrozów dzieci wynosić, co jednak czynić wypada na wiosnę, osobliwie też w lato, aby tylko nie w godziny upału. — Bywa nadto, że w konstytucjach słabych następuje powolny wyrzut, w takim znowu razie ciepleysze trzymanie jest potrzebne, a którego unikać u silnych dobrze żywionych dzieci, równie gdzie wyrzut porządnie się odbywa.

Po zupełnie nastąpionym wyrzucie, znowu następuje wcale inne zachowanie, iako to: umiarkowane utrzymywać ciepło, a to się znacznie do ozdowie-

nia przyczynia: lecz o tem więcej przy drugim periodzie. — Zaziębienie znaczne zrzucić może nie bezpieczeństwo, może wyrzut zniknąć, lub tenże błednieć i zakłęsnąć. — Na ten znowu przypadek ciepleysze trzymanie, dłuższe w pościeli zostanie, i picie bżowych ziółek wiele pomaga.

Z opisu tego poznać możemy, iak jest rzeczą trudną, coś stanowczego oznaczyć. — Chorzy niepowinni zawieść iść, ani też przeciążać żołądków, skromnie na raz dostawać, zabronić rosółów korzennych, potraw tłustych, ciast, przy piersiach zaś dzieci żyć tylko pokarmem powinny. — W czasie pragnienia wodę z grzanką, kleie cienkie z kaszów, ięczmien z wodą gotowany za napój. — Nie są i pokarmiające wolne od dyetty, wystrzegać się także mają mięsiw, rozgrzewających napoiów, tylko przy kleiach, iarzynach, owocach pozostać, a nade wszystko wszelkich namiętności się wystrzegać. — Dla dzieci zaś od piersi odstawionych toż samo co i dla karmiących służy, ale do tego wielce pomaga dostateczne picie, nie wiele na raz, ale po trochu i często, a Rosenstein wyraźnie mówi: „albo pić do syć, albo umrzeć”, za napój słodkie



serwatki, woda z mlekiem, grzanką, malinowym sokiem, kwaśnicy, wiśniowym, ale te wszystkie napoje przy pierwszym okresie na zimno używać należy, a później zaś szkodzą.

Nie dość czystości zachowanie zalecam, jest zatem dzikim przesądem, iakoby koszulek lub inney bielizny odmieniać nie wolno, i owszem takowych odmiana orzeźwia dzieci, a ostrożność zachowaną być ma, aby pierwey ogrzać bieliznę. — Przestrzegam, aby nóg nie zaziębiać, dla uniknienia tego, lepiej jest dać w pończoszkiach dzieciom sypiać. — Na przypadek wstąpienia Ospy z drganiem stawów, potrzeba dzieci na świeże wynieść powietrze, lub otworzyć okna, stosownie do pór roku, obłożyć Ciało flanelką w ciepłym mleku znaczoną, a lepiej jeszcze służy ciepła kąpiel z połowy wody i mleka, lub też i samey wody, równie niezapominać o dawaniu Enemek, a to z młkiem, oleju albo faryny przygotować. Oczy przemywać wodą z mlekiem, i to czynić potrzeba przez cały choroby przeciąg. — A na gardła bóle starsze dzieci płókać mogą bżowym kwiatem, nieco ocu imiodu, młodszym dawać kropki kilka wina emetycznego dla zrzucania. — Przeciw znowu ciężkiemu lub

wstrzymanemu utrynki odpływowi dziełnie służą kąpiele ciepłe z wody z mlekiem, lub samey, okładania z tegoż samego lub pietruszki z mlekiem łonka i części rodnych.

### *Zachowywanie w drugim okresie.*

W okresie tym czyli ropienia, dzieci nieco ciepłej iak w pierwszym utrzymywać, wszelako nie przecieplać, inż w izbie pozostać mają, ochraniać ich od przewiewu powietrza, i zazięnia, co im może bardzo szkodzić, lecz zważając ich siłkę przytomność, dozwalając im na mały czas opuszczać łóżeczko. — Ale i tu nie można wypuszczać z pamięci czystości w Izbach powietrza, skrapiania octem winnym podłóg, inne zaś kadzidla, iako to: jałowcem zanieczyszczają powietrze, a lepiej się uczyni postawić naczynie z wodą zinną, i tę dwa razy dniem odmieniać, woda dobrze szkodliwe wyziewy zdrowiu w siebie wciąga. — Tu mieć trzeba na pamięci przecinanie krost ospianych. Nożyczki kończate najlepiej do tego służą, przez co wypływa ropa, a takową zaraz umaczaną w wodzie ciepłej gąbką splókiwać. — Zjadliwe zaś winem lub rozcieczoną z wo-



dą kamforową wódką. — Są liczne doświadczenia, że też przecinanie sprawniujące ropy zjadliwy wypływy bez nadziei chorniące na nią dzieci iedynie temu ratowaniu ocalenie życia były winne, a nawet i owe szwy przez gryzącą materiją nader małe pozostały.

Przy dobrej iednak czyli łagodnej ospie nie jest tak potrzebne przecinanie; oprócz twarzy u płci kobiecej, która dość często los swoy na iey piękności zasada, powtarzać przecinanie dwa razy dnem, to jest rano i na noc właśnie pod tę porę, kiedy ospa zwykła nabierać, ale o spłokiwaniu wodą letnią i mlekiem nie zapominać. Jeżeli, iak się dość często zdarza, że przytomnym bywa obfity sliny odpływ, dorosleyszym dzieciom dawać do płókania odwar lnianego nasienia, i kwiatu bżowego na wpół z mlekiem do płókania, młodszy zaś tego samego odwaru często parę łyżeczek od kawy w ustka wlewać, ale to chłodno ma się rozumieć, lub smarować klejem pshego nasienia, umaczawszy w nim piórko, a kiedy i nosek zatkanym bywa, umaczaną w letniej wodzie gąbką lub skabanki często pod nosa otworami trzymać, aby parę z niey wyciągały. — Na zatrzymany odpływ sliny, a ułatwie-

twienie iego, dobrze służy odwar słodu mielonego miodem osłodzonego, i do którego dolać octu winnego, aby smak słodko kwaskowy posiadał, parę tego odwaru często wciągać pzez otwarte usta należy. — Zaledwieby wierzyć można iak ten szrodek ułatwia, a nawet i przy zatrzymaniu flegmy, lecz ostrzegam, ieżeli bywa kaszel przytomnym, do tego odwaru octu brać niepotrzeba. — Bywa nadto, że osad ospiany osiada na rękach, nogach, a przez co powstają wrzody, dostrzegłszy obrzmień, na które bydz baczny potrzebą, oglądając codziennie całe Ciało, zaraz ceratą z ciężkiego płótna lub iedwabney materyi część tę obwinąć, nie można tego szrodka dosyć zachwalać, wyciąga dziwnie materiją ospy, niedopuszczając wsiąkać w Ciało, ale przytem raz lub dwa na dzień osuszać tę ceratę radzę, a dobrze także służy nowey przykładanie, gdy tymczasem odięta, otarta, oschnie i przewietrzoną zostanie.

Taż sama cerata służy przeciw odłożeniu, lecz ją wcześniej podkładać radzę. — Wreszcie dyetta wyżej wzmiankowana i tu służy, oprócz że dzieci po trochu a często wolno pić powynny:

Część II.

18



## Zachowanie przy trzecim okresie

Period ten nieraz bywa niebezpieczniejszym od poprzedniczych, osobliwie kiedy przy nich zaniedbany był starunek co do zachowania się, i ratunku wyżey umieszczonego. — Przy dobrych niezłanych Ospach samo dziecie opuszcza pościelkę, aby mogło świeżego nabrać powietrza, wszelako potrzeba iest, aby ieszcze często piło kielich, wodę czystą lub z jęczmieniem gotowaną, a wreszcie i wodę z grząką. Pozostale zaś przyschłe skorubki lub i te, z pod których ieszcze materya nie była wypuszczoną, pierwsze odwilżać ciepłym mlekiem, drugie otwierac i wypuszczać ropę, splókiwać temże.

Zatwardzenia stolca dawanem E-nemek ulatwiać, niezapominać o czystości izby, pościółki, bielizny, i około dziecięcia, a do czego kąpielki letnie, lub przynajmiej obmywanie wolną wodą całego Ciała iak najlepiej służy, i co nawet zmniejsza świerzbienia skóry, którego wtenczas zwykły dzieci doznawać, a czasem i dość przykre go. — Narzekają takż, na palenie w oczach, to znosi częste ich odmywanie ciepłą wodą z mlekiem, a lepiej szrodek od Hufelanda zalecony służy. — Wziąć

iajko twardo ugotowane, ze skorupkę oczyszczone, wyjąć z niego żółtek, w połowę iedną wycpać koperwasu białego miałko startego łyżeczkę od kawy, pokrywszy drugą, związać razem, zostawiwszy to w wilgotnym miejscu aby stopniało, poczem białko to wycisnąć.

Tą więc ciekłością rano i na noc delikatnym pędzelkiem wewnętrzne powieki brzegi smarować. Oprócz tego palenia ieszcze uważać należy, czyli się iaka na oczach nie robi krostka, plamka i t. p. tu niedość prędko znawcę powołać. — Nieraz narzekają na bóle wielkiey części Ciała, lub dale się dostrzegac ociężałość stawów, co bywa znameniem osadzoney tamże materyi ospianey, która późniey same kości psuć zwykła, iakoż miejscą te zwykły o- brzmiewać, a przy tych kiedy niekiedy i ciągnienia, część iakową okładać mlekiem, a rada znawcy i tu iest potrzebna. — Na zapobieżenie szwów, dziobów, dobrze służy do obmywania częstego odwar ryżu lub nówek ciętych, lub też następujący maści użyć, wziąć oleyku migdałowego np. łótow dwa, pół łóta olbrzołu i pare łyżeczek od kawy wołowej żółci, stopić na wolnym ogniu, dodać ziarek 15 ko-



perwasu białego na proszek startego ty-  
leż kamfory, dobrze zmięszać, i tym  
smarować, taż sama maść przyspiesza  
opad skór up twardych, a doczego słu-  
żyć także może smarowanie Oleykiem  
migdałowym. — Przestającym tę cho-  
robę niedopuszczać zaziębień, wszę-  
lako w porach dogodnych niewzbraniać  
świeżego powietrza, równie i jeszcze czas  
niemały przeznaczyć na zachowania  
dyetty, którą na początku tej materji  
podałem.

#### *Leczenie Ospy łagodney.*

To zwykło się stosować do perio-  
dów iey, a dość często nad dyettyczne  
srodki i powyższych iey zachowań le-  
karskich niepotrzebnie w całym swym  
przebiegającym. — Wszelako jeżeli iak  
się zdarza, że przy wyrzucania periodzie  
u dzieci w silki zamożnych, do tego  
należnie żywionych, mocna febra z go-  
rączką bywaią przytomnemi, do po-  
wyższych zachowań służą chłodne na-  
poie, iako to: odwar kwaśniący, jabłek,  
gruszek, wiśni suszonych, syropy ich,  
sztuczne mleka z nasion bani, ogorków  
migdałów z dodatkiem *np.* do półkwały  
nakoniec nożasaletry, przykładania Sy-  
nopizmów na pólki — W periodzie tym

ściśle zachowanie dyetty przy użyciu tych  
leków iest najlepsze, zapobiega toż sil-  
nemu Ospy, a do tego licznemu wy-  
rzutowi.

W drugim periodzie służą także  
powyższe napoie kwaśkowatey natury,  
wszelako potrzeba ie dawać nieco zwol-  
nione, iak i często po filiżance ziółek  
browych dla wzbudzenia potów, z  
którymi i pierwiastki ospy po zagranice  
Ciała ulatują, a co do trzeciego periodu  
toż samo służy, co i do drugiego.

#### *Leczenie Ospy ziadliwicy.*

Tu z opisu powyższego daie pozna-  
wać nie dobre soków zmieszania.

#### *Od pierwszego zaraz periodu.*

Wcześniej o utrzymanie siły żywo-  
tney starać się potrzeba, iakoż na ten  
zamiar dawać moczenia z kozłku korze-  
nia stosownie do wieku *np.* dwuletnim  
wziąć korzonków tych drachmów dwie,  
nalać wrzący wody łyżek od iedzenia  
4, dobrych moczyć w naczyniu pod przy-  
kryciem do ostygnięcia, przecedzić, o-  
słodzić, dolać octu winnego dobrego  
łyżek dwie, a gdzie można, wina fran-  
cuzkiego tęż ilość, i dawać po pół do



cały łyżki co półtóry do dwóch godzin; i popić wodą, do której czwartą część wina francuzkiego dodać. — Tu także służyć powyższe napoje z owoców, soków, do których zawsze octu lub wina dodawać trzeba, ale napoje te letnio dawać.

*W drugim znowu periodzie przy użyciu tychże środków pozostać.*

W trzecim a najważniejszym wzmocnić wyżej wzmiankowaną ilość kózku (*valeriana*) do pół uney, i tymże sposobem dawać, niezawadzą nawet i enemki z niego, do których także octu 4 część domieszać, pościel posypywać tartą na proszek kamforą, a nawet i ciałko rozciżonym z wodą letnią spiritusem kamforowym, często dniem dobrze zwolnionym obmywać. — Potąd tylko dać się rada, wreszcie do przyłączających się znamion, iako to: rzężenia ślegmy w piersiach, mocnego sił opadu znawa przywołać.

#### *O fałszywéy Ospy.*

Ta różni się od prawdziwéy przez swą łagodność, a szczególnież że powyżej opisanych periodów nie trzy-

ma. — Ma ona małe pęcherki wodne, na każdej krostce, piątego dnia już się skorupy zasklepiają, a 7 lub 9 cały ten choroby przebieg koniec swój odbiera, wszelako zwykł się i dalej ciągnąć, z powodu że nowe coraz wyrzuca, stoją pojedynczo.

Do klasy tej Ospy należą kończate wodne, psie owcze, i świnię. — Leczenie jest proste, podstatkiem dać pić kwaskowe napoje wyżej wspomniane, herbatę z bżowych kwiatów, i być ostrożnym, aby ich niezaziębić, chorych przy umiarkowaném cieple zachować.

Nadmieniam tu że szukano środków zmienić stan ziadliwéy Ospy, a przez co i ochronić wielką liczbę śmiertelności, sposób ten zasadzał się na szczepieniu dzieciom ospy ludzkiej, aczkolwiek i ten okazał swe dobrodzieystwo, wszelako wyrzywki śmiertelności lub kalectwa następowały.

Z opisu tak okropney Choroby poznać możemy, co szczęśliwym odkryciom w tej mierze, szczepieniu ospy ochraniającej czyli krowiey winni jesteśmy. Niechayby się tylko iéy opis z okropnemi skutkami dla historyi w pismach pozostał, z mojej strony życzyłbym być ostatnim pisarzem, iak byłem pierwszym.



w téj stolicy przed 17 laty do wprowadzenia szczepienia ospy krowiej, iakoż sposób do tego wcześni pierwszy przy obowiązkach Matek na karcie 189 umieściłem.

### § O O d r z e.

Ledwie nie każdy Człowiek ulega téj chorobie, która nawet nieprzepn-szcza i starszemu wiekowi, podług prawdziwego raz ją mieć należy, wszelako znajdują się wyjątki. — Epidemia iéy powszechnie rozpoczyna się w Styczniu, trwa do Lipca, a nader rzadko w innych roku porach.

Niekiedy panuje i razem w iedném-że miejscu z ospą lub też i czerwoni-ką (*rubeolae*) albo też i z szkarlatyną połączona tak dalece, że różność tych wyrzutów na iednémże Ciele bywają pomieszane.

Jak tylko w której okolicy rozpoczyna panować, rażone nią dziecię zaczyna doznawać następujących znamion.

### *Znamiona Odry.*

Zimna, dreszcze naprzemian z gorączką, pragnienie, wstręt do jadła, celiwości, duszenia, wymioty lub bie-

gunki, boleści żywota, do tych przedstawiają się kataryczne cierpienia, ale ją nierównie lepiej charakteryzują, iakoto: że często kicha, nieraz napastuje krwi znaczne płynienie, kaszel suchy, obrzmienia powiek, zapalenia oczów, łez płynienia. — Oczy stają się iaskrawe, swędzą i światła znosić nie mogą, z nosa płynie wodnista zrzaca ciekłość, dalej głowy ból tępy, niezwyčajna ospałość, osłabienie, ciężar wszystkich prawie stawów i kości — Pod wieczór wszystkie te znamiona pogorszaia się aż do 5go lub 4go dnia. — Niekiedy znowu obrzmiewa i czerwienie twarz, a dopiero na niéy wysypiają się krosty odrzanne, a te są małe plamki czerwone różnéj formy, są nieco do początkowego ospy wyrzutu podobnemi, nie unoszą się, szersze, czerwiesze, i takież są na żywocie i członkach. płascieysze na twarzy, a od ozoła rozszerzaia się po całej twarzy, gdzie bywają szersze, wkrótce potem spuszczaia się ku szyi, piersiom, żywotowi, członkom; a rozszerzaia się, iakby się zlewały — Cały niemal wyrzut albo odbywa się w kilku godzinach, lub w iednéj nocy — Im wyraźniejsze są plamki, im się rzadszemi przed wyrzutem okazują, osobliwie przed dniem



drugim wyrzutu, tym płascieysze, tak że od czasu do czasu równać się zwykły powyżey opisane znamiona, a przynajmniej wstrzymują się, trwając, szczególniey zaś pomiędzy niemi kaszel nieodstępnie przez cały choroby przebieg, wstrzymuje się wymiót; a obrzmienie twarzy tęchnie. —

Pomiędzy 5 a 7 dniem zaczyna wyrzut iakoby podsycać, po twarzy błędnąć, wszelako po ciele pozostają jeszcze szerokie czerwone, mocno świeżące, iakoż się dają dotykać chropowato, a giną ledwie nietymże, iak się wysypowały, porządkiem — Po łuskwieniu przedstawia się twarz i całe ciało, iakoby otrebami posypane było, a w czasie tym przylączają się obfity uryunki odpływ, poty, niekiedy i biegunki — Osmego lub dziewiątego dnia ledwie łnie cały wyrzut niknie, a przy tych i cała ukończa się choroba — Można temu wyrzutowi przypisać trzy peryody. —

*Pierwszy* to jest zarażenia, przy którym poprzednicze znamiona dni trzy trwają. —

*Drugi* wyrzutu, iakoż około trzeciego czwartego dnia — tenże następuje, stoją dni trzy do czterech — dopiero następuje.

### Trzeci odskórzenia.

Daleko liczniey choroba ta biegswoy odprawia, przy której cięższe lub lżeysze są przytomne znamiona wyżej wspomniane, a dość często i tak lekkie, że może być zkatarem porównaną. —

### Ziadliwa Odra.

Odstąpienie porządku zwyczajnego towarzyszącego wyrzutowi bywa nieraz sprawiedliwie zatrważającym, przynięy to nadzwyczajna słabość ciężkie tchnienie, zapalenie gruczołków, trzęsące trwające zimno, zawrót głowy, bezsenność, silna febra, niesokoyność znaczna, mocne głowy bóle — ból gardła, a któren, chociaż niebywa wyrzutu tego istotném iak przy szkarłatynie zjawiskiem, przecie zwykły towarzyszyć iemu albo zaraz z początku choroby, lub też i wiew biegu przylączają się — Sam wyrzut prędzey iak zwykle przystępuje pieraz iuz dnia drugiego, lub niezwyčajnie spóźniony a połączoney z silną gorączką — Tęschnoty, wstrzymania wypluciów, ciężkość piersi, ięzyk czarny, pragnienie niengaszone, klucie w bokach, a pomiędzy tym wyrzutem do tego do-



strzegac się daią inne wyrzuty, iakoto: fryzle, szkarlatyna i t. d. nadto niknie bez odskorzenia lub i po nim wszystkie znamiona się pogarszają, pomiędzy temi symptomy osobliwie sciesnienie piersi bywa przytomnem — zaczyna na nowo febra, przy niéy nieraz przystępują i biegunka, krwiste stolce, sen tęgi, mniaczenia, krwi odlatywy, wzruszenia stawów, członki zielenieją, zakończają tę scenę choroby śmierć. —

W ogólności ta ziadliwa odra nie trzyma zwykłego porządku ani peryodów — krosty się niewysypiają iak zwykle na twarzy pierwéy, tylko po łopatkach i piersiach, sam wyrzut wnet tu i owdzie zajmuje części ciała, ale przytém szczególnie uważać należy na niego, i w tenczas iest bardzo źle, kiedy bywa niebieskawy, bladawy, żółty, a tём gorzéy czarny, zbyt czerwony, lub kiedy nawet długo stoi. —

Nieraz następstwa po niéy bywają ważniejsze iak sama choroba, a szczególnie kiedy się rzuca tak subtelna materya na płuca, a przytém powszechnie przyłącza się kaszel przechodzący w spazmodyczny, lub w trawiącą albo niszczącą ciało gorączkę, niektórzy znowu umierają na krwiotoki z nosa, wodne

puchliny, albo dostają choroby oczów, nabrzmién, gruczołków — i t. p.

Odra nader łatwo niknie od nie znacznego zaziębnienia, przewiewu powietrza, a poczém przystępować zwykły symptomy niedobre, nieraz przytrafia się, że ginie o iedną noc całą skóry czerwoność, tak dalece, że żadnego po niéy śladu dostrzedz nie można, w tenczas przystępują po niéy krótkie tchnienia ledwie nie duszące, ciężkość piersi, kaszel spazmodyczny, silny, suchy, ziąb członków, omglenia, zawroty, nieraz i śmierć. —

W tym przypadku spiesznego potrzeba ratunku, i za ledwie wierzychy można, iak dzieci pilnować należy, iak przeciągu powietrza wzbraniać — Ma nadto i to szczególnego ten wyrzut, że nader łatwo ginie, i takóž powraca, a to nawet częstkowo, im która część ciała ciepléy utrzymywaną zostaje; iakoż nikną za wyjęciem ręki z pod przykrycia, a pod niém znowu powraca, lecz to wcale rozróżnić wypada od wstąpienia ich, a przytém zwykły powyżéy nadmienione symptomy przystępować. —



## Dostrzeżenia i Przecznaczenia.

U dzieci przed drugim lub trzecim rokiem bywa niebezpieczną, a starsi więcej daleko cierpią — zboczenia od zwykłego biegu, co do wybuchu choroby, czasu wyrzutu, jego niknięcia, zawsze są niedobre, a bywają najszybciej przy poprzedzających piersi słabości, na które dzielać zwłoka subtelna tego wyrzutu materya — Równie są niebezpieczeństwem zagrażające, biegunki, małaczenia, ziąb członków np. rąk, nóg, kolan lub natężony kaszel, krwiotoki, a to; że przez nie łatwo wyrzutów wstąpienie następuje. —

Wstęp do trzeciego peryodu, to jest odskórzenia albo dzień, siódmy bywa dość często stanowczym — Śmierć zaś u dzieci następuje niekiedy dnia 9go i to nagle przy zaduszeniu — Nader jest wielkie niebezpieczeństwo kiedy się pomiędzy odrzaniem krostami plamy sine jakoby szkorbutyczne lub petocie okazują. —

## Outrzymaniu Chorego i przestrógach potrzebnych.

Złożeni tą chorobą dostawać powinni na posiłek ciekące tylko pokarmy, iakto kleie z kaszów, a za napój ięczmię w wodzie gotowany, lub wodę z mlekiem, jeżeli znoszą dzieci bez torosów, i biegunek, wodę osłodzoną cukrem do kwaskowatości miłej octu dolaniami zaprawną, wodę, z sokiem malinowym, wiśniowym, lub i serwatke, jeżeli tak iak mleko nierobi przykrości, za pokarm ryż, perłowa kasza, owsianka, ięczmienna, owoce, wszystkie zatem rosóły i mięsne potrawy usunięte być powinny, powszechnie chorzy więcej pić iak ieść powinni. —

Nadewszystko pilnować, ażeby się nie zaziębiały, ani doznawali chorzy przemian szybkich powietrza, iakoto po ciepło zimna, dla tego dać się ta ważna przestroga, aby się nikt z zimna do chorego nie zbliżał — Wyrzut ten można ułatwić przez częste picie bzuwego kwiatu; kąpiele ciepłe, nog moczenia, ale i tu przestrzegam; aby po nich unikać szkodliwego nadcr zaziębiania, iakoz po kąpielach, nóg moczeniu, osuszywszy dzieci, zaraz włożyć do pościeli — Unikać użytku leków roz-



grzewających, drażniących takowey żę natury napoiów, iako to wódki, wina, miodu, korzennych przypraw, a ktorých użytek stać się może nader szkodliwym.

Do tego w peryodzie wyrzutu trzymać wypada chorych w pościeli, przecie się ma rozumieć, aby ta nieogrzewała dzieci zbyt, iakoż niemoże być ni szkodliwszego iak nadpotrzebne posciła otulenie, użycie rozgrzewających przykryciow, iakoto: pierzy, futer, gorących pomieszków, bliskie pieca chorego trzymanie, ponieważ z tych przyczyn może bardzo łatwo nayniebezpieczniejsza zgnęła febra przymieścić się — Oczy przy tę chorobie zwykły bywać na wszelkie światło bardzo czuły, od czego ochronić potrzeba, przez przestawienie łódeczka, kolebki od światła, a w czasie wieczornym światło świecy osłonić, iakoż nawet izba nie ma być iasna, i gdy jest, okna należy zasłonić, oczy zaś same przemywać ciepłym mlekiem i wodą, poczem zaraz osuszyć te miejsca — Przy zatrzymaniu stołeczka iego uwolnienie za pomocą enemków ułatwić stosownie do potrzeby, ale i w tęp dać nie małej uwagi przestroę aby nie w czas, kiedy się dzieci pocę, Chorzy z wychodzeniem na powietrze

wietrze uważać powinni na pory roku i to nieprędzē, aż po zupełnym odry zniknięciu w tygodni dwa lub trzy. —

W przypadku nagłego wstąpienia odry, zaraz czynić okładania ciepłe z wody, z wina na żywot, a mianowicie na piersi, co często czynić wypada, aby chusty lub flanelle zupełnie na swych położone miejscach nie zastęgały, dzieciom nawet dawać po łyżce od kawy wina naprzemian z okładaniami, i całe ciało nacierać chustami takż wolnym winem, octem dobrze nakropionemi. — Można takż z wielkim skutkiem robić i kąpiele ciepłe, a nawet i ciepłsze, bżowy kwiat iak herbatę, a do tego przykładać synopizma na łytkach a nawet i na piersiach — Można też na kąpiele użyć odwaru z gorczycą, do którego dodawać trochę soli kuchenney — kąpielki, nacierania, okładania bez z mordowania naprzemian czynić, pokąd wyrzut nie powróci — Wreszcie mogę śmiało radzić, aby dać podług wieku proszku z Jpekakuanu 3 do 4 ziarek na raz, lekkie krztuszenie lub i następięne wymioty zwykły silnie powrotowi odry dopomagać. —

Te są szrodki, które za nayskuteczniejsze bez wszelkiey obawy umieścić, tych się trzymać dotąd, ażby po-



trzeba wymagała powołać znawcę. —

Pozostałe jeszcze udzielić radę na bóle gardła, kaszle, a które, iak się wyżej nadmienilo towarzyszą, iako znamiona wyrzutów odry — na te służą pary zlnianego nasienia, zwodą i mlekiem gotowanem, co często powtarzać należy, dalej okładania około szyi czynić z bułki białego chleba, w niedostatku iey przetłuczonego lnianego nasienia mlika, do czego dodać można nieco gorczycy tłuczonéy, i takowem okładania takóž często powtarzać.

A że odra ziadliwa dość często panuje, niebędzie od rzeczy położyć sposób do zdziałania iey daleko łagodniejszy — wynalazek ten zawiera w sobie. —

### *Szczepienie Odry.*

Nie zważając na te wszystkie wypadki, iakie wypływają z panowania odry, mianowicie ziadliwéy, szczepienie iey w równiby utrzymywać wypadło, iak szczepienie ospy ochraniającéy. —

Jak tylko powźmie się wiadomość, że zaczyna panować ziadliwa odra, natychmiast wziąć się do szczepienia, ile że jest zbyt proste — Rozdrasnąć skórę pomiędzy krostami odrzanemi,

gdzie ich jest najwięcéy, aby się troche krwi łączyło, w téy krwi nieco bawełny umaczać, aby dobrze nasiąkła, tę na obu rączkach dziecięcia przyłożyć, obwiązawszy. — niektórzy zwykli mięśca małe takóž urąk bawełne w krwi materyą odrzaną mającéy, nacierać, a potym przyłożywszy, tę samą bawełnę obwiązać, co takżé równie zwykło zarażać. — W obu tych sposobach bawełna leżeć powinna na tych miejscach przez 3 dni.

Dnia szóstego po zarażeniu przystępuje po przyjęciu pierwiastku odrzanego febra, a na dniu dziewiątym i sam wyrzut porządkiem wyżej opisanym — iakož przedstawiają się i wszystkie znamiona przy iey oprócz kaszlu, któren się nie zwykł przyłączać, a co już w tym nieposlednie dla siebie zaszczepionny odbiera dobrodzieystwo. Tak udzielona zaraza ochrania system płuc od tych cierpień, które przy odrze nieszczepionéy zwykły chorým dokuczać, i dość często na niebezpieczeństwo ciągłéy choroby odrzanéy, na końcu i śmierć wystawiać.

W téy szczególnej odrze wszystko zachować potrzeba iak najściśléy, co się tylko podało przy odrze napastnéy. —



Czytelniku! w roku 1801 w pismach publicznych zachęcałem rodziców do szczepienia ospy krowiej — krok ten aczkolwiek śmiały przypłaciłem przesładowaniem, uwienczenie wynalazku, ocalenie przez niego króciowych strat, było i jest dotąd największą przyjemnością, gdybym mógł podobnież i w tém szczepieniu przyczynić się do zbawienego wynalazku, i użytkowania z niego którego celem do wiadomości w moim poradniku umieszczam, byłoby szczupłą przysługą dla Rodaków, którą zawsze tchnąłem, a przy niemy żyć nawet przestanę.

#### *O Puchlinie, następstwy po Odrze.*

Po między innemi następstwy ostry jest opuchlina, i tę jako osobną chorobę uważać należy — dość często przystępuje po niemy w niedziel dwie lub trzy, i właśnie wtenczas, kiedy się chory zdrowym być czuje — Jest ona wypadkiem zaziębnienia, a tém więcéj spodziewać się iey można, kiedy odskurzenie skóry zamocne bywa, ponieważ w tenczas z wyrzutu obnażona skóra parując łatwo uszkodzoną być może, przez

wstrzymanie skórno przeziwu — Przepowiadać zwykły tę opuchlinę słabości, ociężałości, bezcenności, utrata appetytu, pragnienie, suchość skóry, ciężar na piersiach, dreszcze częste, lub kiedy wczasie samey choroby odrzannéy uryunki odpływ trudnym bywa, lub w małej ilości, okazywać się wprzód zwykła na twarzy, niekiedy na nóżkach, poczem dość szypko całe ciało zajmuje, ledwie nie zawsze przy niemy przytomnemi są krótkie tchnienie, kaszel, ospałość i t. p. a śmierć nagle napada. Jakoz dzieci w tym stanie choroby jak świece gasną — Jeszcze i przytem uważać należy, czyli się taż opuchlina daie uczuwać pod ręką ciepło, czyli i iaka jest przytém słabość, febra, czyli po małym palca przycisku opuchlina zostawia dolek, czyli krótkie tchnienie, język suchy, wilgotny, biały, pragnienie, ciężkie uryunki odeycie — Te okolicznosci nie trzeba spuszczać z baczności, i należy im wczesniéj zapobiec. —

#### *Przeestrogi.*

Może w prawdzie nieraz febra odrzana łagodną być chorobą, tak że za-



dnego nie potrzebuie zaradzenia, wszelako powyższe ostrożności przy niéy zachować wypada, a mianowicie: zaziębnienia, ile tylko być może, niedopuszczać — Rzadko która z chorób nad odrę może być zdradliwą, nieraz wiedzonym domu choruią na różny iéy stopień, nieraz znowu przy pozornych okolicznościach zaledwie co znaczyć mogących niespodzianie symptony złe a czasem i najgorsze przystępują — Z tego, co się o febrze położyło, wypada iéy łagodności nie dowierzać, a z bacności złożonych nią niespuszczając, i to zachować do dwóch, trzech niedziel po iéy zupełnem ukonczeniu.—

#### *Przepowiadania.*

Im prędzéy iak zwykle wysypka, odrzana następuje, tém niebezpieczniejszą iest dla chorych — Bardziéy bywa niebezpieczną, kiedy się do niéy petocie, fryzle przyłączaia, lub mocne gardła zapalenia, albo kiedy się wnet wysypka okazuje, i wnet ginie, kiedy towarzyzy u dzieci małych przy zębów wyrzynaniu, oraz majaczenia, drgania, stawów wzdrygania.

#### *O utrzymaniu Chorych w czasie iéy Febrzy.*

Niepotrzeba chorych za ciepło lecz umiarkowanie utrzymywać, iakoż za gotując izby, napoiów rozgrzewających użycie, dla szkodliwego nader zwyczaju, aby lepiéy wysypki występowały, są przecie przygotowawczemi do śmierci przyczynami — wszelako i zaziębnienia, o których ostrożności wyżej się mówiło, również nader szkodliwemi stać się mogą przez łatwe wysypki wstąpienie, iakoż to zwykło następować za obwiewem, a tém bardziéy przeciągiem chociaż nieco chłodnego powietrza — Dla tego daie następującą Przestrogę, aby w czasie dni zimnych z powietrza nie dozwalać przystępu do chorego odwiedzającym, a świeże w porach zdrowych wpuszczać powietrze, z tą wszakże ostrożnością, aby przeciągu żadnego nie doznawały skutkow — takóż pilnować, aby się z przykryciów nie odsłaniały, mając się być za ciepło okrytemi — Małe znowu dzieci niemają być nawet w pościolkach noszonemi, ani ich też nie chustać wcale, co nawet w kolebkach wystrzegać się należy, aby uniknąć powietrza przeciągu. —



A co się dotycze opuchliny, która iak się namieniło, przystępuie w następstwie téy choroby, iest raczéy skutkiem nieostrożnego zaziębnienia, lub w tenczas kiedy chorzy zaprędko wychodzą, dla tego ieszcze raz powtarzam że się niepowinni wystawiać na powietrze, aż dopiero po dwóch lub trzech tygodniach, iakoż uczą liczne doswiadczenia panowań epidemicznych, że naysilniejsza ilość dzieci po wsiach z téy tylko przyczyny umiera — Niepotrzeba więc uznawać chorego za zdrowego, niedostrzegłszy żadnych wyrzutów po ciele, równie ieszcze powtarzam, że zostaią w obawie dzieci wpadania w opuchlinę w czasie odstawiania łupinków odrzanych — Niekiedy z nowu powstanie opuchlina bez dostrzedz się mogącéy przyczyny, ta bywa daleko łatwieyszą do ustąpienia iak trudniejszą po zaziębieniu. —

W peryodzie zatętu odskorupiania, nóg moczenia i całego ciała, kąpiółki nader są pomocne, a nawet i nieodbitcie potrzebne, a co większa można ich przy opuchlinach używać, lecz po nich zaraz należy w posciel ogrzaną włożyć, a całe ciało, lub przynajmniej część iego flanelką lub chustami nacierać, wszelako i przytem zaziębnienia unikać. —

Bardzo wiele baczny być potrzeba na cierpienia gardła, które lubo nie iest konieczném zjawiskiem, ztém wszystkim nie raz z początku lub też i w biegu téy choroby przyłączać się może, a zatym rzęczęsto czynić płókania bżowym kwiatem z wodą napół z mlekiem mieszanym, na mieysce kwiatu bżowego użyć można równie skutecznie szalwii, lub miasto naleka niewiele dodać octu do miłey tylko kwaskowatości, i miodem osłodzić, około szyi okładania z kaszy jęczmienney, owsianéy, lnianego nasienia przetłuczonego, bulki, białego chleba, co się z tych rzeczy w domu pod ręką zayduie z mlekiem lub wodą na papkę rozgotować, i często tém szyię okładać. — Takóż służą pary z bżowych kwiatów alboliteż samo do gardła użyć się miane płókanie, pary z nich często otworzywszy usta przez dzień polykać.

Co się tu mówiło o okładaniach, płókaniach zaraz z początku narzekań, bólów gardła, czynić należy. — Starszym znowu można kazać czynić w gardło szprycowania, z tego, co się do płókania podał.

Te są rady, które w domowém leczeniu dzielnie skutkuia, nieradzę spu-



szczać z pamięci tych, które tu umieściłem, przestróg, lepiej onych dopełnić, niżeli na wątpliwy ratunek chociaż biegłego w sztuce, dzieci swe oddawać.

### O Czerwonce (*Rubeolae*)

Nie raz się zdarza, że ten gatunek wyrzutu bywa mylnie za odrę uznawanym. — Dla poznania zachodzący różnicy, zaraz po odrze opisać ją przedsięwzięłem. — Są to małe plameczki różney wielkości i kształtu, a te są niby pęchereczkami okryte, w których cieknąć do ropy podobna się znajduje.

Zwykła iey równie febra towarzyszyć, lecz przy niej niema łzow płynienia, ale za to dość znaczne gardła bolenie. — Już dnia jednego podsycają i odzieniają się od skóry w większych kawałkach, niż zwykła od Ciała odskorupiać się odra; iakoż niedostrzega się widzieć owych łuskwinek iak przy odrze, tylko skóreczkę obrażoną. — Nie raz się zdarza, że po niej obrzmiewania przystępują, iak przy szkarlatynie. — Opis ten daie poznać, że jest wcale odmienną od odry chorobą, wszelako wszelkie z nią obeyscie się co do dyetty utrzymywania, ostrożność tak zachować należy,

iak przy odrze, i toż samo ma się rozumieć o wyrzutach skórnych np. ospach fałszywych, pokrzywianey febrze, ponieważ przy nich mnieysze lub znaczniejszy stanu zdrowia zboczenie musi być przytomnem, w którym natura działać zwykła podług swych prawideł, a te niczém uszkodzonemi być niepowinny.

### O Szkarlatynie.

Wyrzut ten bywa produktem swego zarażającego pierwiastku, iak i inne tego gatunku wyrzuty, na których z ciała pozbycia przedstawiają się usiłowania natury febrą zwane, z tąd też i febra ta szkarlatynową jest nazwana.

Napastnie powszechnie dzieci, nieraz i starszych od mienia iey nieuwalnia. — Ma szkarlatynowy wyrzut zbyt ulotny zarażający pierwiastek, iego przenikłość wpaia się w suknie, bieleżnę, pościel, a nawet i za dotykiem chorego, przez co może łatwo rozszerzyć się z raza. — Zwykły tego wyrzutu przebieg jest następujący. —

Zaczynają narzekać na osłabienia, ociążałości, zimna, dreszcze, gorączki, głowy bóle, wstręt do jadła, a nieraz i krwi znosa płynienia przystępują,



oczy bywają smutne, doznają kaszlów, zatkań w noskach, i ledwie nie zawsze cierpienia gardła, gdy to może być lżejsze, mocniejsze uszkodzenie w połknięciu, stężalności karku. Po dwóch dniach wszystkie te znamiona osobliwie pod noc zwykły się powiększać: a przy nich i febra, skóra bywa suchą, gorącą za dotknięciem się ięć, chorzy nie mogą spać, albowież i snu pozbawieni. gruczolki szyi nabiegają, a nieraz na nich iako i podniebieniu dają się widzieć białe krosteczki, które w ropiace przechodzą zbyt małe wrzodeczki, usta są pełne śliny, a dzieci wyrzucają dość flegmy. — Te posytki są oznakami febry a tem więcéy wyrzut ten zapewniać zwykły, kiedy w bliskości rozpoczyna panować szkarlatyna.

Przy takowych tu znamionach około dnia 3. 4. występuje wyrzut powszechniey w nocy, a tem mniej lub więcéy po nad skórę nie unosząc się, stanowi ciemne czerwone punkciki, które się co raz zgromadzają, w końcu całą skórę pokrywają, że ta wydaie się do koloru sukna szkarłatowego podobną. — Powszechnie wyrzuca najprzód po twarzy przy obrzmieniu teyże, pó-

żniej na szyi, palcach, rękę, a dopiero, i po całym Ciele. — Nie zawsze jednak to rozszerzenie się znajduje miejsce, może ten wyrzut i pojedyncze tylko części zajmować, niekiedy na piersiach i żywocie, bywa nadto z znacznym skóry świerzbieniem połączony, iakoteż i palce zwykły obrzmiewać, że są mniej zdolnymi do poruszenia. — Daleko częściej zwykła febra i powyższe z nią znamiona po wyrzucie opuszczają, a przez zaziębienie zbyt szybko ginie, w tenczas dolegliwość gardła powiększać się zwykły, sam zaś wyrzut trwa dui 2, 3, a w nader rzadkich zdarzeniach do dwóch niedziel niezmieniając bynajmniej swej postaci, potym dopiero czasie błedniecie i powoli niknie, przytym twarz tęchnie, skóra chrapowata przy dojrzeniu znacznie w łuskwinkach odstaje, niekiedy dają się znaczne kawałki z rąk, nóżek obrywać, około 6go lub 8go dnia już się zwykła choroba ukończyć. — Niekiedy w czasie odłuskania powstają małe pęcherki po ciele, niekiedy znowu też plamki powracają, swędzą i znowu nikną.

Nie zawsze jednak ta febra biegnie ten łagodny utrzymuje, a w tenczas znaki się okazują nienaypomyślniejsze, iako-



ko to: ból gardła daleko mocniejszy, żywota boleści, biegunki, chrapliwość głosu, oczy pełne łzow, ich zapalenie, tchnienie dychawiczne, a przy bytności robaków dostają dzieci i konwulsyów, połykanie stałe się prawie niepodobnem; wyrzut febrny z krwią pomieszany, język grzybkami osadzony, a chorzy albo miewają mocny do snu popęd; lub mającą. — Febra już przy wyrzucie bywa dość silna, przy której silna gorączka, a sam wyrzut zbyt czerwony, cała zaś skóra wygląda jak skorupa gotowanego raka.

Przytem zasługują na uwagę następujące okoliczności:

- a) Miejscowy trwały ból w którejkolwiek części ciała; a któryś dość często bez dostrzeżonej przyczyny wnet tu, wnet owdzie zwykł się przenosić.
- b) Kiedy febra po zupełnym wyrzucie nie wolnieje, lecz owszem się wzmacnia, osobliwie ku nocy.
- c) Kiedy przy odłupieniu skóry bóle w gardle na nowo powracają.
- d) Lub kiedy po odłupieniu utwarzają się wrzodki na szyi, za uszami, lub biegunki i krwi płucia przystępują.

Leczenie tej febry zgadza się z odry wyrzutem, i to się ma rozumieć o napoiach i pokarmach, wszelako kiedy są przytomnymi mocne majączenia, twarz czerwona, bezsenność lub i sen mocny, kiedy połykanie bywa trudniejsze, nie zapomnieć o przykładaniu Synopizmow na przemian po rękach nóżkach, karku, iak na usmierzenie dręczącego nieraz kaszlu, używać klejów z kaszow tenże posiadających, te ciepłe pić, wreszcie więcej, mającą, na głowy bóle narzekając, oczów zapalenie mocne iest przytomne, nawet po parę pliiawek za uszami postawić. Przeciwnie znowo postąpić wypada na przypadek gdyby się powoli miała wyrzucać a dzieci lub też i dorosłeysze miały być z natury słabowitemi, tam użyć można kwiatu bzowego za nappóy do którego nawet część 3 lub 4. do iedney ich filiżanki dodać można podług możności wina słodkawey natury, iako to: węgierskiego, miodu pitego, już tak ani pomyśleć nie można opiawek przystawianiu, iak dla wzniecania nerwów skornych, dzielnie służą przykładania Synopizmow na częściach wyżej nadmienionych, z niemającym takż skutkiem w tym tu przypadku służyużycie lekkiego nałania kozłku np. na parę



filiżanek wrzącej wody wziąć korzonków tych pół łota, moczyć do ostygnięcia zupełnego, przecedzić, osłodzić i dawać co półtorej i dwie godziny naraz po łyżce iedney, popić bżowym kwiatem, można nawet z dobrym skutkiem na posilek przeznaczyć rosół, aby tylko nie tłusty słony, a do tego nie korzenny, okrycia nawet mają być cieplejsze niż przy powiększonym wyrzucie.

Umieszczam tu nie małego użytku następujące postępowanie iż za okazaniem się w którejkolwiek okolicy szkarlatyny, miarkując lub się też i przekonując dostatecznie, że kto jeszcze tego wyrzutu nie odbył, stosownie do lat dać nieczekaiać proszek z Ipekakuany, iakoż za ledwieby wierzyć można nie doświadczaiać ile ten środek bywa po mocnym do uprzątnienia zanieczyszczeń żółciowych, flegmistycznych z żołądka, a nawet i z kiszek stolców, co czyniać silnie zapobiega wzmagananiu się febrzy przy wyrzucie towarzyszącej, wielce się nawet przykładają do zmniejszeń tylu przypadłości wyżey nadmienionych. Niezawadzi nawet i w samym biegu febrzy wyrzutu tego ponowić tenże proszek iakoż wzruszenia naczyń skórných i innych dróg wyprowadzających dzielnie się do uwolnienia rażącego pier-

wiaistku po zagrzaniu ciała przykładają. Do tych środków dodaiać. — Twarz, ręce często dniem zwolnioną wodą z dodatkiem trzeciej części octu winnego po razy 2, 3, dniem obmywać, i zaraz ogrzając chustą osuszać, usta tą mieszaniną często płókać.

### *O Wyrzucie pęcherkowym.*

Wyrzut ten dochodzi od wielkości laskowego orzecha do kurzego jaja, zrządzać zwykły mocne palenie i świędzenie, napełnionym bywa żółtawą ciekłością, nieraz na pojedynczą ciąża części osiada a nieraz i całe ciało zajmują — niekiedy tym wyrzutem tak bywa pokryte, iak zwykle pęcherze po przyłożonych plasterkach z much hiszpańskich, trwają dni kilka, pękają, zostawiając sobie czarniawo czerwone plamki, a nader rzadko, blizny — najczęściej bywają zjadliwej natury, połączone zogniafebrą, i innemi febrami niebezpiecznemi, a onich równie iak i o peteciach oddzielnie przy opisie tych, z którymi bywać zwykły febrami, mówić będziemy. —

*Część II.*

20



## O Fryzlach.

Poznaie się, że wyrzut ten utwara bardzo małe chrapowate guziczki, lub pęcherki, mające do prosa podobieństwo, nieraz on bywa i większy, a nieraz tak mały, że go ledwie za pomocą szkieł powiększających dostrzedz można. — Niekiedy tenże wyrzut robi gdzie niegdzie po ciele-skórkę chrapowatą, tak zwaną gęsią, czerwono wyglądającą. — Niekiedy znowu iak pęcherze po przyłożonych wezykatoryach, i w ten czas nazywać się zwykł pęcherkowym fryzlem, czyli pęcherkową prosówką. — Kolor tego wyrzutu, od którego też i swe nazwisko otrzymuje, bywa wnet czerwony (*purpura rubra*), wnet biały, *alba* niekiedy znowu unosi się w górę z czerwonego dna iako mały pęcherzyk, lipką napelniony ciekością, lub też iedne w drugie przechodzą. — Naypowszechniey stoi ten wyrzut poiedynczo, a po 3 lub 4 dniach podsycha lub pękają pęcherki sącząc wodę gryzącą, poczem następuje odskórzenie, czyli skóry w małych łuskwinkach odeyscie. — Nieraz znowu ten wyrzut trwa przez tygodnie, i nowy następuje, słowem cały iego przebieg niemożbydź oznaczonym. — Zwykł się wy sy

pywać po szyi, rękach, nogach, dopiero na palcach a później i po całym ciele. — Poprzedzają tenże wyrzut znaczne nudności, tęskności, ciężar na piersiach, niekiedy konwulsye, uczucia kłociów w skórze, reumatyczne po kościach bóle, wszelka do potów skłonność, a nawet i kwaśno cuchnące poty, drażliwy wzrok, kłócia w bokach, w żywocie, skłonności do omyleń, ciężkie połykania, palenia w gardle, płynienia łez, ciężkie mowienie, uszkodzony odpływ uryny, obrzmienia twarzy, drzenia stawów, małaczenia, otrętwienia palcy u rąk, nóg.

Tych tu wymienionych posyłkowych znaków wyrzut ten przepowiadających dość często nie bywa, a przynajmniej niektóre z nich poprzedzają tenże wyrzut, iakoż przy tych lub owych znaków przytomności następuje i wysypka sama przy febrycznych dreszczach, których napady nietrzymają się porządku, wnet ten wyrzut za pierwszym napastowaniem, wnet po kilka się okazuje. — Po nastąpionym wyrzucie nie zawsze ustają nadmienione powyżey przypadłości, i owszem dość często następuje ich pogorszenie. — Sam zaś wyrzut iest zbyt łutnym, i nieraz chowając się napastnie ważne



organa, iako to: płuca, mózg, gardło; żywot, iest on nawet położnicom właściwy, iak nieprzepuszcza żadnemu wiekowi, przylączać się zwykł prawie do wszystkich febry gatunków, nadewszystko do katarycznych, nerwowych. — Bydź może Epidemicznym, Endemicznym, to iest w pewnym obrębie, iak Symptomatycznym, a nieraz i wyprowadzony przez zacieple utzymanie się w czasie febry żołądkowej, Nieraz przylączają się do róży, szkarlatyny, ospy, odry, wnet bywa z gorączką, wnet chroniczny, to iest długo — trwały, i może po razy kilka iednego napastować. — Po odskórzeniu pozostaje skłonność do obrzmień ciała.

Trudno iest wysledzić naybliższą do niego przyczynę, i która nie zdaje się bydź gatunkową (*specificą*) lecz z biegu choroby, bydź musi zbyt przenikła, ulotua, ostra. — Do oddalonych zaś przyczyn należą zbyt drażliwe, czułe, delikatne, naywięcéy niezdrowych pokarmów używające osoby, dodać do nich należy osłabiające wpływy, iako to: smutki, troski, żale, nędza, ubóstwo, wypróżnienia wszystkie słabiące siły, iako to: krwi choyne upnszczenia, laxowania, zepsute powietrze, i niewiadoma powietrza własność, przy-

czyny nadmienione ten wyrzut upowszechniać zwykły. — Nieraz mogą i następujące za oddaleńsze przyczyny wyprowadzić fryzle, iako to: zacieple utrzymywanie się, zbyt rozgrzewające leki poty sprawujące, tudzież wstrzymane naturalne odbyty, nadewszystko kataryczne odpływy.

Nieraz tenże wyrzut bywa przytomnym przy febrze zapalney z powiększoną siłą żywotną.

Ważną iest uwaga następująca, że przy tych pomieszaniach chorobliwych nie daie się ię wychód zapewnić, wnet zdaie się bydź łagodnym ten wyrzut, nagle wyprowadza nader smutne odmiany, i tak nawzajem się przytrafia, szczególniey zaś długo — trwały tego wyrzutu gatunek bywa od niebezpieczeństwa wolnym, aby tylko na wewnątrz nie wystąpił.

Zanim się sposoby leczenia niżej podadzą, poprzedzę podaniem nader potrzebnego w tey chorobie utrzymywania się, a nawet i co do dyetty, bez tych bowiem wiadomości nader wątpliwém bywa i szrodków doradczych użycie.

Utrzymywać się więc potrzeba względem ciepła tak umiarkowanie, żeby przez cały tey choroby przebieg, a na-



wet i parę tygodni po odbytych, ciała ani za zbyt mocno otulone przez pościel, suknie, i ciepło, izby w pory przyzwoite niebyły za ogrzewane, ani też za chłodne. — Po przestalej chorobie pozostaie chorobliwa ciała czułość, przez co wpływy te co do chłodu, zimna, gorąca mogą być nader szkodliwemi.

Przestrogi te mieć radzę na mocney pamięci, do tego dawać potrzeba chorym za napój, i to często, kleje z kaszów, jęczmienney, owsianney, odwar ze słazu korzenia.

Napój te zaprawiwszy kwasami octu piwnego dobrego, miodowego, winnego, lub sokiem kwaśnicy, do miłej kwaskowatości zaprawne, niepowinny być przecie zimne, lecz zawsze wolne, wystrzegać się takż gniewu, złości, i wszelkich namiętności.

Do używania pokarmów służą rosoły, aby te niebyły korzenne i tłuste, najlepiej służą krupniczki, ryż, jaia miękko gotowane, kaszy, mięsów żadnych, i tych się wystrzegać, kiedy temu wyrzutowi towarzyszy mocna gorączka,

### Leczenie.

Wspiera się w zaradzeniu domowém na następujących uwagach, z których jest:

*Pierwsza* Uważać na stan febryczny, który temu wyrzutowi zwykły towarzyszyć, tak jeżeli bywa z silną gorączką, maśczeniami, snami niespoy-nemi, miernie chłodzące leki wewnątrz dawać, iako to: zrobić moczenie z Melissy, którego mieć półkwarty, lub też i całą, bierze się na ten zamiar dobrą garść Melissy, lub kwiatu bżowego, do tej ilości wody wrzącej, w naczyniu przykrytém moczyć do ostygnięcia, przecedziwszy dobrze ośłodzić, a z nasion bani i ogórków łyżek dwie lub trzy w donicy utrzyć, z témże moczeniem przecedzić, i ośłodziwszy dawać często po troszku pić.

Dla mniejszego zachodu można, zrobiwszy takowe nalańia, dodać do nich miodu octowego do upodobania, i tymże sposobem używać.

*Druga* Jeżeli zaś febryczny stan bywa przy osłabieniu sił, używać wypadu mixtury N° 9°.

*Trzecia* Co do samego wyrzutu nie ma co do czynienia iak uprzątnąć zawady wstrzymujące tenże, nadto mieć



baczność, żeby na wewnątrz niewstąpił, ale w tym względzie nieprzepominać o tych stanach febrycznych, i przestrodach, które się przy utrzymywaniu chorego wyżej podały, niemniej wystrzegać się krwi upuszczeń, iako i leków laxujących, a to dla uniknienia nieomylnie po nich nader łatwo przystępujących mocnych osłabień, ponieważ ostrość wyprowadzająca tenże wyrzut ma szczególny przymiót przysposabiania do zgniłości, dla tej to zachować ostrożność potrzeba w przykładaniu nawet plastru z much hiszpańskich w czasie głowy bólów, lepiej w takim razie służyć Synapizma na karku, rękach, lub łytkach, ale o tem więcej się mówić będzie przy zmniejszeniu symptomów, iako zwykły tenże wyrzut poprzedzać, a te są wyżej umieszczonemi.

Czwarta Ze pomiędzy temiż Symptomami naynieźnośnieyszymi są wielkie tęskności i ciężkości na piersiach, iako i silne przy maiazeniach głowy bóle, gdy te poprzedzać zwykły sam wyrzut, iako i wczasie biegu tej choroby dręczą chorego. Potrzeba mieć i na nie środki usmierzające, a temi są; jeżeli język jest nieczysty zamulony, i przytem owe nudzenia, służy proszek z

Ipekauany na lekkie wymioty *Ner zdo*, te niemogą być szkodliwemi iak lekarstwa laxujące, gdy tych wystrzegać się należy. — Na zmniejszenie znowu ciężkości na piersiach z dobrym skutkiem służą okładania ich, żywota z rumianku, mleka ciepłego, w których maczać często we czworo złożone chusty, dobrze wyzionięte, aby tylko niewilgotne przykładać, lecz upominam, żeby takowe często odmieniac, aby przez dłuższe leżenia na tych częściach niezastygaly, co by wielce do pogorszeń tych cierpień przyczynić się mogło. — Przy tem używać napojów, które się wyżej umieściły. — Na usmierzanie znowu głowy bólów, jeżeli przy nich towarzyszą: czerwoność twarzy, lub szum pisk w uszach, oprócz Synapizmów, które się nadmienily, służą okładania głowy zimną wodą, które iak nayczęściej powtarzać, można też i głowę zimną wodą oblewać razy dwa trzy dniem, a oprócz tego czasu czynić okładania, do tego w pomoc przybrać przyłożenia piawek za uszami, a nawet i na piersiach, zwłaszcza gdy ciężkość piersi z boleściami bywa połączoną.

Co się dotczy fryzłów położnic, w niczem się nieróżnią od innych,



przyczynami ich bydź mogą dyetta mniej zdrowa w czasie ciąży, lub zarozgrzywające się utrzymywanie przy rozwiązaniu lub też i po niem, gdzie uważane bydź mogą za produkta chorobliwe z tych samych przyczyn, iakoż mogą się od nich ciężarne uchronić, jeżeli się w brziemności stanie, osobliwie na niedziel 5, 6 od wszelkich niestrawnych potraw, trunków rozgrzewających, wszelkich namiętności wstrzymwały, a do tego czystość przynależną zachowały.

Co zaś do febry połogowej, do której zwykły się dołączać, leczenie ich równa się leczeniu samey febry połogowej, o której się niżej przy położach mówić będzie.

*O porcelanowym Wyrzucie.*

Gatunek tego wyrzutu, który w roku bieżącym w Warszawie rozproszono (*sporadice*) panował, różni się od pokrzywianego wyrzutu, że ma nie równie większe, szersze plamy, iak pokrzywiany.

Dla zaznajomienia z nim, ile tak mało znanym wyrzutem tu umieszczamy, a że się przy nim chorzy zachowywać mają, i tychże używać szrodków,

które się przy pokrzywianym wyrzucie zaraz podadzą.

*O febrze pokrzywianny.*

Febra bywa łagodna nadewszystko z katarycznymi znamionami, dreszczami, kichaniem, łez płynieniem, głowy bólem, czasem wyrznt nieraz uprzedza tę febrę, lub po niej wysypie się, iest zupełnie podobnym do sparzenia się pokrzywą, i ztąd prowadzi swe nazwisko. — Nieraz zajmnie pojedyncze ciała części, szybko powstanie przy napadzie febrycznym, a ginie wraz z iey ustaniem. — Nieraz znowu niknie w cieple, w zimnie występuje, a po trzech dniach, naydłużey po siedmiu zupełnie niknie z łuskwieniem, lub bez niego, skóry.

Przyczyny tę febrę zarządzające są naypowszechnieysze, zaziębienie, lecz pochodzić może od użycia, u nie których z ludzi, poziomek, raków it. p.

Choroba ta powszechnie iest łagodną, i niepotrzebuie szrodków doradczych, wszelako po zaziębieniu, od którego, iak się namieniło zwykła pochodzić. — Lekkie poty przez bżowy kwiat takowe zmniejszają, zupełnie zatracają ten wyrzut. — Powstawać zwykły i przy



zanieczyszczenia żołądka, w tenczas leczenia potrzebuie, które się przy febrze żołądkowej poda.

*O wyrzucie ogniowym.*

W pierwszych życia dziecinnego miesiącach powstają czerwone plamki na twarzy, pleckach, nieraz i po całym ciele. — Ten wyrzut innego niepotrzebuie zaradzenia, iak utrzymanie dziecięcia w czystości i ochronienia od zaziębienia:

*O wyprzeniach.*

Dzieci zwykły wypierać częścicy pomiędzy nóżkami iak około szyi i pod pachami, a to im iest znacznieysze zrządza dość znaczne boleści, które przez częste płacze, iako nie miłych uczuciw tłomacze dają poznawać. — Sytość ciała, zaniedbana okołoniego czystość, ostrość maczynych lub. Karmicielków pokarmów nacyjestszemi są tego przyczynami. — Czyste utrzymywanie, suche, codzienne kąpielki, a przynajmniej Ciała częste obmywania, czerwonych zaś wyprzanych miejsc zimną wodą z dodatkiem czwartey części wódki lub wina i zaraz osuszenie, posy-

powania gryczaną mąką, proszkiem nicpotym, raneczki zaś same smarować śmietaną kwaśną, masłem młodem niesłone, olejkiem migdałowym, są dostateczne srodki na zagoienie: nieśluchać rady, aby przemywać wodą Gularda, do której wchodzi ocet z gleytą, nieraz miałem przypadki, gdzie przy użyciu tej wody w silne dzieci wpadały boleści.

Zdarza się iednak, że przy tych wszystkich obeyściach się dzieci iak wypierały tak wypierają, w tenczas pomiędzy inne przyczyny ostrości pokarmów przypisać należy, wzbronieć zatem karmicielkom mocniejszy używać trunków, niedawać wiele mięsnych potraw, wodę za napój samą lub z pyrzem i łopianem gotowaną.

*O swierzbie Dziecinney.*

Pod nazwiskiem tego wyrzutu rozumiey małe kropowate krosteczki z przezroczystym końcem, utrzymujące w sobie wnet wodnistą, wnet gęstą materią. — Okazywać się zwykły pierw pomiędzy palcami, i wygięciach rączek, później rozpościerają się zwolna po rękach nóżkach po całym ciele, zrzadzają przykre swędzenia, które się



zwykło, w ciepłe, osobliwie w nocy, powiększać,

Drugi ich gatunek bywa suchy, niemając żadney w sobie ciepłości, ani też gęstszej materyi, a ten się od powyżey umieszczonego różni, gdyż nader rzadko zwykł u dzieci bywać. — Wysypka ta nayczęściej przytrafia się u dzieci ubogiej klasy, gdzie nieczystość około nich zaniedbywaną bywa. Daleko łatwiej w zimie iak w lato uleczyć ją można. — Ma udział do zarażenia, dosyć iest, mając ją, nosić dziecie na ręku, a stanie się iey uczestnikiem. Przy piersiach, lub noszone od piastunek, kiedy te, iak się dzieć zwykło, potajemnie na tańce, lub umizgi z domów uchodzą, i zarażają się nawet przez ściskania, całowania i t. p., bardzo łatwo biedne niewiniątko, a przy niem nieraz i cała familia, domownicy, zarazić się mogą. — Do tego nieczyste pomieszkania, gdzie ieszcze dosyć ludzi sypia, gdzie przędą wełnę, gdzie ludzie używają słonych potraw, daleko częściej zwykła się taż wysypka znaydować.

#### *P o s t ę p o w a n i e.*

Jeżeli dzieci zarażone przy piersiach, czystość około nich co do po-

ściółki, bielizny, świeżego powietrza, są nader pomagającemi środkami, karmicielki zaś leczone, a dzieci przez ich pokarm, bywają. — Na ten zamiar kąpać mamki, a przynajmniej codziennie ciała obmywać wodą, na pokarmy zaś dla tychże służyć rosóły niesłone, ani korzenne, kasze, kleje z nich, owoce świeże, ususzone, gotowane, ogrodowiny, mleczywa, wzbraniać im wieprzowin, słonych mięs, tłustych potraw. — Za napóy zaś odwar z korzeni pyrzu białego lub czarnego łopianu, wzięwszy każdego po garści dwie, kobyłego szczawiu, i jałowcu po pół garści, nalać półgarca wody, gotować do zostania się półtory kwarty, przecedziwszy, dać się podstać, i dobrze ostudzić, z tego odwaru wziąć połowę szklanki, a drugą połowę mleka przegotowanego, zmieszać i za napóy używać, ale po iedzeniu, osobliwie kiedy gotowanych na pokarm używają owoców, dopiero w godzin 4, gdy po innych pokarmach już co 5 zacząć mogą pić ten odwar, a tym czasem wodę czystą. — Gdzie się znayduie zrzeczność mienia parowni: nadane fundusze miastom Królewskim na utrzymanie Łaźni, Oby ta Oycowska królów, ieszcze dziedziców nad miastami tro-



skliwość mogła byźdź wskrzeszoną w naszych czasach, przy powszechném prawie obyczajów zepsuciu, ileżby bezkosztownie można dobrodzieystw utworzyć): iakoż nieupatruję dzielniejszych do szybkiego wyleczenia środków nad parównie dobrze urządzone, użytek ich równie mógłby się rozciągnąć i do bólów kostnych, darcia po stawach, cierpieniach ciągłych rumatycznych i t. p. — Takowych parówni użycie byłoby dostateczne trzy razy w tydzień dzień przez dzień, a oprócz leczenia, pospiesznego tych chorób, ochronny od nich, tudzież na przeciw różnym skórnym długim wyrzutom, dla samego utrzymania w czystości ciała tyle wpływu na utrzymanie zdrowia mającący byłoby niemalém dobrodzieystwem, jeżeli nie ogólnie przynajmniej po dobrach korony i narodowych Ekonomicznie, dogodnie parównie takowe urządzić, aby rolnicy przez te środki uczestnikami stać się mogli tak dzielnych skutków, które im zapewniają.

To jest tedy całe leczenie starych, dzieci zaś przy piersiach, iako używających zwykłych pokarmów, ale w czasie mienia tego lub owego gatunku świerzbu równie w przy należney dyett-

cie

cie utrzymywać się mają karmiące osoby iakoż dla nich służą równie też, same pokarmy, które dla karmicielek wskazałem, byźdź może za napóy do którego wchodzi korzeń kobylego szczawiu do picia dla dzieci starszych nie przyjemnym, opuszczyć go można, i pozostać przy pyrze białym, czarnym i łopiatnie, albo miasto tego odwaru dawać im pić serwatkę.

Nie może zaś byźdź nic szkodliwszego, a na nieszczęście ledwie się niepowszechnie dzieć zwykło, że dla zatracenia pospiesznego świerzbu, używać zwyklimy smerowań różnych. — Ostrzegam, aby tak szkodzącego środka bez poprzedniczego użycia przyzwolitey dyetty wyżej podaney, bez picia wskazanego odwaru i ich przez czas iakiś ciągłego używania nie czynić.

Uczą liczne doświadczenia służyć mogące za wielkiey wagi przestrożę, że też smarowania spędzały wprawdzie ten lub ów świerzby gatunek, ale też przystępowały po nim krótkie tchnienia, ciężkość na piersiach, suchoty u dzieci, wyniszczenia Ciałek, konwulsye, paraliże, ślepotę, głuchotę, ciągłe głowy, po stawach, krzyżów bóle.

Na przypadek nieszczęśliwy wpędzenia świerzbu nieradzę obojętnie ta-

*Część II.*

21



kowey przyimować, lub czasowi zostawiać, owszem niebawnie przykładać naprzemian synopizma na piersiach, rączkach, nóżkach, czynić kąpiele z dobrze ciepłej wody, do których dla drażnienia organu skóry soli garstkę wsy-pać, lub odwar z gorzycy.

Tym sposobem kąpiele i po dwa razy na dzień czynić wypada, a w czasie wolnym od nich nacierania całego Ciała chustami, kuczbaią, flanelą; a wreszcie i sukniem, aby nie ostrem. Dać często pić bżowe ziółka ciepło po filiżance, a wreszcie gdyby wymagała potrzeba, znawcę przywołać.

#### *O Liszajach.*

Są to małe czerwone lub żółtawe krosteczki skupione do siebie, czerwoność skóry świerzbie, a nawet i ciągnięcie iey sprawują, przyczem też skóra zwykła unosić się, a za iey dotknięciem się twardość nieiako okazująca.

Kiedy ten wyrzut bywa odskubanym przez dzieci lub sam odstaie, wydaie lipkość ciekłą ostrą, która bliżskie miejsca roziątrza, a nawet i małe raneczki zrządza:

Podsycha w skorupkach, a na to miejsce powstają inne, nieraz zajmując ten wyrzut różne części ciała, rozszerzać się po nich dość znacznie zwykł. Nieraz sam przez się ginie, a powraca latem lub w jesieni.

Zrządzać zwykły ten wyrzut nędzna dyetta, używanie tłustych a do tego starych masel, skoniń, korzenne przyprawy, napoje gorące, obżarstwo, zaniedbana czystość,

#### *S r o d k i.*

Częste używania świeżego powietrza, kąpiółki, nacierania Ciała, ochłodstwo około ciała, sukien, bielizny, słowem służyć to wszystko, co się przy świerzbach podało. — Świerzbie, a za samego wyrzutu najskuteczniej znosi, gdzie może bydz, para z mleka i wody na nie puszcza, często czynić, a inne miejsca temże samem mieszaniem często dniem przemycać. Wprawdzie iest to łagodny sposób i cierpliwości potrzebujący, ale za to pewniejszy, niż inne smarowania spędzające, a które równie sprowadzić mogą też same smutne, które się przy świerzbach podały wypadki.



## O p a r o h a c h.

Uparty i obrzydly ten wyrzut zajmujący tylko włosy na głowie, przy którym skóra na niey znacznie zwykła nabiegać, robiąc nieiako tęgą skorupę wydaiącą z siebie cuchnącą ciekłość. Ten wyrzut ma ucześnieństwo zarażenia, że się może przez czapki, czapeczki innym dzieciom udzielić. — Nader rzadko zwykł się przed 4, lub 5 rokiem okazywać, a trwa nieraz aż do mężnienia lat będąc zaniedbanym, znajdując się nawet lubo rzadkie przypadki gdzie twarz zajmował. — Dzieci przy nim wyglądają blade, chudnieją, dostają sinych, pod oczami obrączek, stają się nudnymi, niespokojnymi, przykreimi. — Wyrzut ten, czyli raczej owa zrzęca nad nim ciekłość, nieraz sprawia nadżarcia kości czaszki. Niemogę tu dosyć prosić osób staruszek około dzieci mających, ażeby żądnych nieużywali od lada kogo środków, ani też szkodliwych rad niesłuchali, nader łatwo nielęczone kalitwa dla nich sprowadzić mogą, iakoż niezbywa na ilości smutnych wprowadzeń doświadczeń, że po nieroztropnem doradzeniu przystępowały ciągle oczów zapalenia, ślepoty, obłąkanie zmysłów,

ciężkości na piersiach, krotkiego tchna, a nawet i wyniszczenia Ciałek.

## S z r o d k i.

Wziąć rzerzuchy wodney, wy-cisnąć z niey sok, żeby go otrzymać można np. kwaterkę, świeżego sadła wieprzowego pół funta, na bardzo wolnym ogniu gotować, mieszając przez dobre pół godziny. — Tę nasmarowawszy chustę na głowę przyłożyć, aby tak przez cztery godziny leżała na niey, przez co skóra odwilżoną i zmięczoną zostanie, pówoley od skóry odpadać, lecz to trzeba z cierpliwością czynić czas nieiaki. — Do tego utrzymować głowę w czystości, często włosy przeczesywać, zupełnie zakazać noszenia czapek baranami lub innem futrem podszytych, to bowiem zwykły się wiale do pogorszeń przyczyniać, a na ich wieysce lekko ogrzewające np. bawełniane nosić, aby nie w lato.

Przy tym wyrzucie, zwykło się i robactwo zalegać, mnożyć, to wygubić należy, a ku temu dzielnie służy nasienie pietruszki przetłuczone, przesiane, którego część iedną z dwoma sadła topionego zmieszać, a wysamrowawszy nią czapeczkę dobrze głowkę



obeymującą, i lekki przycisk czyniącą na głowę przyłożyć, co powtarzać po dług potrzeby wypada.

Nadmienić tu a razem i naganić muszę okropne zdarcia tego wyrzutu przez przykładanie plastru ze smoly, zwłaszcza kiedy się toż złe upartem okazuje. — Następującą maść na tę upartocić zalecam, a która w skutku jest łagodną, roztopić kawałek żywicy dodając żytnięy mąki, i oliwy, aby po stopieniu i zmieszaniu nie była zbyt twardą, tą nasmarowawszy płótna kawał, porznąć go na kawałki szerokości palca, ostrzygłszy pierwey ile byź może włosy, na krzyż takowe przykładac, po godzinie. czasu leżenia bez przykrości odiać się daia a stosownie do potrzeby powtarzać takowe przykładania należy, ale i w tem cierpliwość zalecam, zapewniając że skutek lubo powolniejszy wszelako nastąpi.

#### *O robactwie w głowie*

Słabowite dzieci są nadewszystko robactwu uległe. — Na zatracenie zaś szkodzą maści a to tém więcey do których wchodzi żywe srebro. — Najlepiey służy utrzymanie włosów w czystości przez częste czesania, włosów o-

berznięcia, wspiera też czystość posypowanie włosów proszkiem nasienia pietruszczanego, lub smarować włosy mieszanem tegóż proszku z masłem, wzięwszy pierwszego część iedną, do 2 lub 3 masła. — Na wygubienie zaś gniazda dobrze służy skrapianie co wieczór olejkiem weynszteynowym (*oleum tartari per deliquium*) a następne-go dnia włosy wycesać.

#### *O brodawkach.*

Powszechnie dzieci od 5, 6, lub i późniejszych lat, dostają, po palcach, rękach, twarzy, a nawet i po innych ciała częściach twarde wyrostki ciurpowate, te brodawkami nazywamy, niektóre z nich bywają osadzone na korzoneczkach, gdy drugie tak głęboko siedzą, że ledwie ponad skórę bywają uniesione.

Kiedy są na korzonkach, nayspieszniey służy podwiązać je iedwabiem, lub włosem końskim tuż przy samey skórze. — Można i mydłem czystem takowe brodawki codziennie czas nieiaki smarować pokąd niezbieleją, i miękkimi się niestaną. — Gdyby i przez te szrodki ginąc niechciały, można rozmiękczenia przez mydło działane, szeyd-



waserem w samym szrodku zacząwszy napuszczać, a zniszczone tym sposobem, lekko zeszkrobywać, i tak czynić do zupełnego odnóżeń ich zniszczenia: lub na miejsce szeydwaseru napuszczać ie essencyą z much hiszpańskich 10 lub 12 razy przez dzień, wszelako oprócz brodawek nieradzę innych krost napuszczać. — Do tego przestrzegać dzieci, aby się w brodawki niezarzynały, lub ukłuwały, często z tey przyczyny inne złe powstać może. — Bywa nieraz, że znaczna ich liczba po ciele się znayduje, w tenczas picie odwaru korzeni łopianu, pyrzy czarnego, wołowego oka za napóy radzę, a latem serwatkę. — Nie można tego z baczności spuścić, kiedy się też brodawki zaczynają rozszerzać, swoy do tychczasowy kształt zmieniać, ołowiany kolor przybierać, a gdy do tego boleć zaczynają, w tenczas stać się mogą ziadliwemi, a nawet w rakowate grzybowatości przechodzić przestroga się więc dać, że niepotrzeba sobie ich drażnień, kluciów, zarzynań lekko ważyć, iak się zwykle dzieje.

#### *O wenerycznéy chorobie.*

Nader smutnym iest wypadkiem kiedy niemowlęta bywają ofiarą uło-

mności swych Oyców. — Dzieci z takowego łoża spółdzone na pozor zdają się na świat przychodzić zdrowe, lecz po upłynieniu kilku tygodni, już się owoce grzechów Rodzicielskich daia poznawać pozapaleniach powiek, i zgromadzeniu się rapy w ich kątach.

Do tych przedstawień przyłączaią się po całém ciele małe wrzodeczki i te powoli szerzą się po całém ciele dostaiąc słoniowatości nieiako, później czernić zwykły, nielepicy się dziecie z wydrążeniami ust, gdzie się takóž okazuią słoniowate krosteczki, powiększey części na zawąłkach ustnych, na języku, gardziółku, i te zwykły sięz miejsca na miejsce przenosząc rozszerzać, lub na nich niknąć, i znowu powracać. Co większa od takowych dzieci brodawki karmiących twardnieią, pękaią, i powstaią na nich raneczki.

Wrzodeczki po nieiakiem czasie całe ciało zajmuią, odpływ ropienia powiek pomnaża się, a nawet i poza uszami, na częściach zaś rodnych i w stolcu krosty weneryczne, maiące do ospy podobieństwo, lecz nie są tak wysokie, a na prędce przechodząc w ropienie nikną. — Na główkach takóž powstaią obrzmiałości wielkości orzecha włoskiego, a kolor twarzy albo



zółty lub niebieskawy, czoło pełne marszczków, a podług doświadczeń Girtanera, że po całym ciele okazują się niebieskawe, miedziannego koloru plamki, około zaś stolca pryszcze i popadania.

Te znamiona okazywać się zwykły u niektórych dzieci po pół roku, lub w lat kilka, a kiedy tenże jad niebывa mocno zjadliwym żadnego śladu powierzchni tej choroby nieostrzegamy.

Jest ten rodzaj choroby jeden z najgorszych, który się udzielać może, a nawet i nieraz udziela dzieciom od mamek, iakoż skutki tego jadu okazują się przez krosteczki w ustach, gruczołki zaś u niższej szczęki i szyi nabiegają, twardnieją. — To iak się tylko dostrzega, nieczekaając karmicielkę oddać potrzeba, jeżeli z iey poóarmu jadu tego uczesnictwo dziecie nabyło, lecz i nawzajem równyż udział iego niewinna karmicielka z dziecią przez ssanie uzyskać może, jeżeli dziecie swywoli rodzicielskiej skutki na świat przynosi, i chociaż ten jad nie jest jeszcze tak zjadliwy iak ustarego natury przecie jest jadem, przecie iakowąś częśćkę pierwiastku iego nabywa. — W obu tych przypadkach, ie-

żeli matki jest wina, w żaden sposób sama karmić niepowinna, ani też obwiniać niewinną karmicielkę, której przecie na uczesnictwo tej choroby od dziecią nabyć się mogący poświęcić bez narażenia spokojności w żaden sposób się nie godzi. — Lepiej daleko się stanie, kiedy w takiem zdarzeniu dzieci karmione bywa sztucznie i w tém odśyłam czytelników do części pierwszej niniejszego Dziełka, części drugiej i trzeciej, gdzie się mówiło o odchowcie dzieci w pierwszych latach.

Lecz oprócz powyższych nabyciów tej choroby przez matki lub karmicielki, równie razóno byđ mogą przez pościel obcą jadem tym nasycóną, lub też iak się nieraz zdarza że nabywa dziecie jadu tego od piastunekę, zwłaszcza kiedy na obrzydły zwyczaj żucia pierwey pokarmów w swych ustach niema bacności, równie nabyć mogą dziecie tej choroby przez całowanie osób wenerycznych.

Dla poznania więc tej choroby znamion wraz z iey przyczynami położyłem, leczenie zaś zostawia się Lekarzowi, przed którym utaić powodów do niey nienależy, summienny iakim byđ powinien znawca dochowa powierzonego sobie sekretu, i skuteczniey



działać nieomieszka a to stosownie do przyczyn, od których się wszczęła, Młodzień płeć męzkiey wolności w kwiecie życia swego doznająca pomniey ile nie tylko sobie, swym przyjaciółkom ślubnym, ale nawet potomstwu spłodzonemu stać się możesz szkodliwą, niechay ci opis tej choroby służy za skazówkę, za przestrożę do położenia granic w nierządnych uczuciach.

### O guzie nadgrydczowym.

Guz ten powoli powstający, wolny od bólu, właściwy krajom górzystym, Alpom, Pireneom, Tyrolowi. Anglii, i u nas przytrafia się widzieć, do powstania jego są różne zdarzenia. Walentyni dostrzegł, że żołnierze dostawali tego guza, którzy z otwartą szyją chodzili, i że zimne powietrze obwiewając tę część ciała, wstrzymując parowania, wielce się do niego przyczyniac miało.

Bydź może że dla teyże samey przyczyny kobieca płeć więcej od niego napastowaną bywa. — Inni znowu utrzymują, że tenże guz picie wód twardych zrzędza, wszelako jest wielkiem do prawdy podobieństwem, że noszenie ciężarów na głowach zwykłe

górzystym kraiom z nachylonym nieco karkiem nadewszystko do udzielania iego przykładą się — Mimo iednak tych przyczyn równie wscząc się może przez mocne śmianie, wymioty, kichanie, krzyczenia przy rodzeniach nawet, z wieszania wytył głów — Bardziéy on piękności szkodzi a niżeli zdrowiu, iakoż miewać go zwykli czerstwém udarowani zdrowiem, wszelako zwiększenie iego, blisko leżące krwiste naczynia cisnie, i wielce się do nadgromadzenia iego w muzu przyczynia, iakoż z tąd nieraz powstają zawroty głowy, bóle, a nawet i tchnienie pracowite — Lubo w samym początku powstający łatwym do rozeyscia bywa, iak w swéy znaczney wielkości trudnym, w początku ciepłoty części ciała utrzymywania, przykładania na nią woskowanego płótna, ceraty iedwabnéy, flaneli kamforą dobrze natartej zmniejszają go nawet, i do zupełnego rozeyscia się skutecznie przykładają — wzrosły wymaga iuz przybrania w pomoc szrodków wewnętrznych — Do tych bez obawy należą, picie kawy z żołądki i gąbka na węgiel palona *np.* wziąć téż drachmę iedną, dwie, cukru łótów 4, zmieszać na proszek, i dawać po dwa razy na dzień, młodszym na dobry koniec noża z wodą, i



popić wodą, starszym po maléy od kawy liżeczce. —

*O Robactwie skórnyém. zwaném.*

Powszechnie skóra daie się uczuwać chrapowatą, bywa niezliczoném množstwem ciemnych punkcików okryta: wystaiąc ią, odłuskuje się skóra a znią i ten wyrzut, na wzór małych okrągłych ciałek, co nuyczęściéy zdarzać się zwykło trąc skórę zaraz po kąpielkach — To aczkolwiek żadnego nie maiące niebezpieczeństwa zjawisko, nadewszystko się okazuje u dzieci pierwszo miesięcznych, a lud pospolity zwykł utrzymywać za robactwo skórne, niczém iednak nie jest iak wyrzutem skórnym w skutku zaniedbanego dzieci w ochędóstwie utrzymywania, lub téż i za ciepłego ich chowu, iakoż izby wilgotne przeziwy skórne wstrzymuiące, i pozostałe na skórze nieczystości znacznie się do niego przyczyniaią, równie iak w późniéjszém życiu nędzne niezdrowe pokarmy, częsty iay użytek, masła lub innych tłustych rzeczy, pap mącznych, mianowicie u młodych zbyt dziecni zwykły

przyprowadzać ten gatunek wyrzutu — A że się równie nazywaią współziadaczami (*comedones*) pewnie to pochodzi, że zaniedbane ochędóstwo wiele zdrowiu dziecinnemu szkodzi, że takowe pożywności ciała uszkadza tak dalece, że w końcu ciało niższyć zaczyna i usycha — Dzieci przy tym wyrzucie utracaią sen, krzyczą dzien i noc, są niespokoynymi, przy użytku pokarmów i appetytucie dobrym wszelako coraz chudnieią i z sił opadaią, a przez zbytętną nerwów drażliwość są do spazmodycznych cierpień nader łatwe sposobnemi. —

Leczenie tego wyrzutu wspiera się na usunięciu zrażaiących go przyczyn, to iest: na utrzymaniu w czystości ciała przez kąpielki, do których użyć można przecedzonego z otrąb czyli przeniecznych lub żytnich odwaru, a przynajmniey codzienném ciałek obmywaniu odświeżaniu posciołki, przesuszowaniu téżże, ciałka częstych nacieraniach, i suchości wszelkich rzeczy, które dzieci na sobie noszą, lub w których sypiaią, codzienne świeżego powietrza używaniu, dzielniey skutkuią nad wszelkie inne szrodki pełne przesądów i zabobonu. — Przepomnieć niemogę nader skutecznego szrodku, przez Akiermana zaleconego,



a ten zawiera się w następującym sposobie. —

Po rozwolnienia skóry przez poprzednie kąpiele zrobioném mieszaním z 5. części drożdży i łyżki miodu, które musi pierw zakisić, i tём nacierać ciało za pomocą ręki co minut kilka, kilkanaście, skórę obmyć wodą z mydłem. potem lekko scierać chustą, a przytём dadzą się zoczyć schodzące ze skóry wyrzutki.

#### O Robakach.

U dzieci młodych i starszych najpospoliciéy znaydują się dwa robaków gatunki w żołądku i кишkach, glisty, (*Lumbrici*) w stolcowey kiszce drobne krótkie, grube, podobne do znaydujących się w tłustych serach (*ascari-des*.)

*Powszechnie znamiona, z których o przytomności Robaków w nosić możemy.*

Błada obrzmiała twarz, częste iéy kolorów odmiany np. wnet czerwona wnet chorowita bladość, nozdrzy, wyższy

szey wargi, niebieskawe pod oczami obrączki, niedosytny apetyt szczególniéy do surowizn iakoto rzepy, marchwi, i t p. u niektórych znówu wstręt do iadła, wychudnienie ciała, uyma silek, ociężałość, odpływ z ust sliny wodnistéy, nudności, wymioty, szczególne w żołądku czeczosci uczucie, po iedzeniu kwitnienie liców, swędzenia pod nosem, częste osobliwie rano głowy bóle, kwaskowa z ust wonia, kolki w okolicach żołądka, uczucia gryzień około pępka, twardy, wydęty, naprężony żywot, częste a do tego szybko przystępujące, wnet ustępujące pępka wydęcie połączone z bólem, czkawką, mętna nieczysta urynka, twardy stolec lub biegunki, nagle przystępujące chcenia, sen niespokójny, częste zrywania się we snie, gadania, zgrzytania zębami, szczególne twarży poruszania, omglenia, a nieraz i konwulsye — W następstwie tu opisanych znamion, a przy nich i choroby wzrostu, przywiązywać się może i suchotna febra, w tenczas oprócz pogorszeń tychże znamion, przyłączać się zwykły i kaszel. —

Powyżéy opisane znamiona niemożą przecie choroby przyczynę od robaków przytomności stanowić. ponieważ także zwykły towarzyszyć przy wodzie



wmuzgu, wyniszczoneń ciała, a zatym pewniejsze znamiona są następujące: lzy puszczaące powieki, rozszerzenia: zrzenicy, częste oczów we snie przewracania, tak dalece, że tylko bia ko widzieć się daie, nagłe nudzenia, wnet po napiciu się zimnój wody ustające, wygórowania i opad żołądka szybkie, nieraz daią się dostrzegać tu i owdzie na żywocie wygórowania, a te zwykły wnet zapadać, częste chcenia, serwatce podobna nrynka mętna, a nayspewniejszym pomiędzy wszystkie znamiona, kiedy robaki odchodzą, lub dawniej okazywały się. —

Łatwo bardzo następstwo robaków poznać się daie co do ich mnośtwa i gniazd, ponieważ znaczną część pożywności ciałnej na swoją obracaia, dla tego to nieraz widzieć się daia ludzie nawet starsi zbyt nędznemi obok dobrych, zdrowych, żyźnych, których maia dostatek, pokarmów — Nie raz to dla przyczyny odiecia pożywności, dostrzegać się daie niedosytny appetyt który przez częste wymioty znowu uymuiące posilek powiększać się musi.

*Zachowywanie dogodne.*

To zawiera wsobie unikania wszystkiego; co się tylko do zagniezdzenia roba

ctwa przyczynia, np tłuste potrawy, mączne, zwłaszcza niedobrze lub wcale niekiszniące, iakoto ciasta, chleb, kluski, zacierki, częste a do tego obfite użycie kartosli, bobu, grochu, soczewicy, sera, ciepłe napoje, iakoto: grzane piwa, a tém bardziiej niedobrze wyrobione. —

Nader rzadko miewaią dzieci przy piersiach robaki, dostaią ich w ten czas, kiedy innych pokarmów, a nade wszystko różności ich zacząć używać, naprzeciwna tey — a nieprzykładaiać się do mnożenia robaków dyetta zawiera wsobie i pokarmy i leczenia. — Tu służą kleie, wodne zupki, rosoly chude i takowóz mięsa, miód na chlebie, lub po nim smarowane masło młode, aby nie grubo posypawszy go na wierzchu chrzanem tartym, lub drobno kraianą rzeżuchę, co osobliwie służy rano, nadezeczco dawać do iedzenia, owoce dojrzałe. — Za napój latem serwatki słodkie, mleko słodkie, w którym ugasić po razy kilka żelaza kawał rozpalonego, można téż mleko rozciączyć wodą, w której ugasić żelazo, a w ten czas już tegoż gaszenia wmleku nie czynić — Do enemków służy czosnku ząbek, utłuc z mleka ciepłego filiżanką, przecedzić, i dawać z tego enemki co dzień lub co drugi — Można téż enemki robić



z wrotyczy kwiatu, piołunu młodego, np wziąć każdego po dwie dobre szczypcie, gotować w dwóch filiżankach wody do zostania się połowy, przecedzić, dodać wołowęj zolci, gdzie się znajduje sposobność ięj dostania tyżeczek parę od kawy, miodu prasnego tyleż, i takowe enemki co dzień co drugi dawać, mianowicie po uwolnionym pierwéj zwykłym stołeczku — Dobrze także służy następującym sposobem robione piwo lekarskie — Wziąć korzonków paproci samca (*polipodium filix mas.*) Wrotyczy pospolitęj kwiatu — Goryczki łąkowéj (*Gentianna amarella*) albo polnéj (*gentianna campestris*) lub krzyżowéj (*gentianna cruciata*) którejkolwiek z nich suszonych, każdego po pół funta odważywszy, rumbarbaru łótów dwa na kawalki pokraianego, i w płatek obszerny zawiniętego, soku z lukrecyi łótów 4 — nalać na to wszystko piwa świeżego, które dopiero robić zaczyna garcy dwa trzy, w ciepłym miejscu postawić, aby robiło; po wyrobieniu, i dobrém ustaniu się, piwo to od drożdży i mętów zlać prosto w butelki, i do dalszego użytku zachować — Z tego dawać dzieciom od lat dwóch po łyżce od iedzenia dwa lub trzy razy na dzień, z dodatkiem nawet i zwy-

czajnego piwa, aby tylko dobrze wyrobionego, więc może bydź zaraz i po obiedzie użytém — Starszego zaś wieku dzieciom po pół kieliszka do całego, a ieszcze starszym i po cały szklance. —

Po ukonczonéj materji o robakach dla ciekawości pozostało nam do załatwienia pytanie, z kąd powstają w ciałach ludzkich robaki? czyli takowe swój początek biorą od pokarmów, napoiów, lub czyli się same w ciele utwarzają? —

Pierwsze pytanie powzięte, że w okolicach, gdzie wiele ryb, iakoto: w Holandyi, Anglii, lub gdzie grubych potraw używają, daleko więcéj się u ludzi robaków znajduje, niżeli w innych krajach — Wszelako daleko więcéj iest do prawdy zbliżające się podobieństwo, że zaród do nich znajduje się w ciałach ludzkich, abydz może, że za nadarżającą się przyczyną rozwijają się, i ożywiają, iakoż mgliste, wilgotne powietrze, położenia takowéż kraju, zwyczajne grube potrawy znacznie się do rozwiań przykładają. —



*Następujące zasady sprzyiają  
tym zdaniom. —*

imo Że robaki po różnych trzewiach  
znaydować się zwykły, do których po-  
wzięły z pokarmami zarodek, wżaden  
sposób doysć niemoże np. w mózgu,  
płucach, wątrobie, pęcherzu moczó-  
wym, a sławny niegdyś Ruisch znaydo-  
wał ich w spikach kości. —

*Powtórę że u dzieci nowo naro-  
dzonych, a nawet i poronionych znay-  
dowano robaki, nie dla innéy to iak  
dla téy przyczyny nowsi natury bada-  
cze, Bloch, Götze utrzymują, że nasienie  
robaków iest ludziom przyrodzone. —*

*Po trzecie uczą nawet doswiadcze-  
nia że znaczna zachodzi różnica pomię-  
dzy robakami znaduiącemi się w ciele  
od tych robaków, które się pomimo ich  
znaydują, co do organizacyi. —*

Do tego dodać można, że się także  
u ptastwa, u psów i innych zwierząt  
znayduje robactwo, iakoż zdaie się z  
porządku natury wypływać, że iedno  
stworzenie żyje dla drugiego, a Czło-  
wiek iest światem dla tysięcy innych. —

### *O Wielkiej Chorobie.*

Choroba ta iedna z naynieśczęśli-  
wszych różni się od konwulsyow przez  
wyższy stopień wzruszeń nerwowych,  
przez peryodyczne i poniekąd znałożne  
napady, a to przy zupełney zmystów  
wszelkich utracie, zwykła opuszczać,  
ze szczególnym krzykiem padaia nie-  
szczęśliwe dzieci na ziemię, iakoby na-  
głe popchniętmi były, oczy są wryte  
lub też poruszające tu i ówdzie, usta  
bywają scisnione, a szczeka niższa przy-  
cisniona do wyższej, że nieraz wywi-  
chnienie pierwszey następowało, kale-  
czą sobie ięzyki, zgrzytaia zębami, u  
niektórych nawet głowa na obie strony  
dość szybko poruszaną bywa, szyja  
staie się wypreżoną, a ręce i nogi ro-  
zmaicie wzruszonemi bywają.

Po ukonczonym napadzie powraca-  
ia wprawdzie siły, chory przecie czu-  
ie się bydź osłabionym, w pada nieia-  
ko w drzymanie, zktórego ocucony, nie  
niewie, co się z nim działo. —

Przyczynami téy smatnéy choro-  
by bydź mogą też same, co i konwul-  
syów, a nadewszystko przełęknięcia,  
i robaków obeoność.

Leczenie bywa bardzo trudne, a  
im większa ruchawość i drażliwość ner-



wów jest żywszą, szybciejszą, tém daleko jest trudniejsze, równie kiedy się już usposobienie do nięz znajduie, iakoż przez przeciąg czasu cały nerwów system przybiera charakteru wielkiey choroby, a co się dotyczy drażliwości i czułości nerwów, te są tak wielkie, że za małą nawet zręcznością na nowo napada, czego mamy przykłady, że każda radość, przełknięcie, przestach, boiaźn, nowy napad zrządaią, a ten im bywa przedłużanym, tym silniey się odbywa.—

*O obchodzeniu się z chorym.—*

Że leczenia podać nie można z wielu ważnych przyczyn, przynaymniey obchodzenie się mogące wielką choremu ulgę zrobić opisać wypada.— Odmienić położenie chorego, czyste powietrze, podróż, osobliwie na morzu, zupełna do tychczasowego sposobu życia odmiana, ciała poruszania, zostawania w wieyjskiem powietrzu, używania łatwych do stawienia potraw, wolne kąpiele.

Są doswiadczenia równie w tęp iako i innych ciągłych (*chronici*) chorobach, że odmiana pokarmów, *np.* iezeli kto używał przedtem mięsney nawięcey diety, a dalej utrzymował ży-

cie na roslinach, owocach i t. p. lub na przeciwnie, przez co nastąpiona zmiana konstytucyi, takoz i odmiana miewsca leczyła dzielniey, nizeli wszystkie szrodki w skarbie materyi medycznęz umieszczone.—

Dodać tu ieszcze muszę przerywaiący wielkiey choroby napady sposób, a lubo ten względem otwarcia ust (iak się to wyżej nadmienilo o stanie szczęk) bywa do wykonania przytrudnym, wszelako dla skrócenia tych nuygwałownieyszych w organizmie poruszań, ila bydz może, nie powinien bydz zaniedbanym— Dołożyć zatęp pracy, aby usta nieco otworzyć i szybko szczypcę dobrą soli w usta wsypać.—

Zaledwieby można dać wiarę bez doswiadczenia, aby ten przedsięwzięty szrodek nie miał napadu przerwać, a przynaymniey zwolnienie i skrócenie gwałtownych poruszeń zdziałać.—

*O Chrzanicy (Raphania)*

Szczególna ta w swym gatunku choroba daie się na dwa dzielać periody.—



## Pierwszy peryod

Zaczyna się z przykrém nader gryzieniem pod piętami, lub w innych miejscach ciała, uczucia upalców, po skórze bardzo iest podobne łożeniu mrówek, lub téż uczuciu, kiedy część iakowaś ciała, przez zimno mocno ztętwieie, albo iak się powszechnie mówi, stała się nieczną, po powrocie do niéy ciepła daie się czuć iakoby coś łożiło, czoięgało się — W wyższym téy choroby stopniu przedstawia się toż po całym cieie niewyłączaiać ięzyka, bywa bardzo dokuczaiące — To uczucie powolej rozchodzi się począwszy od brzyscy palców po rękach do głowy, a ręce i nogi nabieraią nieiako ociężałości — W serca dołeczku uczuwa chory przyciskaiącą boleść, narzekanie na zimno, a które od żywota począwszy do krzyżów się rozchodzi — Napad ten po kilku dniach zwykł się powiększać, do którego ciężkość piersi, zawroty głowy, wymioty się przyłączaiają, a dopiero wzruszenia rozmaite przystępuiają — Twarz wnet blada, wnet czerwona, a chorzy silnie krzyczą od bólów, które zrzadzaią skurczenia, stawów, i zebrzą prawie aby im takowe prostować, a co zwykło im ulgę sprawiać — Po trwaniu

przez czas niepewny tego napadu, chorzy zachowuią się w milczeniu, a osłabieni leżą własnie omgleni, po pół godzinie lub nieco późniéy do siebie powracaią żądaiąc zasilku, a nawet dostaią chęci żarłocstwa, lecz im więcéy używaią pokarmów, tém silniéy późniéysze téy choroby napady przystępuiają — Daleko zaś siluiéyszy stopień iest następuiający. —

Chorzy doznaiają znacznego głowy zawrotu, upadaią iakoby zadurzeni na ziemię, drżą ich członki silnie, doznaiają drgań, palce się kurczą tak mocno, że ich bez znacznych boleści rozprostować nie można, chorzy pocą się zimnym potém, przewracaią się ustawicznie przy ciągłych niespokojnościach, niektórzy z nich żądaią nieustannie picia, ale przytém dostaią tęskności pomnażaiących się, oczęsto się krztuszą, wszelako bez wymiotów — Puls bywa szczupły zaledwie domacać się daiący. —

Przy przytomności tu opisanych znamion trwać zwykł kilka godzin napad, a konczy się na wielkiéy choroby poruszeniach — Nadmieniam Lekarz Taube o téyże chorobie panuiącyéy roku 1770-71. w Xięstwie Luneburskiem, że żadnego z niéy niemógł uratować. —



*Drugi Periód. —*

Bywają nieszczęśliwi, u których ten peryod następuje, jeżeli w pierwszym nieszukano dzielnej przewidzianej rady, pomoc w nim bardzo rzadko zwykła się udawać, ponieważ iad téj choroby działa tylko w częściach wewnętrznych, niedostrzega się już kurczów wrękach, nogach procz odurzeń, — chorzy są pozbawieni przytomności, twarz bywa smutną, słaby słuch lub zupełna jego utrata, drży język — nieustanne drżące krztuszenia przechodzące w silne żółciowe wymioty, nieugaszone pragnienie, nocy bezsenne, na samych miaczeniach i uroieniach przepędzone, pałają dłonie, skóra sucha, stolce mimowolne odchodzą, niemogą dzieci wskazać miejsca dolegającego chociaż niustannie stękaia — Dorosleysze zas uczuwaią palenie w głowach — Przystępuią mocne drgania, a nawet nieszczęśliwi kaleczą sobie zębami języki — Te lub owe z nich cierpienia trwaią bez przestanku dni kilka, a tym śmierć koniecz pokłada — Były doswiadczenia, że nawet przy życiu ieszcze obumarcie część i ciała następowało, iakoż napastuią nader silne boleści w nogach, udach, późniéj niecomocne odurzenie, beczul-

ne otrętwienie części, a w krótcie potem boleścią zaięte czernieią, gangrenieią odpadaiać kawałami od pobliskich części za życia ieszcze, a w tych zalega się robactw.o

*Dostrzeżenie nad tą Chorobą.*

Napady téj choroby lub ieden z nich trwaią przez dzień i noc, a nieraz i kilka tygodni — Może nawet na powadze wiary godnych mężów trwać przez lata, wszelako z niejakimi przerwami śmierć przystępuje nagle, a nieraz ią poprzedza powszechne sparaliżowanie, przy piersiach zostaiące ieszcze dzieci, w napadach umieraią — Niekiedy znowu sądzą się bydź zupełnie od nowego napadu wolnemi, osobliwie wzwyczaieni do téj choroby, wszelako konce palców są nieczułe, podwoynie wszystko widzą, i tuż świeży napad przystępuje, a przez otrętwienie palców konce ich zupełnie staią się nieczułemi, że iuż nie uczuwać nie są w stanie, chociażby szpilkami t t p. narzędziami kłuć, kraiać chciano — Wychod téj choroby nieraz bywa smutnym, przechodzi w wielką chorobę, lub zupełną zmysłów utratę — Napastnie niewyłącznie ludzi kazdego wieku, rzadko iednak dzieci —



Powstawać zwykła w czasie zniw żyta, nieraz napada razem kilku ludzi iak pannie Epidemicznie — chistorya iey wskazuje różne Epidemiczne po rozmaitych kraiach panowania iakoż roku 1596 w Hessach, a przyczynę do niéy przypisywali lekarze owczasowemu niedostatkowi urodzaiów, z potrzeby zaś niezdrowych rzeczy na utrzymaniu się przy życiu użytkowi, roku 1648 w Woglandzie, tamże w roku 1625, 1693 a w roku 1687 rozeszła się po całych niemcach — 1716 roku w Szwecyi, 1722 w Szląsku 1770 w Hanowerskiem, Luneburgskiem i Luzacyi. —

Prawdziwe wszczęcie się téy choroby ieszcze nie iest dotąd roztrzygnięciem, iedni przypisują rzodkwi łopusze, (*raphanus raphanistrum*) którego nasienie wraz zżytem na mąkę zmielone do pieczenia chleba użytém było — drudzy znowu gangrenie żyta, wszelako zdaie się bydz rzetelnieyszą do téy choroby przyczyną szczególniey konstytucya por roku, co dociągłéy wilgoci; ulewów, niezdrowych pokarmów użycia, dla tego pospolicie w głodnych latach zwykła biednych napadać, kiedy majątni od niéy są wolnemi — Niekiedy ta choroba poiedynczo lrdzi napada iakoto: dzieci od 5go do 6go roku i daléy, a nawet i

dorostłych — Nadto: różni się ona od innych nerwowych chorób przez swą szczególną własność zrzadzania gryzien — Zdaie się bydz zaraźliwą, rażone nią dzieci, rażą drugie, dla tego wczesnie odosobnić ie potrzeba, przez co wstrzymuie się iey dalsze rozszerzanie. —

Leczenie, do którego znawcę wezwac prędko radzę, a co się dotyczy innego obchodzenia, to silnie skutknie, dostarczyć chorým zdrowych pokarmów, wyprowadzić ich z pomieszek wilgotnych, żeby w czasie wolnym od paroxyzmów świeżego używać mogli powietrza, przy ruchu ciała, a nadto: aby się często w wolnéy wodzie kąpali. —

### O tańcu Świętego Wita.

Choroba ta pospolicie iest młodemu wiekowi, począwszy od dziesiątego do szesnastego roku, więcéy dziewczętom iak chłopcom właściwa — Przedstawia się ona w szczególnych a nieustannych ruchach, do których bynajmniey niebywają zmuszonemi — Powszechnie te ruchy powstają w nogach, gdy te wnet rozszerzają się, wnet kości zbliżają, i zdaie się iakoby chorzy kul wieli, iakoż rażona od niéy noga włóczy się



a przytém spazmodycznie w rozmaity sposób ruszaną bywa, niektórzy znowu bez przestanku bić się w piersi zwykli, iakoż nieraz na piersi przykładac musiano podostatkim bibuły dla nieuszkodzenia sobie tych ciała części, a ta aż do miękkości zbitą została; i to jest prawie wstępem pierwszym do téj wswym gatunku strasznój choroby — W wyższym bowiem stopniu dostrzeżać się daie szczególna iednoznaczność umysłu, która się nawet widzieć daie w charakterystycznych minach twarzy, okazujących właśnie nieiako zmieszanie komicznotragiczne — Jak tylko napad iey przystępuje, iuz zatrzymanie tych wszystkich poruszeń przechodzi wszelkie usiłowanie, iakoż niebawnie przystępują nader szybkie obracania karku, rąk, nóg, co żaden z tancerzów najszykwiejszych nie jest w stanie ich naśladowac, a to bez najmniejszego szwanku — Równe i rękami czynią szczególne poruszenia, chcąc co pić lub łyżkę do ust zbliżać, iakoż prawą ręką prowadzą sposobem zadziwiającym, lub szklankę, nagle z nich wypijają, że nato zapatrując się, trudno się od śmiechu utrzymać, kto niezna charakteru téj choroby — Chorzy bywają przytomni, i zdaie się, iakoby sami znajdowali upo-

do-

dobania w tych ruchach, przypominają sobie takowe w wolnych od napadów chwilach, a nieraz ie przepowiadają — Napady te bywają po razy kilka na dzień, trwając po pół godziny lub dłużej. —

Leczenie téj choroby znawcy się tylko zostawia, a opis ten służy do poznania téj choroby, która początkowo niedaie się byc iak posmiewiska przyczyną, a wrzeczy saméj prędko iey zaradzić należy. —

### *O Apoplexyi i Paraliżu.*

Appoplexya bywa wieku dziecinnego śmiercią, dość często w następstwie poprzedniczych chorób przypada, wszelako nie należy do właściwój ich śmierci, iakoż raczój zwykła napadać w pewnym wieku osoby — Nie są iednak dzieci od niój wyjętami, iakoż nieraz przy wyrzynaniu się zębów, złe leczonych wyrzutach, zaziębieniach, bojaźni, i przełknięciu padają iey ofiarą — Ale ważna pomiędzy appoplexiami zachodzi różnica — Jedna z nich bywa krwistą, druga wodnistą czyli zimną, znanie obu jest potrzebne, ponieważ co przy pierwszój może ochronić od śmierci, toz sa-

Część II.      25



mo przy drugiey bywa bardzo szkodliwem.

Przy pierwszey to iest krwistey, twarz zwykle iest czerwona, nadętą, tętna, czyli naczynia krwiste mocno są krwią napelnione, puls bywa ieszcze dość silnym, a tknięci od nię padaią nagle.—

Wodnista znowu przedstawia twarz bladą, zapadłą, rżenie w pierśiach, krztuszenie, i wymioty nieraz wykły poprzedzać.—

#### *P o s t ę p o w a n i e —*

Wszystkie obciste suknie, podwiązania, opasania, iakoto: chustki, podwiązki i t. p. muszą bydź co prędzey rozpuszczonemi, unieść w górę ciało potrzeba, i na powietrze wynieść, wszelako zapobiegać, aby przeciągu nieurzadzało, dawać enemy z soli kuchenney, wody i oleiu co często powtarzać potrzeba, rozcierać nogi, ręce, przykładac zimną wodą na głowę zanim znawca przybedzie, piławki za uszami postawić, na łytki przykładac synapizma, które odmieniac wnet na tę lub ową nogę wypada, twarz często zimną wodą skrapiać. Ale przy tym appoplexyi gatunku wystrzegać się należy dawać do wą-

chania ulotne rzeczy np. Spiritus salis Ammoniaci, na iego mieyscu ocet tegi lepiey i bezpiecniey służy — W nagłym ratunku, ieżeliby znawca był odległym, i krwi upuszczenie może bydź przedsiębrane. —

W wodnistey znowu appoplexyi dawać takż enemy z odwaru ciemierzyc białey np. wziąć korzeni tych łotów dwa na pół kwarty wody, zagotowawszy razy kilka, przecedzić, i na dwie części rozdzieliwszy, po połowie co pół tory godziny, dawać — Synapizma i wizykatorye nawet do przykładania w mieysca wyżey wspomniane — Tu można do wachania daleko bezpiecniey dawać Spiritus salis ammoniaci, i inne nawet wódki, iakoto węgierską, Kolońską. —

Jak się tylko przełykanie dostrzeże, dawać ciepłą Herbatę, lub Miętkiew, Melissę do picia — Ledwie nie powszechnem następstwem appoplexyi bywa paraliż, któren napada iedną ciałą połowę, lub poiedyncze części, a nieraz w nocy przystępuje — Nacieranie gorczycą w occie moczoną, ieżeli latem bicia pokrzywą części ruszone, przykładac wizykatorye, synapizma na nie, wolne kąpiele czynić należy — Do wewnętrznego zaś użycia nadewszystko



dzielnie pomaga:— Wziąć kwiatu tranku górnego — (*Arnica Montana*) — Kwiātu kozłka korzenia pół uncyi, nalać wrzącej wody kwaterkę, moczyć w naczyniu przykrytém do zupełnego ostygnięcia, przecedzić, ośłodzić cukrem, miodem co się znajduie, dodać kropli białych (*Liquor Anodinus*) 40 kropli, zmieszać i dawać młodszym po pół, starszym po całęj łyżce od iedenia co dwie, trzy godziny, popić wodą — Ze ta choroba liczy się do długotrwałych, po braniu tego nalania przez tygodni dwa skutek wzmoćnić należy przez dodatek dziegłu pół uncyi, i tymże sposobem moczyć, a dawać, iak się podało — Z wielkim skutkiem służy Elektryzacya gdzie się znajduie do tego machina, nieradzę jednak bez przytomności i dorady znawcy mocne czynić uderzenia, lepięj i bezpieczniey, chociaż się dłużej ciągnie sposób ięj użycia, któren wsobie zawiera kąpiele tak zwane Elektryczne zacząwszy od kwadransa do pół godziny czasu, w dzień po razu, niekiedy dwa, wyciągnąć z ciała tu i owdzie, a nade wszystko z części paraliżem tkniętych iskry Elektryczne — Miałem ia liczne i naysłowniejsze tego sposobu Elektryzacyi skutki, ale potrzeba mieć podobnym cierpliwości, a im prędzęj się

do niego przystępie, tym też pośpieszniey i dzielniey pomaga. —

### O bólach Gardła.

Pod tym ogólnym wyrazem, rozmaitego części bolenia dość często a témbar dziey od nieznających się zwykliśmy nazywać — Położe naysczęstsze.

### P i e r w s z a B o l e ś ć.

#### Zapalenie Migdałków czyli Gruzołków.

Znamiona tego są: trudność w połykaniu, nieraz połączona z ciężkiém a do tego bolesnem tchnieniem, małe dzieci zaczynają i kaszlać, kiedy zaś co jedzą lub pią, nosem lub ustami powraca się, nieiako chrapowatość głosu, krzyczeń zwykły przy połykaniu, niezwyčajna czerwoność i nabieganie migdałków, a która nawet zwiększać się zwykła, że niemiała następie uduszenia obawa.

Przy tych znamionach twarz nawet bywa czerwoną, sinawą, nabiega szyja, wargi, z ust odpływa gęsty klę — Powszechnie napada ta słabość przy opisanych tu znamionach, dzieci różne



go wieku, mocne, tegie, krwiste doskonale żywione — Drugi znowu gatunek tegoż bolenia gardła jest z temiż samemi znamionami: przecie całą różnicę stanowi, że czerwoność migdałków chociaż przy ich obrzmieniu niebywa tak czerwonego koloru, ale raczéj bledsza, że twarz może bydź niż zwykle czerwienśza, daleko przecie mniej, iak przy powyższym gardła boleniu. — Oba te gatunki albo się zwykły rozchodzić, albolitéż i w ropienie przechodzić, przy czerwienśszym następuje tak rozeyscie się iako i ropienie daleko pospiesniéy, iak powoli przy drugéim gardła boleniu, to jest, gdzie się niedostrzega tak zbytecznéj czerwoności — Zwykły téż zapalenia i obrzmienia pękać i wydawać ropę, a gdy to nie następuje, otwieranie przez znawcę czynić wypada.

Z tych tu wychodów najlepszym jest rozeyscie się, a gdy téż wraz z obrzmiałością do piątego dnia nienastępuje przylgzać się zwykła silniejsza febra; gorączka, nawet i głowy ból przy konstytucjach zdrowych, mocnych, iak nieco łagodniejsza przy słabszych — Bardzo wątpliwie uważać należy, kiedy się obok tych cierpień wyżéj opisanych, nie można żadnego dostrzec obrzmienia,

czerwoności, wszelako tchnienie jest przytém zbyt krótkie, rzęzi wgardle, a przytem rozpalenie ciała bywa znaczne, iakoż w takim razie już w godzin parę śmierć zwykła przystępować, a znowu obrzmienie szyi, małe krwi z uosa przystępujące płynienia są dobrými oznakami. —

#### Stardnia około Chorego.

Tu potrzeba przywołać czémprędzey doskonałego znawcę, i wszystkich bezrozumnych rad zaniechać, temczasem domowego ratunku zaniedbywać nieradzę, a przeto dawać co 3. 4. godziny Enemki, których już w różnych miejscach pisma tego robienia podane są sposoby, do tych się odsyła; naprędce robić nóg moczenia co 4. godziny z gorzycą, solą, w usta brać często wolną parę wody, lub z dodatkiem do niej czwartéj części octu winnego — Kiedy ból bywa silnym, niepotrzeba do naparzeń brać octu, ale bżowego kwiatu w wodzie lub mleku gotowanego — Dorosli témże samém płókać mogą gardło, powierzchownie przykładając kataplazma z bułki, lnianego nasienia w Mleku, dodać nieco mydła, tłustości, lub téż z kaszy ięczmiennéj, co jest pod ręką,



albo téż i czynić okładania w odwarach bzowego kwiatu, rumianku, szaleiu razem robionego, przecie się ma rozumieć, że maczane w czworo złożone chusty dobrze wyzionąć, i wolno tylko na szyi przykładać, tak często, aby téż okładania na miejscu przyłożenia nie zaziębiały, co by mocno stan cierpienia pogorszyć mogło — jeżeliby mógł chory przy nieznacznej połykać trudności, osobliwie gdzie bywa twarz czerwona obrzmiała, dawać do picia sztuczne mleka, z banii, migdałów, ogórków nasion robione, — słowem sztuczne mleka służą tylko w pierwszych dniach napadań bolesnych, a dalej wolne już tu służą napoje, do czego użyć można kleiów z kaszów., bzowych ziólek, herbaty lekkiej — Nadewszystko wystrzegać się trzeba zaziębień, a na bliskie miejsca gardła przykładać Synapizma, dalej i wizykatorye, pierwsze radzę czynić, że nierównie pospieszniej drażnić zwykły, iak przyłożenie wizykatoryów, a gdyby nastąpiło przez się pęknięcie wrzódka, plókania z Szafwii czynić należy.

*Drugie bolenie Gardła Kataryczne.*

Obrzmienie wgardle nie jest tak czerwone anieraz i blade, ani téż bo-

leść tak dokuczająca. Febra przytomna jest tylko kataryczna z śapką połączona, iakoż chorzy zwykli przez nos gęgnąć. Niekiedy są i Migdałki wgardle, i slinne wustach nabrzmiące, a chory z samego początku dostaje suchego kaszlu. —

Wilgotne zatęchłe mieszkania, częste po upałach zimna, przystępujące odmiany, zaziębienia, picia zimnych napoiów po zagrzeniu się, są największymi przyczynami, a dzieci szczególniej podlegają temu gardła boleniu, którym utrzymywano za ciepło szyje, lub i ci, którzy za rozczulony odchód mieli.

To wszystko, co się przy zapaleniu zawałków wyżej podało, i iakie się tam obeyscie z chorym zalecało, zachować i przy tém gardła boleniu wypada, iakoż okładania z bzowego kwiatu, lnianego nasienia, kaszy ięczmienniej, bułki, co się z tych znajduie, w mleku gotowane około szyi czynić, naparzania nad parą wody z octem silnie pomagają. Szczególniej zaś utrzymywanie za gorąco chorego wizbach, okrycia głów ile możliwości wzbraniać, nie dawać żadnych mięsnych potraw, i całe obeyscie się przy kaszlach podane zachować radzę. Bywa dość często, że dzieci są skłonne do bólów gardła katarycznych, nie



doswiadczalém skuteczniejszego nad tu położony srodek, aby dzieci płókały sobie codziennie gardła zimną wodą, szyje nią obmywały, i nigdy szyi chustakmi za ciepło nieobwijały.—

### Trzeci gatunek bólów gardła zgniły.

Istotnie należy do klasy zgniłych feber, bywa epidemiczny, niegdys straszliwiey panował, iak w tych czasach zwykle na początku zimy zjawia się, ja przeciąg jego jest nader krótkim, niebezpieczeństwem grożący, pospoliciey napada wiek młody przed dojrzałością.— Zaczynają narzekać na ból w gardle, iakoż wtyle jego znayduie się czerwoność bardzo do róży podobna. Zawatki gardłowe oba lub ieden tylko ~~obu~~ nadto chorzy niemiłe mają czucie w ustach i nosie. Niebawem ukazują się białawe, popielato szarawe, w gardle plamki podobne do grzybków, o których wyżej mówiliśmy, te się wnet rozszerzają, a nawet ieden gruczołek lub oba zajmują, przechodząc szybko w gangrenę, technienie cuchnące do tego się przylacza, a wrzódeczki nieraz aż do gardła dochodzą. Febra przytym towarzysząca wraz z innemi znamiona-

mi, pod wieczór znacznieyszą bywa, polykanie przecie niebywa zbyt trudnem. Chorzy zwykli nabyć do snów skłonności, do zawrotów głowy, pokasliwaią, chrzypeią, kichaią, na palenie w gardle narzekaią, przystępuie krwi znosa płynienie. Ropa z otworzonych wrzodków wpada w grdyca i nieraz robi obawę uduszenia, iakoż iedne kaszle chorych dręczą, mianowicie usypiając. Dzieci porywaią się z pościółek, stoią niedługo na łóżeczku dla nabrania powietrza, wnet z siłek opadaią, staią się nader nudnemi, niespokojnemi, przebudzaią się z strasznem niby wyciem, głos staie się gwiżdżącym a do tego szybkiem, zwiększa się wgardle rżenie, twarz, szyja, piersi obrzmiewaią, czernieią, a napoie nosem powracaią, siły co raz opadaią, a śmierć powiększey części około dnia siódnego, a bez ratunku i trzeciego zabija. Wrzodki te w gardle są nader ziadliwe, a nawet i rażące, iakoż zdarzało się, ze osoby dotykaiące się ich palcem rażeno zostaty.—

### Przepowiedzenie.—

To bywać zwykło i trudne i wątpliwe, nie raz rodzice będąc spokojni, ze ich dziecię polykać może, a własnie



wnayniebezpieczniejszym stanie życia się znajduje. Wszelako mniej jest obawy, kiedy gonączka opuszcza, a przystępującobite wyrzucanie flegmy, lub kiedy wzrok niebrywa zmienianym, przeciwnie jest niedobrze, kiedy oczy tracą swe skłnienie, kiedy wyrzut ciemno niebieski kolor dostaje, a do tego nagle niknie kiedy krwiotoki i częste, a do tego mocne omglenia przystępują, a przy tych i biegunki, szczupły puls, siła utrata, omglenia, obrzmiałość i bledność prawie trupięcy twarzy, są to oznaki okazujące się śmierci.—

Chcąc ją od innych gardła boleści rozróżnić, nadewszystko uważać potrzeba na Epidemiczny charakter, na nagle przystępujące znamiona, na małe lub wcale nieuszkodzone polykania, na mairaczenia iuz w piewszych dniach téy choroby przystępujące, na różowy, po ciele wyrzut. Wszystkie tu ~~umieszczane~~ znamiona że równie śmierć iak ocalenie życia zawisły iedynie od rady dobrego lekarza, którego staraniu oddać chorego wypada, co można przed iego przybyciem uczynić iest: płókać usta mocnym odwarem z Szalwii octem i miodem zaprawnym, ieba chorego niemoże bydz ani za goraco ani za zimno utrzymywana, często do nię świeże wpuszczać powietrze, podłogę

octem winnym, lub wódką kamforową skrapiać, toż czynić i z poscielą.—

Nie wprzód dawać iesc, pić, dopokąd pierwey usta wodą z octem lub odwarem ozanki czosnaku (*scordium*) tęgim, do którego także dodać można czwartą część octu winnego, lub téż zrobić odwar wnastępujący sposób: wziąć po garstce ozanki czosnaku tyleż kory zwierby łoziny, gotować wpółkwarcie wody, do zostania się kwaterki, przecezić i dodać powyższą ilość octu, lub gdzie mieć można spirytusu siarczanego lub soli kuchenney (*acidum Sulphuricum dilutum v, audum Mariaticum*) do kwaskowatości, i tym nietylko przed użyciem napoiów i pokarmów, ale nawet i dość często przez dzień, zdadni płókać mają gardło; dzieciom zaś małym smarować te miejsca, takóž często przez dzień wziąwszy, na ten zamiar miodku rozowego np. pół uncyi, boraxu Wenneckiego, na proszek ntartego ziarek 15 wodą nawilgociwszy tenze z miodkiem zmieszać, ale po każdém smarowaniu piórko lub pędzlik należy dobrze wodą opłókać, aby zanieczyszczone od smrodliwéy ropy nieraziły miodku do smarowania dalszego użyć się mającego. Co do płókań powyższych, te są nieodbicie potrzebne, aby przez nie ile



bydź może splókiwać ową ropę; która zmieszawszy się z napojami lub pokarmami wiele pierwiastków mocno szkodzących do żołądka sprowadza, przez co stan febry, a zatym i niebezpieczny życia bez najmniejszego powątpiewania zrzucić może. —

Byłoby bardzo użyteczną rzeczą, aby małe dzieci wczesnie do wypluciów wzwyczaić, wszakże oprócz wypać mogącej potrzeby, iakię tu przykład mamy, jest jeszcze z innego względu pożyteczne, doliczając sprawiedliwie do innych ciała odchodów i wyplucia, z którymi równie nieużyteczne ciepłości wyprowadzać się zwykły, nie mówi się tu o pluciu przyzwyczajonem, mianowiciey po iedzeniach, lub przy nich, to bydź może szkodliwe ato z powodu że slina znacznie się do rozmiękczań rozrzedzeń potraw, a zatym i do ułatwienia ich strawności przykładą, a użycie iey dość często obok posilających silnie ciało pokarmów, przecie zwolna zwykło ubywać, a nawet i usychać. A że ten gardła bólu gatunek, iak się na początku nadmienilo, spieszego ratunku wymaga, ile że się mówiło, iak jest zdradliwym, co poznać można ze znamion wyżey umieszczonych, zanim przybędzie znawca, dawać następujący

odwar radzę, wziąć Chiny grubo przetłuczoney np. pół uncyi, wody kwaterkę, zagotować mocno razy kilka, przecedzić, osłodzić i do miłej kwaskowatości dodawać kroplami wyżey położonych przy plókaniu kwasów, ztego dawać często po pół łyżki młodszym, starszym po całey co dwie godziny, i popijać iakim kwaskowey natury napojem np. kwasnicy sokiem, lub suszoney odwarem, wodę zoctem, agdzie można i winem francuzkiem, dolawszy go do limoniady. — W tę to chorobę rosół także powinny bydź kwaskowatemi rzeczami zaprawione, np. cytrynowym bórakowym, zaczynianym. Gdzieby niebyło chiny, lub też i do nię znieumatym użytkiem dodać można kozłku korzonków pół uncyi, a za nim się odwar z chiny przecedzi, wsypać doniego, przykryć naczynie, aby w niem mokły korzonki do zastygnięcia i razem przecedzić, postąpić sobie z dawaniem iego iak się iuż powiedziało, można też robić nalania, do którego wziąć pomierną ilość kozłku i takąż dzięglu, równie moczyć w kwaterce wrzący wody pod przykryciem do zastygnięcia, a po przecedzeniu użyć tymże iak się wyżey mówiło sposobem. Dzielnie także słyży całego ciała wódkę kamforową



zwolnioną obmywania, trzy lub cztery razy na dzień, i w tym gatunku czystość okło chorego we wszystkiem niedość do-  
chowować zalecam. —

*O Zapaleniu Krtani i Kanału  
powietrznego krupem  
zwanego. —*

Przestroga. Choroba ta jest nader niebezpieczna dość częstą i zabiegającą, obok wszelkich reszty ciała zdrowości warunków — Nie czyniąc rostopnych zabiegów przed dniem trzecim, późnię nieco nadaremny zwykł stać się ratunek, chociażby ten był i naydzielniejszy.

Znamiona są następujące. Dzieci powszechnie tracą swą żywość, wesołość, stają się smutnemi, ociężałemi, i doznają mocnych ciała rozpaleń, ięzyk miewają białym mułem zanieczyszczony. Do tego powolny z początku, wszelako zwiększający się, iakoby wyjący kaszel, mający do katarycznego coś podobieństwa — Wnet zaczynają narzekać na ukłucia w kanale powietrznym, albo tępe albo kłujące, powierzchownie zaś dość często dać się dostrzegać obrzmienie w miejscach gdzie te bóle czują, a nieraz za dotknięciem się tegoż miejsca ból

czu-

czują, nieraz znowu wcale nie zniego — Wgardle nie dostrzedz niemożna — Niektórzy doznają dokuczającego bólu obracając głowę, nabrzmiewa twarz i czerwienie, chrapliwość się powiększa, a przy kaszlu dostają dzieci i gwizdzącego tonu, niektórych znowu bywa głos do piania koguta, lub szczekającego psa podobny, obrzmiewają tętna szyi — dostają chorzy nieraz mocnego pragnienia, stają się ospali, w dzień na bóle głowy narzekają, iakotęż i palenie gorące. Technienie coraz bywa trudniejsze, a nie raz uduszeniem zagrożające, niektórzy womituja, wyrzucając znaczną ślęgę, nieraz odchodzą kawałki urobionéy szybko błony, zlimfy plustyczney, która zwykła scieśniać krtani powietrzną, iego odnogi po pęcherkach płuc rochodzące się, a zkaż teź bierze nazwisko, krup krtani, kanału powietrznego, iego odnogów, wszelako wleczeniu żadney niemające różnicy, znowu przy wymiotach niektórych nie odchodzi, zwykły nieraz obrzmiewać ręce nogi. —

Choroba ta, szybkim do niebezpieczeństwa krokiem postępuje, a tęschności, obawa uduszenia, zkażdem prawie oka mrugnięciem powiększają się, Ustawia zwykły kaszel, przy czém iednak po-

Część II.

24



łykanie nie bywa uszkodzonem, niekiedy dostrzegać się dają niestanne kurzowieruchy muszkułów kości ięzyczkowych, oczy zwykły zapadać, wargi zaś brunatno czerwienieją, pot zimny twarz zlewa, chory albo powoli, albo pospieszniej przy konwulsiach kończy scenę życia. —

Blony te fałszywe po szybkim zapaleniu krtani, kanału powietrznego, iego odnog zlimty urobione, nie raz przez mocny kaszel kawałkami są wyrzucanemi, ale reszta ięć lub też i całą po śmierci znaydowano i w krtani w kanale powietrznym i w ięć nawet odnogach, iako z tęć własności otrzymała nazwisko zapalenie gardła *krtani Blonistęć*. Niekiedy razem opuszczać zwykły tu nadmienione zjawiska, iakoż i technienie wolne przystępuje, dzieci mogą złóżeńcek powstawać, a nawet i chodzić, tak że niewiadomi karmią się nadzieją poprawy, lecz iest ona nader mylną, nagle przystępuje nowy napad, i nieraz przy zabawkach, lub braniu pokarmów padają dzieci śmierci ofiarą, zwyyczajnie ta następuje 2. 3. 5. 7. dnia, a co nader rzadkim przypadkiem po 15. lub 17. dniu, i wtenczas może tylko mieć swe siedlisko w samych gałęziach czyli odnogach kanału powie-

trznego, a nieraz też iuż pierwszy napad bywa śmiertelnym, na nieszczęście nie zwykła iak nader rzadko opuszczać zupełną aż do śmierci przytomność. —

Cały przebieg choroby, iężeli bywa szczęśliwym, powszechnie trwać zwykły od 14 dni do 21. ale w tym czasie niewiele się spuszczać wypada na momentalne cierpienie zwolnienie, takowe nieraz są posłankami tuż następującej śmierci, ogólnie wzięwszy wszystko, wspiera się na sposobie oddychania, czyli też bywa łatwiejsze, trudniejsze lub nader uszkodzone. Zwykła się iednak pomyślnie ukończać, kiedy podostatkiem wyrzutów gęstęć flegmy z krwią nieco zmieszanych następuje, kiedy obfity pól na całym ciełe przystępuje, lub uryna takóż w znacznęć ilości pozagranice ciała odpływa, ale znowu złym bywa znakiem, kiedy na dnie naczynia uryna bywa ropistęć natury, co iest oznakiem że wczęści zapalenie powyżęć wzmiankowanych organów przeszło w ropienie. —

Przymioty tęć choroby są, gwiżdżące, szczekliwe niby echo, przy kaszlu i oddychaniu, nieuszkodzone w niczém póty, oddychanie, i zupełna zmysłów przytomność, iakoż raz tylko słysząc ten



ton głosu jest dostateczny do rozróżnienia.—

Panować zwykła w bagnistych położeniach, zimnych kraiach, nad brzegami morza, a nawet i Epidemicznie, szczególnież zaś na wiosnę i w zimie, a nader rzadko od niej po 12 latach napastowani bywają, zostawiona zaś sobie bez dzielnej pomocy ledwie nie zawsze jest śmiertelną.—

Bliskie odkrycia nad tą chorobą, sposoby jej zaradzenia, że już staie się bydl mnię obawiającą, aby tylko wcześniej takowe rozpocząc, należy istotnie naszym czasom.

Dodać tu muszę że Lentin dostrzegał tej choroby najwięcej udzieci, którym, naśladowując płochą modę wkażdę porze roku, dozwolono chodzić z odkrytą szyją i piersiami.

### *O b e y ś c i e s i ę.*

To zupełnie odpowiada kaszlowi Koklusz, o którym mówiliśmy wyżej, wteyże częstce, przy materjach kaszlu i jego różnicach. Ma też choroba również i trzy periody czyli podziały iak koklusz.

Pierwszy z nich zawiera w sobie pospieszne nader krtani, szpary głosow-

wę, kanału powietrznego, i jego nawet gałązkowatości zapalenie, szybkie w wyborze leków zawarte stanu tego czyli wstępnego peryodu usmierzenie i zupełne zniesienie, iako pokładające niejako tamę następny dwom periodom, naydzielnię zabezpiecza życie chorujących.

Drugi period jest ciągiem pierwszego, w którym silniejsza febra, gorączka, a nawet i wzmaganie się, znamion czyli symptomów, na wstępie tej materji umieszczonych, przedstawia w nim to że już się oddzielnie zaczyna limfy, zktóre się utwarza błona, zatykająca i wzęzająca otwory organów wyżej wspomnianych. Trzeci i ostatni Period jest skutkiem poprzedniczych, iakoż, jeżeli się spóźniło w dwóch poprzedniczych peryodach leczenie, lub jeżeli było nie stosowne, iak mały dzielnosci srodków użycie; ponawia się spieszenie ze krwi wydzielenie limfy, zktóre się utwarza się owa obca błona, w takim więc peryodzie dwóch wypadków oczekiwać należy, albo rozpędzenia oney błony, (jeżeli się to udać może) lub uduszenia.—

### *Z a p a l e n i e.*

W pierwszym Peryodzie usmierzaających srodków, iako i wzruszenia febry.



czne zmniejszających użyć należy, temi są: mleka sztuczne z migdałów, bani, ogórkow, nasion, robić, tych za napój starszym, lub połyżce od iedzenia małym częścicy do zakrapiania się; dawać do tego proszki: wziąć węglanu ammonij zoleiem przepalonym iedno zarko dla rocznego dziecięcia, a dwa ziarka dla dwu i trzech letniego, i tak w postępie lat dawać do téy ilości na kaźden rok pół ziarka, kamfory zaś od cwierci ziarka, dla rocznego do dwóch lat, a od dwóch do 3. 4. letniego po pół ziarka, dla starszych i do całego, napasrtnicy zaś czer, wonéy proszku (*Digitalis purpurea*) od ósméy części do czwartéy części, a dla trzech czteroletnich i starszych pół ziarka, cukru ziarek 10, zmieszać to wszystko na proszek do dania na raz, albo w powyższych mlekach zmieszawszy dobrze włyżce, popić niemi, lub w wodzie osłodzoney, mleku zwierzęcem, i takóź niemi popić. Proszki te co godzin dwie lub półtory dawać, aże napasrtnice pomiędzy prawie wszystkie leki febryczne wzruszenia usmierza, na stan zatym tych wzruszeń, to iest iaśnieiy mówiąc, od tego iak febra, gorączka przy użyciu tych proszków zmniejsza się lub nie, dawanie częstsze lub rzadsze tych proszków, zawisło. Naparzania i poly-

kania pary zwody i octu dobrze zagrza-nych, lub pary z kaszy ięczmiennéy, te środki wiele się przyczyniają do złagodzenia siłności napadów kaszlu. Dawanie Enemkow 2 lub 3 razy na dzień z rumiankowego odwaru, soli oleiu masła, przyklada się do spływu ciepłosci w te części. Na tenże zamiar służą przykładania synapizmów, albo na pier-siach lub na saméy krtani pomiędzy łopatkami, ze téż prędzey drażnią miejscowo niżéy przykładania wizykatoryów, które dopiero w godzin 6. 8. lub późniéy swoy skutek zwykły sprawować, gdy wtymże samym czasie można na odmianę zwielkim skutkiem przykladać synapizma na przemian, na łytki obydwie.

Do tego samego zamiaru, toiest: odciagnienia ciepłosci ku częściom dolnym służą i nóg moczenia dla starszych, do wody dodając soli kuchennéy i gorczy-cy całéy, po lyżce 1 2, i takowe co trzy lub cztery godziny powtarzać, młodsze zaś dzieci bawiąc, aby wtey wodzie nogi choć pół godziny moczyły. Ostatnim zaś dzieciom, niemogącym tak często i tak długo nóg moczyć, okładania zteyże wody nówek aż do kolan, lub odwar rumianku do połowy z octém winnym zmieszany przykladać, a nawet i



na sam żywot, ale to nader często od-  
mieniac, należy, aby na tych częściach  
platy wełniane lub płócienne, dobrze  
wyzionięte nie zastygały, z niemalym sku-  
tkiem użyteczne bydź mogą i kąpielki  
ciepłe, te po razy 2. 3. dniem powta-  
rzać. Równie spieszyć należy zprzy-  
stawianiem Piiawek na krtani, roczne-  
mu np. po każdéj stronie iedną do  
dwóch, starszym, dobrze żywionym,  
przy których do tego okazuje się twarz  
czerwoną, obrzmiała, oczy iakoby z ko-  
lei swojej występujące, slihnące, technie-  
nie duszące prawie, oprócz piiawek, któ-  
rych liczbę co do wieku i tu wymienio-  
nego stanu dziecięcia powiększyć, po-  
wtóżyć wnet koło krtani zauszami,  
pod oboyczkami, nietamując bynaj-  
mniéj krwi odpływu po ich skóry prze-  
kaszaniu, iowsem często należy te miey-  
sca maczaną w wolney wodzie gąbką, lub  
wzastępstwie iéy skubankami w kłębek  
zwinietymi przecierać, dzieciom zaś do  
trzech do czterech i daléj lat, u których  
zwłaszcza pełność krwi a nadewszystko  
nagromadzenie się iéy do głowy przez  
obrzmiałość twarzy, czerwoność, oczy  
lśniące daie się poznawać, można na  
pół do całéy filiżanki krwi upuścić, cze-  
go iednak bez przytomności i rady zna-  
wcy czynićby nienależało, (wyiawszy

gdyby tego na prędce i wbliskości zna-  
leźć nie można było.)

W drugim znowu peryodzie téy  
choroby, a któren dość często w godzin  
24 30. do 40 zwykł już przystępować,  
ten się znowu z powiększonéj febry,  
gorączki, duszenia poznaje. Przystąpić  
co prędzey należy, do wcierania  
maści merkuryalnéj (*unguent: de Hy-  
drargirio Cinereum*) np. dr. 2 kamfory  
ziarek 10 itę zmięszaną okolicę krtani co  
trzy godzin naciezać, a dla przyspieszenia  
skutku, rozrzedzenia, zgęsnąć i przeisto-  
czyć się mogącą limfę w błonkę białawą,  
można także wdziaśla, wcałe wydrąże-  
nie ust co 4 godziny wcierać następują-  
cy proszek. Wziąć solanu żywego sre-  
bra łagodnego (*Hidrargirium Muriati-  
cum mite*) pół drachmy, cukru półto-  
ry drachmy, zmięszać startszy na pro-  
szek, usliniwszy palec umaczać w nim  
brzuść iego, i wcierać 3. do 4. razy  
dniem dziaśla, podniebienie około mig-  
dałków.

Te wcieranie maścią lub proszkiem  
tak często czynić potrzeba, pokąd się  
sliwienie znaczniejsze duszenie zwol-  
nione, zakazliwanie wolniejsze, i da-  
leko łatwiejsze flegmy wyrzucenie nie-  
przedstawia poczem poprzestać ich w  
miarę ppolepszeń wypada, a gdyby iesz-



cze użycia tych wcierañ wypadła potrzeba, *np.* ieszcze duszenie lubo zwolnione iako i slegmy niedość takóž udrzucanie trwało, choć po razy dwa na dzień, to jest zrana i pod noc czynić wypada.—

Tu bardzo dobrze służyć i lekkie wymioty; na ten znowu zamiar dawać naprzemian z powyższemi proszkami: *np.* pomiędzy ich dwóch zażyciami proszek z ipekakuany dla rocznego dziecięcia z ziarka, dla dwuletniego 3. do 4. i w takim postępie lat na każdy rok, po dwa ziarką dodawać. Nie masz żadnéj obawy, chociażby wymiotów kilka nastąpić miały, wszakże małe siłek osłabienie nastąpić mogące, posiłkami z kleiu, rosółu cielęcego lub z kury, na pół zmięszane często udzielane takowe podnosi. Takóž nie zapominać o częstym, wolnym kleistey natury napoju, i tego we wszystkich trzech téj choroby stanowiskach obficie używać, na ten zamiar służyć kleie z kaszów ięczmienney, perłowey, owsianney, słazu korzeni swoyskiego lub włoskiego, przecie niezbyt gęste, niewiele dawać rosółów, osobliwie zwołowego mięsa, lepiej tu służyć z cielęciny, drobiu białego mięsa, ale i te niepowinny bydź tłuste, a tym szokdliwiéy korzenne, solone. Zaraz po wymiotach, ieżeli by duszenie trwać miało, przyto-

żyć wżykatoryą na kark, a nawet i na samych piersiach, lecz po ich zdjęciu niezagaiać, i owszém ropienie ich co tylko bydź może utrzymywać, opatruiąc te miejsca przykładaniem masei, którą można i w domu zrobić, nasmarowawszy masłem niesolonem płótno w wielkości, wiakiéy była wżykatorya, posypać go zwierzechu następującym proszkiem; wziąć much Hiszpańskich *np.* ziarek 15 cukru ćwierć łota, zetrzyć, i na ten zamiar przeznaczyć, opatruiąc co rano i pod wieczór, i gdyby iednak ropienie obfite nastąpić miało, poprzestać posypowanie proszków na dzień dwa, i znowu na też miejsca dla zdraznienia ich przykładając masło posypać, pokąd uduszenia, gwiżdżenia nie zwolnieją.—

Też same srodki są do użycia i w drugiem téj choroby stanowisku, a im one w pierwszym regularnie dawane były, zwykt i drugi period bywać mniéy niebezpiecznym, lecz gdyby się wleczeniu nieco opóźniło, w tenczas częsciéy daleko dawać proszki, a nawet i z dodatkiem do każdego co do wleku od  $\frac{1}{2}$  ziarka dla rocznego i dwuletniego, a dla trzech letniego do pół ziarka siarki z antymonij złotey (*sulphur Antimonij auratum*) dla 4. 5cioletniego i dalej do



całego ziarka; jeżeli wymiotów nie sprawia, wtenczas należy zmniejszyć dawkę tejże siarki do połowy. Zbliżający się szczęśliwie drugi period, ku trzeciemu zwykły okazywać daleko większe zmniejszenie wduszeniach, samego kaszlu srogości, a nawet i nie tak często, który przecie zwykły nieraz przybierać napadów co drugi dzień, gdy pierwszy dzień bywa łagodniejszy, lecz oprócz tego flegma, łatwiejszą w poruszeniu staie się, dla iey więc rozrzedzenia służy dawanie niżej podanego odwaru daleko częściej, rzadziej zaś zwyż namienionych proszków, z dodatkiem lub też i bez siarki z antimonium, iako też i umniejszeniem dozy kamfory, węglanu ammonii z oleiem przepalonym i w ten czas dosyć jest po dwa proszki, to jest rano i pod noc używać, gdy odwaru co półtory lub trzy godziny, młodszym po łyżeczce od kawy starszym po dwa a jeszcze starszym np. od 4 do 6. lat po pełnej łyżce od iedzenia dając, popić kleiowemi napojami, o których się przy tej materii wyżej mówiło — Odwar ten jest następujący: wziąć kwiatu górnego tranku (*Flores arnicae Montanae*) np. dr. 2 lub korzenia indyckiki Wirginiiańskiéy (*rad: senecae*) tąż samą ilość zagotować razy kilka w

kwaterce wody, przecedzić, osłodzić cukrem, dodać spirytusu (*salis armoniaci anisati*) pół drachmy, uzytek tego odwaru jest już wyżej podanym.

Zdarza się nieraz, że wtém choroby stanowisku ieszcze się nieco zaduszenie utrzyma; wtenczas niezawadzi dać na lekkie wymioty, iak się nadmienilo, przez te wymioty odchodzą czasem kawałki mniejsze lub większe owéy błony uwarzaiący się z Limty.

Po uleczeniu tych trzech przedziałów, im cięższy kaszel, i duszenia trwały, zwykły płuca zostawać w znacznym osłabieniu, nie należy zatem o ich wzmocnieniu, równie iako i całego ciała przepomnieć; na ten zamiar, służy dobrze odwar krzyzownicy gorzkiey (*poligala amara*) do czego przybrać można porostu Islandzkiego np. każdego po trzy drachmy do pół uncyi, zagotować z kwaterką wody razy kilka, a po przecedzeniu osłodziwszy dawać 4. razy na dzień, młodszym po pół łyżki starszym po całej, a ieszcze starszym po dwie naraz, i przytym dwie trzy do czterech niedziel zostawać.—

W poprzedzających dwóch choroby tej przedziałkach, należy takż być bacznym na dyetę, niedawać zatym pokraw twardszych do strawienia, iowszem



nayłatwiejszych; tu służą rosóły dla słabszey konstytucyi, ślegmistey wołowe, aby tylko nietłuste, niekorzennie i niesłone, dla dobrze żywionych, krwistych rosóły z drobiu, mleczywa z białym chlebem, kasze, perłowa, owsianna, igczmien-na, Ryż w mleku gotowane, iaja miękie świeże. Przychodzącym zaś do zdrowia, chociaż mogą być twardsze potrawy do używania dozwolone, wszelakoż przynależną co do ilości ostrożnością, a nawieczór i tych niedawać jak lekkie potrawy. Dotego ieszcze nie zapomnieć o używaniu świeżego powietrza wczasach pogodnych, miernie utemperowanych, a nigdy po zachodzie słońca, nienależy także chorych trzymać wrogrzewających pościelach, osobliwie przy gorączkach, w izbach zagorących, i takowe w porach przykrych świeżem powietrzem napuszcząć.—

W celu zapobiegania téy chorobie, nieraz epidemicznie panującéy, naylepiej służy odchów do postępu lub konstytucyi zastosowany, a że o tém wszystkiem już się wcześci pierwszey a częściej trzeciéy obszernie ku temu podały warunki, do niéy więc się odwołuie, wszelako ostrzegam, ieżeliby w tymże odchowcie niebyły dopełnianemi, aby powoli do obmywania szyi gardła bar-

dzo często, poczawszy od wolnéy wody aż do nayzimniejszych przyzwyczaić, i tak ciągle utrzymywać, ale oprócz tego dzielnie zapobiegającego srodku, niedozwalać w mrozy tęgic, mgliste czasy, dżdzyte, wietrzne, zgółemni szyjami, obnażonemi piersiami wychodzić, i téż ostrożność zachować, aby dzieciom starszym wychodu w te pory z łozeczek lub ciepłych pomieszek niedozwalać, iak ich téż doobwiić szyi grubych przez kilka chustek podług ziawionéy niezbyt dawno mody nie przyzwyczaić, bydz może, że i to nieraz stało się przyczyną do téy choroby i śmierci.

Obok tych przestróg zdarzać się mogą wypadki, że choroba ta z dyspozycyi powietrza, lub zaziębienia niebacznego części od niéy napastuiących powstaie, a wprawdzie nieraz pod maską katarycznego kaszlu i febry przynim tegoż nazwiska towarzyszącéy, i chociaż ten kaszel, o którym tu się mówi, różni się od pierwszego przez znamiona głosu, nie zawodzi i owszém silnie dopomoże, dać lekki wymiot z ipekakuany w sposobie i dozie już tyle razy powtarzanych, zaraz udać się do nożek moczenia, lekkie póty sprawuiących rzeczy, iako to spać idąc pić kwiat bżowy ciepło, od użytku mięs zachować dzieci



osobliwie krwistey konstytucyi, słowem to wszystko, co się wyżej mówiło, ściśle dochować, a w przypadku samego napadu postąpić sobie zaraz wraz należy podług tu podanego periodów opisu.—

### O Gardlicy Kurczowéy

(*Asthma acutum periodicum*  
*Millari.*)

**Przestroga.** Jak się tużey podane przedstawia znamiona, potrzeba skutecznie a dotego i szybko postępować, opóźnienie czego w trzech dniach śmierć sprowadza. Kaszle nagle ciężkie, mocne, a do tego trudne oddychanie już daje gardlicę poznawać.—

Choroba ta nagle zwykła powstawać, iakoż dzieci, które niedawno były czerstwemi, zdrowemi wesołemi, w dzień lub w nocy nagłego zaduszenia doznają, a przełknięte unosić się w górę zwykły, twarze ich stają się brunatno czerwone, obrzmiałe, a tchnienia aż do uduszenia obawy, zchrapiiwością i nieiako szelestem odbywają się, właśnie iakoby drugie pół tchnienie, nastąpić miało, a które dość głośne w odległości nawet słyszeć się dać. Nader rzad.

rzadko bywa przy téy chorobie przytomnym kaszel, a przynajmniej nieznaczny, jeżeli nie przystępują wymioty lub kaszel, kichanie, umiera dziecię sposobem zupełnego uduszenia.

Wszystkie te symptomy napadać zwykły od czasu do czasu, wstrzymanie stolca i wiatrów zwykło się przyłączać. W czasie wolnym od napadów czyli paroxyzmów dzieci bywają osłabione, szczególnie boiazliwe, nader obojętne i ciche a małe zbyt dzieci niespokojne, łatwe do przełknięć, i częściej płaczą iak zwykle: Te znamiona choroby, o której mówimy, są charakterystyczne, a nieraz przyłączają się i kurczowe cierpienia.—

Jeżeli przytych okolicznościach na predce niedaemy skuteczney pomocy, napady iey przystępują silnieysze; a nadto i dość szybko iedne po drugich, iakoż zaduszenie daleko mocnieysze, dające się słyszeć i chrapliwe, za każdym tchnieniem unoszą nawet łopatki, a mocne konwulsye, lub inne nerwowe wzruszenia, życie zakończają zwykły, lub na całe życie ciężkie krótkie tchnienie pozostaje — Choroba ta dość często bywa wypadkiem zaziębnienia odry, szkarlatyny, lub téż bez tego towarzyszy tym wyrzutom.



## D o s t r z e ż e n i a.

Trudno jest Millarego (Nazwisko to prowadzi od pierwszego autora, którem ją tak, najlepiej w swych znamionach opisał) kurczową gardlicę od prawdziwego krtani zapalenia jako od zwykłego duszenia (*asthma*) rozróżnić, a jednak na tem bórów tych spoczywa ratunek życia z powodu, że obie te choroby wcale innego leczenia wymagają, dla uniknienia więc błędu nayszkodliwiej wypaść mogącego, czyliż to względu uważania na przypadłość, aby takowe odpowiedzieć można Lekarzowi, czyli też i na prędkę przed jego przybyciem zaradzić — choroby téj znamiona opiszę, z tych jest. —

- a) Ze głos kaszlu przy gardlicy kurczowój bywa jakoby dęty, i jest nieiako do szczeku psa podobnym, gdy przeciwnie przy zapaleniu krtani delikatny, dyszkantowy, piejący jak u koguta. —
- b) Przy zaduszeniu (*asthma*) albo nie masz żadnego prawie kaszlu, lub bardzo mały, przeciwnie przy zapaleniu kanału powietrznego wiele kaszlu. —
- c) Ze przy zapaleniu kanału tegoż znajduje się zupełna przerwa, gdy

przy gardlicy kurczowój, chociaż i przy przerwie, przecie chorzy zostają osłabieni. —

- d) Ze kurczowa gardlica Millarego nigdy Epidemic: nie panuje jak panuje zapalenie kanału powietrznego. —

Opisana tu gardlica napada dzieci od roku życia pierwszego aż do 13go nader rzadko przy piersiach będące, i starsze, takoz panuje w wilgotnych położeniach, takowychże pomieszkaniach, i przy biednym pokarmie, a kiedy połykanie bywa już zatrudne, wzrok słaby, niedieskawa twarz, już są bliskiej śmierci posilkami — Utrzymanie w téj chorobie jest zgodne z podanym już przy kokluszu, i tu także służą ciepłe kąpiele po razy kilka na dzień powtarzane, leczenie zaś następującymi środkami bywa dość pomyślne np. wziąć pieprzu ziarek 4 do 6. proszku ipekakuany na dwuletnie dziecko z cukrem do upodobania wziętego zetrzyć, dodać unciów cztery wody przekroplané z Melisy, lub nalania iey, albo kozłka korzenia wzięwszy drachmów 2 3 do pulkwatki wody wrzącej, i zrobić nalanie jak się już tyle razy powiedziało, rozcieku burztynianu amonii (*Liquor amonii Succinatus*) 30. do 40 kropel, zmieszać i toż czynić przy każdym dawanu, które sto-



sować się ma do wieku *np.* po łyżeczce od kawy rocznemu, dwuletniemu po pare, i tak dalej, aż do pełnej łyżki od iedenia, co półtorej godziny do dwóch, enemy z czarciego łajna (*assafetida*) 3 do 4. na dzień dawać, te robić następującym sposobem, wziąć kózku korzeni puł uncyi, nalać kwaterkę wody wrzącej, moczyć pod przykrytym naczyniem przez pół godziny, przecedzić i w tém moczeniu rozpuścić trą w miedzianu (*czarciego łajna drachme 1.*) Takową dozę podzieliwszy na 3 części do 4. przez dzień na ten zamiar wypotrzebować.—

*O katarze duszącym.—*

*(Catarus Suffocativus.)*

Napadać zwykły najczęściej dzieci pełne soków, dobrze żywione, i u których w piersiach znaczne załegmienie się znajduje.— Napady tego zaduszającego kataru przystępować zwykły nagle, a dzieci znajdują się w wielkiem niebezpieczeństwie, iakoż technienie zupełnie wstrzymanem bywa, twarz ich sinieie, a ręce i nogi ziębną, nieraz ten przypadek daie się dostrzegać już u dzieci przy piersiach znajdujących się, i w okresie

wyrzynania się zębów — nader szybko przedsięwziąć wypada ratunek dla obawy przystępujących konwulsji, przy których i śmierć nastąpić może, a nieraz na pozor zdrowe i czerstwe dzieci już w czasie półgodziny padać zwykły przez niego śmierci ofiarą.—

*L e c z e n i e. —*

Dostrzegłszy ten nieszczęśliwy napad, co prędzej palec w ustka ku gardzieli włożywszy, ile możności zflegmy uwolnić, lub też i piorkiem wprzód, techtawszy dla wzbudzenia wymiotów, przez któreby ile można zgromadzona flegma mogła być wyrzuconą — co prędzej dawać im po małej łyżeczce miodku z cybuli morskiej, do picia zaś dziewanę, rumianek, lub herbatę, do której dodać można winą Emetycznego po kropli 5. do 10 do każdej łyżeczki, co czynić pokąd wymioty nienastąpią — Na tenże sam zamiar użyć można i następującego szrodku, wziąć Emetyku 1. 2 ziarka rozpuścić w 4, do 6 łyżkach wody letniej, ostodziwszy, dawać małym dzieciom co cwierć godziny po małej od kawy łyżeczce na raz do wzbudzenia wymiotów, a tych gdy nastąpi dwa lub trzy dawania tego poprzestać,



a resztę na ustronku zachować do dalszego użytku, gdyby jeszcze wypadła dawania potrzeba — Starsze zaś dzieci do lat 4 i dalej dostają po dwie łyżek, takóŜ co ćwierć godziny pokąd wymiotów kilka nie nastąpi, ale nie trzeba tymŜe dzieciom wprzód pić za wiele, dopiero przy nastąpionych wymiotach albo wodę letnią nieco osłodzoną, herbatę, lub rumianek, a to dla łatwiejszego zrzucenia, które przyspieszyć można po picciu nacieraiać dłonią lekko zywót i dołek około serca — Daie jednak i w tak gwałtownym co do użytku wymioty sprawuiących leków nie małej przestrogi uwagę, aby dzieciom z kilką zdawaniem na wymioty niebyć choy-nym, i tylko w takim razie, iaki tu wypada, wszelako pierwéy, zneyduiać się kilką paskiem opatrzyć wypada — Przy tém dawać często enemki *np.* co dwie trzy godziny z młeka, cukru, lub miodu, i w pomoc przybrać ciepłe kąpiele, ale to wszystko pospiesznie czynić należy, a tém pospieszniey i w ciepleyszą wodę wsadzać dzieci w przypadku, gdyby tenŜe zaduszaiać katar miał nastąpić przez wstąpienie odry, szkarlatyny, lub wcale ospy ludzkiey. —

Na ukonczenie téy materyi pona-wiam różnicę, ze tenŜe katar zaduszaia-

cy różni się od gardlicy Miliarego wy-żey opisanego, iedynie przez szczegó-lny głos w kaszłaniu —

*O ciągłym a do tego krótkim  
tchu, dyszeniu, i rzeź-  
niu w piersiach. —*

Tych znamion dostrzegamy dość często przy nowo narodzonych dzieciach, szczególniéy zaś w periodzie wyrzyna-nia się zębów, to zaduszaiać, swiszczą-ce, lub rzeźące tchnienie, albo zwykło trwać ciągle, na czas kłótszy i dłuższy, ustawać, i na nowo powracać, miano-wiciey napada około wieczora, lub w nocy, iakoŜ dzieci zwykły się ile siłki dozwalaią same podnosić się, a gdyby tego same dla niedostatku siłek czynić niemogły, należy im w tém dopomagać dla uniknienia zaduszenia, iakoŜ w pod-niesionym stanie trzymaiąc ich, nie o-kazuią po sobie téy niespokoyności i tę-schnoty. —

Chcąc téy chorobie skutecznie zara-dzić, koniecznie przyczyny do onéy wysłedzić i doysć potrzeba — przyczyny takowe. —

Nayprzód wypytać się potrzeba, ieżeli nie dały karmicielki, piastunki dzieciom co do iedzenia zrzeczy niestra-



wnych iak się dość często zdarza, do liczby tych niestrawnych potraw zwłaszcza u młodych zbyt dzieci należą, kłoski gniecione, kartosle, groch, kasze iayczane t t p. które same iedząc i dzieciom udzielają — W takim razie nieczekaiać dać proszku z ipekakuany stosownie do wieku, a otém się iuż wtylu miejscach powtarzało, przytem dawać enemki sprówadzające zrumianku serwatki, masła słonego, oleiu, oliwy co się z nich w domn znajduie, brzuszek dłonią lekko nacierać, a poczem okładania z rumiankowego odwaru często powtarzając czynić wypada, —

*Powtóre* czyli te uszkodzone tchnienia nie pochodzą od wpędzeń wyrzutów, iakoto swierzby przez smarowania powierzchowne, w tenczas o iéy powrót starać się potrzeba, dając pić bzo-  
wy kwiat ciepło dla wzbudzenia potów, przykładać po różnych częściach synapizma, częste w pomoc przybrać kąpielki dobrze ciepłe, do których dodać radzę garść iednę popiołu czystego, lub soli kuchennéy łyżkę, i w tym razie użycie proszku z ipekakuany przedsięwziąć można, aby przy nastąpionych wymiotach wzruszenia naczyń skórnych pot sprówadziły, i powrotowi wyrzutu dopomagały. —

*Po trzecie* iezeli w skutku zaziębnia, przyłożyć synapizma na piersiach na łytkach na przemian, dawać w małej nader dozie następujący proszek, do którego wziąć potrzeba proszku z ipekakuany dwa ziarka, kamfory iedno ziarko, cukru drachmów dwie, to wszystko zetrzyć na proszek subtelny, młodszym dawać co trzy godziny na małym końcu noża w pokarmie, starszym po dwa razy tyle, takż kwiat bzo-  
wy do picia, nóg moczenia, a nawet i kąpeli branie w pomoc przybrać należy. —

*Po czwarte* iezeli w skutku zaziębień wyrzutów odry, szkarlatyny, ospy czerwonej, tu co prędzey postąpić sobie wypada w sposobach, które się przy drugiéy i trzeciéy przyczynie podały. —

*Po piąte* dość często u dzieci flegmatycznych uszkodzone tchnienia dostrzegać się daia, iezeli te są ieszcze piersiami karmione należy leczenie skuteczne przez pokarm, w takim więc przy-padku, bądź to matki, lub karmicielki ile możności wystrzegać się maia mącznych iadel, iakoto świeżego chleba, kłósek, kartofli, i te ieszcze dobrze osalać, a niekrasić słoniwą starą — Do takowéy konstytucyi dzieci zawsze nay-



lepiędy, dobierać dobrze żywionędy, mocnēdy, młodey karmicielki, którey też i pokarm wielu broni od tych uszkodzeń, a w przypadku napadu u dzieci dawac albo proszek ipekakuany w dozach wazēy podanych co do wieku, a nadto dla zapobiegania tymże napa-dom, służy z wielkim skutkiem dziewanna lub kwiat lipowy, np. wziąwszy 2, 3 łyżki któregożkolwiek z tych kwiatów nalania, ośrodzić dobrze, i dolać Spirytusu Salis Amoniaci Anisati kropli 10. 15 i z tego zmieszania po łyżce od kawy młodszy, starszy m po dwie, trzy, lub cztery razy na dzień dla wzmocnienia skutku w rozrzedzaniu flegmy, do tey-że ilości nalań z kwiatów nadmieinonych winą Emetycznegō takōż kropli 10 15 do-dać tymże sposobem i tak często dawać po łyżce. dwie, stósownie do wieku. —

Po szóste przystępować takōż zwy-  
kły wspomnioune w tchnieniu uszkodze-  
nia po picu zimnych napoiów zagrza-  
wszy się w przody, tu znowu niezwło-  
cznie przyłożyć potrzeba synapizma na  
piersiach, nóg moczenia, i same nawet  
kąpiele dobrze służy, a w przypadku  
przyłączaiący się do tego febr̄y i gorącz-  
ki, rady znawcy niebawnie użyć po-  
treba. —

Po siódme: takōż napadać zwykły  
po zaziębieniach nóg, piersi, szyi, gło-  
wy, lub innych ciała ludzkiego części,  
o przywróceniu potów starać się co prę-  
dzej potrzeba, a do tego służy szrodki,  
któreśmy przy drugiey i trzeciey przy-  
czynie podali. —

Po ósme przystępować takōż zwy-  
kły, po prędko zatrzymaney febrze,  
ieżeli te nie ustąpią w tchnieniu uszko-  
dzenia, powołać rady znawcy potrze-  
ba aby ten użył przyzwoitych szrodków  
przez któreby mógł ciągle mu ich trwa-  
niu (i iak się nie raz zdarza) zapo-  
biedz. —

*Koniec rozdziałku pierwszego.*



## R O Ź D Z I A Ł E K II.

## CZĄSTKA PIERWSZA.

*O Chorobach często zdarzających się.*

Pomimo ostrożności, własnych lub obcych doświadczeń przecie dość często przy rozmaitych do życia sposobach nieraz dowolnie, lub mimowolnie podlegać wypada chorobom zdarzającym się, że te stać się mogą dla braku roztropnej rady niebędącymi, które mogą być oddalonymi przy doskonałej, Wkrótkości zebrawszy takowe zdarzenia, częśćkę tę im przeznaczyłem wraz z podaniem na każde z nich środków doradczych. —

*Zbicia i uderzenia w ogólności. —*

Mogą być działane przez rozmaite narzędzia twardsze lub miększe. Pierwsze robić zwykły oprócz obrażeń i naruszeń całości skóry, to jest zranienie

*O uderzeniu i stłuczeniu w ogół: 397*

ię nawet i wzruszenie obrażonych części jako i im przyległych, części te im są słabiej niższe np. głowy, żywota, tęp bardziej wstanie brzemienności lub i części, rodnych, im mocniejszego przez takowe zadania doznają obrażenia stać się mogą nawet i życia pozbawienia przyczynami. Drugie znów, to jest miękko mniej lub więcej sprężne, lubo rzadzić mogą także wzruszenia i naruszenia całości skóry, przecie daleko częściej zostawiają po sobie miejsca zasiniane przez wystąpienie krwi w tkankę kómkowatą, z tą obrzmiewania mniej lub więcej obszerne, dla zdrażnionych zaś nerwów miejscowych i bóle silne przyłączają się wraz z febrą i gorączką znaczną, a nawet i znaczniejszą im takowych zbiciów doznają osoby tkliwe, drażliwe, lub niedawno poprzednicze choroby odbyte. —

Do każdego gatunku tych zbiciów służyć mogą iedne środki doradcze, które tu podamy do użycia, nawet przy niżej opisanych wypadkach, i gdzie iakiem odmianie wypadnie umieścić dodatek takowy, przechodząc każde zdarzenie w szczególności nie omieszka się. —



## O zbitiu głowy.

Bydź może samo lub zranieniem skóry przysilniejszym zaś i zstrzaskaniem kości czaszkę składających. — Samo potrzebuie częstego głowy okładania, do czego służy Nr. 20. przytém nie dozwalać, aby głowa leżała na pierzach, i ile możności w górę uniesiona, być baczny o utrzymanie stolca wolnego a na ten zamiar albo dawać enemy lub proszek Nr. 14 co 2. lub 3 godziny po uwolnionym którego dawać odwar Nr. 11 do tych srodków dołączyć wypada i inne, jeżeli febra, gorączka, szum w uszach lub zawrót głowy przystępują, oprócz odwaru Nr. 11. którego ciągle używać nie dość, zalecam jeszcze nóg moczenie po razy dwa dniem, przykładac synapizm na łytkach, stawiać piławki za uszami, a nawet i do samego krwi upuszczenia przystąpić, jeżeli twarz bywa czerwona, oczy zapalone; napoje służyć tu chłodzącej natury iakoto: woda z octem z sokiem kwaśnicy, serwatka, dla możnych lemoniada, równie i na pokarm służyć posiłki bynajmnięj wzruszeń krwi nie zrzadzające, iakoto kleie, mleko z białym chlebem lub z kaszami, owoce gotowane, mięs żadnych, ani też twardszych do strawienia, przy nich zostawać

dni kilka a nawet i kilkanaście, póki nie opuszczą febra i gorączka, przez uderzenie zaś zrzadzone zranienie skóry oprócz użytku podanych srodków wewnętrznych lekarskich iako i dyetetycznych potrzeba oczyszczać zranione miejsca przez obmycie ze krwi miejsca obrażone, włosy ogolić, zbliżyć wargi, rany, ile można przymocować je wąsko pokraianym plasterem lipskim (*cin-plastrum ad hesivum*) na płótnie rozsmarowanym tak gęsto iak długość rany wymaga, na wierzchu zaś tego opatrzenia przyłożyć fleytuszek na sucho, i tenże wzmiarkowanym plasterem gdzie niegdzie przymocować, aby go odmienić można, apóźnięj masłem niesłoneń lub w oleiu umaczany przyłożyć, iżby do rany nie przylegał, nie naruszając aż w kilka dni plasterków, które zbliżone ranki wargi utrzymują, przez co ile możności ropieniu się zapobieży, a zagoienie przyspieszy. Umieszcza się tu przestroga, że gdyby było przy zbitiu przytomne zranienie, okładania pod liczbą 20 dla solów służyć nie mogą, na ten zaś użytek następujące służyć.

Wziąć rozmarynu suchego, kwiatu tranku górnego, wniedostatku tego z dobrym skutkiem miejsce zastąpić może kwiat Sto: Janski wraz z zielen, ma:



cierzapki równe części *np.* po garści dwie, wody wrzącej pół garca, przykryć dobrze naczynie, w którym się ta ziarna miészanina do przestudzenia moczyć po winna, poczem przecedzić i wycisnąć, dodać octu winnego wódki po kwarterce, zmiesznać i na tén użytek przeznaczyć, można, téż krótszym sposobem robić wzięwszy tąż ilość wody wraz z octu i wódki ilością. Na przypadek zaś strzaskania kości wezwać lekarza ran, dla uczynienia doskonałego sledztwa i zarady potrzeba, gdy tym czasem podane tu srodki nie zostaną bezskutecznemi.

### O z b i c i u p i e r s i.

Takowe im są gwałtowniejsze mogą znaczny uszczerbek na zdrowiu a nawet i na skrócenie życia spowodzić tém pewniey kiedy na przodzie kadłuba piersiowego wykonane bywają, z powodu że takowe obrażają części do nienszkodzonego bynajmniej tchnienia i odetchnienia służące, że w samych płucach wzruszenia sprawiają, iakoż im są takowe zadania silniejszymi przystępują krótkie tchnienie, kolki, krwi płucie i inne obrażonego piersi układu znamiona, do którego nieraz przyłączać się zwykło,

dla

dla sąsiedztwa z temi organami serca gwałtowne bicie wniesosc za czynnem lub zaniedbanem ratowaniu, wypadkami są krótkie nader pracowite tchnienia (*asthma*) opuchliny płuc, serca woreczka, a w końcu i same suchoty. Nie należy zatem spóźnić ratowania, a to zawiera w sobie te same co i powyżey srodki doradcze z dodatkiem, że uważać należy na wiek, temperament, płeć, czyli są krwiści, w tenczas przystąpić potrzeba do niezwłocznego krwi upuszczenia a nawet i powtarzania, gdyby tchnienia bolesne ieszcze trwać miały, lub krwie płucia obfite nie ustawały, a jeżeli są mniej krwiści a do tego w wieku młodym, równie takóż przedsięwziąć krwi upuszczenie, przecie mniej obfite bez iey powtarzania, a nato miejsce przystawić piawki w przypa: zaś pozostałego bólu na to miejsce przyłożyć Synapizmy Nr. 18 lub maść Nr. 25. Po ustaniu zaś takowych przypadłości dla zapewnienia zdrowia osoby te czas niemały wstrzymać się powinny od chodzenia prętkiego, gądania głośnego, prac ciężkich, a przytém wystrzegać się wszelkiey natury trunków rozgrzewających użytku, jeżeli pragną uniknąć chociaż po naylepszym ratunku i naypomysłniejszych odniesionych korzyściach nieomylnych chorób,



które ich o kwiejące czyli chorobliwie zdrowie iako i oskrócenie życia przyprawić mogą. —

### *O zbicin Żywota.*

W wydrążeniu tém ciała pokrytém z przodu i boków samemi miękkimi częściami, zawarte są trzewia, nie małego przeznaczenia, podobne zatym przypadki muszą znaczne uszkodzenia dość często i niebezpieczne za sobą prowadzić, pomiędzy inne nader ważnemi są u ciężarnych, nieraz to z nieludzkiego postępowania gwałtowne krwi odpływy poronienia a nawet i nadal zagruntowania takowych, iak nie tak łatwych poczęciów i zupełna nieposobność do nich, bywają skutkami. To wszystko następować zwykło, im zbicin żywota bywają gwałtowniejsze, w każdym prawie czasie brzemienności tém bardziey bliższym rodzenia, iak znowu miniey niebezpiecznemi stać się mogą przy pomiernych zwłaszcza u płci żeńskiéy mocnéy budowy wsily zamożnéy, a znowu nastąpić mogą przy słabéy konstytucyi i delikatnéy ciała budowie, a czego mamy dowody oprócz tych przyczyn, że stąpienia nieostrożne wzruszenia w częściach zapłodzenia zrzadzane, że upady, licz-

ne poronienia a do tego i łatwe zrzadzają. —

Jak tylko przedstawia się po tych zdarzeniach boleści silne, w żywocie niższym okazuje się początkowo nieznaczny daléy iednak obfitszy krwi odpływ, nadewszystko spokojność zachować im przedzéy tém bezpieczniey należy, włożku zatym pozostać wypada, lekko się okrywać, nie używać żadnych gorących, lecz tylko dobrze przestudzonych pokarmów, iakoto, rosolów, kleiów, toż samo się ma rozumieć i o napoiach, tu służą kwaskowate, chłodzące, a te iuż się wyżej przy zbicin głowy podały. Lekkie obowiążanie żywota w pomoc przybrać należy, wrescie bez dalszéy zwłoki znawcę sztuki macierzyńskiéy przywolać, aby tenże należne przed siębrał ratowania srodki. Do tąd były podane sposoby naprzeciw uderzeniom w brzemienności stanie zostających osób, teraz przejdziemy inne a tak, uderzenia czyli zbicin téżé saméy części ciała mogą zrzadzić wymioty, czkawki biegunki, dysenterye, wstrzymanie odpływów uryny, lub płynienie téżé krwiste u płci oboygá, wszystkie te znamiona są razem znamionami zadanego gwałtu, obrażeń tych lub owych części w wydrążeniu żywota położonych —



Sposoby zaradzenia tą też same, które się na wstępie téj materji podały, z temi jednak odmianami, że przywymiotach pokąd te trwają, leki z pod Nr. 6 dla niezbudzenia tychże przez skutek i tak już zdrażnionego żołądka służą, także powierzchnowe okładania żywota wyżej wspomniane, przytym i enemy dawania pokąd wymioty nie ustają, a przynajmniej nie są już tak częstemi. Gdzie znowu są przytomni biegunki, najlepiej służą prócz okładania wody zimnej z octem winnym lub wódką, które bez wyjątku we wszystkich tu wymienionych stłuczeniach nderzeniach czynić wypada, (kleie z kaszów wyżej tyle razy powtarzane, lub biały chleb z wodą gotowany i przez sitko przepuszczony z dodatkiem do miłej kwasowości octu winnego, piwnego, lub też w niedostatku ich z sokiem kwaśnicy, a w końcu i przegotowanych barszczu zaczynionego lub burakowego za napój używać, do tego dawać enemy z krochmalu, lnianego nasienia bez lub z dodatkiem do każdej po iednym żółtku od iasia, takowe enemy dawać podług częstosci stolców i to w małej ilości np. po półkwatunku na raz 2 lub 3 razy na dzień, a co się dotyczy diety, ta ma być złożoną z klejów lub kaszów, ryżu, or-

Wszu, wszelkie zaśtwardszėj natury pokarmy niezmiernie się do dalszego ich trwania przyczyniają. Wszystko, co się podało przy biegunkach użytém być może i przy Dyssenteryach, lecz czas nawet nieiaki po ustaniu przy wskazanych pokarmach i posiłkach pozostać wypada.— Na przywrocenie wstrzymanego uryny odpływu służą też same środki, co się przy utrząsnieniu wuderzeniu głowy, piersi podały, z tym tylko dodatkiem, że gdzie można w pomoc przybrać kąpiele, te wielką ulgę a nawet i znacznie się do puszczenia iej wolnego bez boleści przyczyniają, gdzieby nie było téj sposobności, okładania ciepłe okolic pęcherza z lnianego nasienia i mleka czynić, smarować też miejsca razy 3 lub 4 nadzień maścią Nr. 21. wypada, a co donapoiu, tu lubo służą różnej natury iakoto woda z lnianem nasieniem, odwar z korzenia slazu, wszelako w małej ilości pić ie wypada, pokąd odpływ mocz u wstrzymany nie zostanie przywróconym— Nadmieniono zostało na wstępie téj materji, że się nie raz przyłączają krwiotoki przez nos i części rodne płci obóyga, jeżeli takowe nie są zaoblite wstrzymać ich niepotrzeba, ponieważ znacznie się przyczyniają do zmniejszenia przedrażnień obrażonych części,



z tem wszystkiem za obfite wymagają rady, i ta jest co do plynienia krwi z nosa, które równie bydz może skutkiem silnego pderzenia w policzek iako w sam nos, okładania czoła i nosa zimną wodą, skrapiania, sarkania w nos wody zimney, do której kwatarki rozpuścić pół łota hałunu, lub też włożyć w otwory nosowe fleytuszkę zwiniętą i w témże rozpuszczeniu dobrze zmaczaną. Dobrze takż służy maczane w wodzie i occie na zimno chusty, na kark przykładać, a w obfitszym krwie z nosa plynieniu pod pachy obwiązywać do koła razy kilka płótnem na 5. lub 4. palce szeroko pokrajaném i szytém na wzór używanych do krwi puszczenia; takowe podług wstrzymującego się krwi z nosa plynienia, można popuszczać lub wcale odwiązać, i znowu gdyby wypadła potrzeba scieśnić i obwiązać na nowo potrzeba, co tyle razy powtarzać, ile nowy odpływ przystąpi. Do tego dodać przestrożę aby głowy nie zwieszać, i owszem takową uniesioną trzymać. Co się dotyczy krwiotoków z części rodných płci obojga, jeżeli te nie są wczasie zwykłego plynienia u płci żeńskiej, a do tego nieco obfitsze z zatrzymaniem tychże nader ostrożnie postąpić wypada, lub wcale biegowi zostawić, u krwistych i młodych

z tym wszystkiém przy obfitych, spokojność ciała zachować, wystrzegać się wszelkich namiętności, chłodno leżeć i to wszystko co się ośrodkach Lekarskich i dyetetycznych przy głowy wzruszeniach podać czynić wypada, na przypadek i dnak słabych konstytucyi, gdzie się uczucia osłabien pszylęcają, taki srodek ratunku przedsięwziąć, aby plynieniu nieść znemu przez wstrzymanie nie uszkodzić, iak obfitsze umiarkowanie utrzymać. I tu należał: spokojność ciała zachować, lekko kawkowey natury, napoje, dyeta chłodna, chociażby była, i żyzna, i p. p. rosół, niekorzenne, ani tłuste, przestudzone, na wy. pół. z klejami często dawać, wystrzegać się głośnego mówienia, spokojnie się w łóżku zachować, nie leżeć w pierzach, nie okładać ciągle żywota zimną wodą z oćtem, lecz razy kilka obmywanie jego przez dzień czynić należy. — Co się mówiło o chłodnych pokarmach, napoiach należy we wszystkich krwiotokach zachować.

Z ranieniami zaś powierzchownymi innych części postąpić sobie należy, iak się nadmieniło przy zranieniu skóry na głowie.

Wszystkie zatém innych części skurczenia, zbiecia i t. p. iakoto: krzyża, udów, nóg, takż lezoneami bydz mogą



jak powyższe, prócz że jeszcze te części późniéj iak siność zmniejszoną zostanie smarować 3. lub 4. razy na dzień maścią pod Nr. 21 umieszczoną. —

### O Skaleczeniach.

Zranienie którykolwiek części ciała jest tylko naruszeniem całości przez narzędzia działaném; przy którym albo sama krew, lipka ciekłość, lub serwatka krwi odpływa, a to stosownie do obrażonych naczyń krwistych, lipkich lub serwatkowych. —

Nie jest tu zamiarem podciągnąć rany, iakie wskotku różnicy instrumentów następują, iakoto pchniętych, strzelonych, te bowiem należą do staranności biegłego rannikarza; nam zaś zostawać wypada przy powierzchownych i to dwójakich: *pierwsze*, które się przytrafiają dość często przez Gospodarskie narzędzia, przy których niema żadnego przyciśku, *drugie*, które bywają z témże połączone. —

Powszechne następstwo takowych zdarzeń jest: (a) Rozpadnienie części, lub tylko miejsca, w których zaszło skaleczenie (b.) Ból z powodu obrażonego nerwu, i ten lubo nie bywa mocnym, przy świeżem zadaniu, późniéj iednak

silniejszy następnie; i ten powszechnie wolniéj za przystępującém ropieniem (c.) Wypływ krwi saméj, lipkiej ciekłości, lub krwi serwatki, iak się to wyżéj namieniło. Odpływ krwi początkowo po przecięciu naczyń krwistych bywa obfity, ten się coraz zmniejsza, wkońcu przechodząc w ropę, ten natury balsam takową ranę zagaia, jeżeli przy tych skaleczeniach naruszone zostanie tętno (*arteria*) copędzéj dla wstrzymania odpływu krwi znawcę przywołać należy.

Stan zapalenia, ten zwykły się poznawać przez czerwoność, gorącość obrzmienie w saméj ranie i iéj okolicy, przyczém dają się małe bicia tętnów: uczuwać, w stopniu zaś drażliwości i czułości przystępuje silniejsza lub wolniejsza febra, gorączka, i te zwykły trwać do 3. 4. i 5go dnia, daléj wolniéj tém więcéj za przystąpieniem ropienia; które zwykło stan zapalonéj rany pomniejszać. — Zagojenie pierwszych bydz może pośpieszniejsze i przedłużone, pośpieszniejsze przez zbliżenie warg rany za pomocą plastra lipkiego (*emplastrum adhaesivum*) a na wierzch przykładania fleytuszków początkowo na sucho, daléj nasmarowane maścią Nr. 19 iak się przy zbitiu głowy wraz zranie-



niem namienilo. — Fleytuszki te codziennie odswieżać, a brzegi rany z ropy oczyszczając wypada, co czynić należy pokąd przez ropę zagojenie nie nastąpi a kiedy trzymać nie chcą dłużey plasterki, świeże przyłożyć zawsze jednak. o zbliżeniu warg rany przepomnieć nie wypada; chcąc przez takowy sposób przyspieszyć zagojenie z pomniejszeniem ile tylko byź może ropienia. — Inaczej się znówu ma, jeżeli powyższy sposób początkowo zaniechanym bywa, tu iuż ropienie ciągle dogaia ranę. Na ten zamiar przykładac fleytuszki maścią nasmarowane raz dwa na dzień, a to do słości odpływającej ropy, a nie raz i dla dni gorących, żeby ropa przyhierała niemilej woni rany nie drażniła, i gorzenie nie przedłużała. — Na wierzech jednak, czyli opatrzenie bywa przez zbliżenie wargów ran lub bez niego, zawsze opasywać takowe potrzeba, a nawet i skrapiać wodą z octem i wódką; z małym iednak ostatnim domieszewaniem np. do kwarty wody półkwaterek octu, i tyż wódki, uważać do tego należy na czystość rany, czyli: jest czysta lub nie, w ostatnim przypadku przywołać należy znawcę, aby ten stosowne maści i inne leki przepisał, dla uniknienia tych niedogodności i wzagojeniu zwłoki, nie

masz lepszego sposobu goić rany iak przez zbliżenie ich warg.

Drugie znówu obrażenia nie raz zdarzają się przez gwałtowne lub mniej gwałtowne za pomocą tępego ciała, pojedynczego członka byź działane, przy czem taż część bywa mocno wzruszoną i przyciśniętą, krew zaś w swych naczyniach wstrzymaną, gdy ta wtkankę komórkowatą wstępuje, takowe obrażenie powszechnie zwykliśmy przyciśnięciem przyskrzybnieniem nazywać, a kiedy skóra naruszona przytym bywa, ranę przyciśniętą przyskrzybnioną dla różnicy od pierwszey przez ostrość narzędzia działaney, różne stopnie tych ran, i niezawsze pochodzą od natężności skutkującego ciała, części, na którą toż działa, ale nawet od oporu części tej lub iey przyległej, iakoż dostrzegamy nie raz przyciśnięcia przyskrzybnienia rzędzonych przez pomierne ciała takowego działanie, mogno bolesne, kiedy się kość w bliskości znayduje. — W pomniejszym znówu stopniu zwykła skóra na miejscu obrazonem swą sprężność mnić lub więcéy zatracac, naczynia zaś powiększey części znaydują się w swęj całości naruszonemi i iakoż w swęj sprężności czasowo wolnieją, przez co następuje wystąpienie krwi, nadgromadzenie



się i zatamowanie innych ciekłości obrzmiewania sprawujące. Część tym sposobem obrażona albo bywa sinawą, brunatną, a przy rozeysciu się wstrzymaney ciekłości lub krwi żółknieie, całe zaradzenie wspiera się, ażeby utraconą w naczyniach sprężność przywrócić, przez coby wystąpiłone po zagnac swych naczyń ciekły mogły bydz wysysanemi, a na dopełnienie czego lekko drażniące, sciskające i wzmacniające środki w pomoc użyć potrzeba, iakoto okładania winem z wodą, lub Nr. 20 i to na zimno, można takż, przeznaczyć na tenże sam zamiar do smarowania wódkę kamforową, a gdzie obwisłość, miękość ciała jest przytomną, iak się zdarza obrażoney części na okładania zimne koncem przywrócenia sprężności, zwielskim skutkiem służą odwary z kor, dębowey wierzby, łoziny, z dodatkiem alunu np. który z tych kor pokrajaney lub przetłuczoney łotów 4 wody półgarca, gotować do zostania się półowy, precedzić i dodać alunu łót 1. w tym maczane we czworo złożone chusty miernie wyciśnięte i temiz część obrażoną obwilać, lub gdzie się obwilać nie da na wierzch iey, przykładac, w porze zimowey przeznaczyć można nawet lód, śnieg. Obok tych środków, na których skutkowanie spuscie się

można, początkowo wolne opaski z płótna, iak się wyżej nadmienilo, czynić koniecznie potrzeba, a późnley takowe nie to mocniej obwilać, przez te sposoby ratowania wystąpiłone zgromadzone iako wcześci uszkodzonéy poza granice swych naczyń soki, nazad wysysanemi bywaią, a iezeli się wszystkie rozeysć nie mogą, wezwany lekarz ran przez uczynione nacięcia resztę ich uwolnić. Wogólności ile tylko się da w podobnych przypadkach zaraz na początku starać się o dopełnienie podanych środków, aby uniknąć ropienia. —

Przy ważniejszych znów przyciśnieniach, osobliwie u silnych, tęgiéy budowy, krwistych osób dla zapobiegania nastąpić mogącego zapalenia a skutku ięgo i ropienia, niezwłocznie krwi upuszczenie, wszelako nie obfite czynić należy, także na miejsc obrażone stawiać piławki, dawać proszek co 3. lub 4. godziny po łyżce od kawy Nr. 14. a nadto tak w tém iako i podobnych zdarzeniach chory dyetę zachować powinien podług przepisów iakie się przy zapaleniach w ogólności podały. —

#### O utrząśnieniach.

Kiedy się takowe bez powątpiwania zdarzaią przy natężeniach, lub innych



gwałtownych i wywichnienia ze stawów członków, a nawet strzaskania najtwardszych ciała naszego części, to jest kości, wątpić nie można, żeby z tychże samych przyczyn nie miały i w częściach miękkich, lubo od tych przypadków dość natura ochronić ich starała się, wszelako przez upadnięcia, mocne bicia, dzwigania ciężarów siły przezwyćżających, wstrząśnienia w różnych częściach miękkich, mianowiciey w żywoćie położonych następują, iakoż przy pracach, przy upadnięciach nie zżytniey wysokości, przy mocowaniach, przy spadnięciach z konia i t. p. dostrzegamy nie raz wymioty trudną do wstrzymania, biegunki, bóle miejscowe w częściach obrażonych, odpływy minowolne uryny, odbijania, burgotania po kioskach a u płci kobiecey wystąpienia pochwy macicznej, iey samey, białe lub i czerwone opławy, nieraz u obojga płci zupełne apetytu utracenie. Nigdy nie wypada takowym przypadkom dopuszczać zadawnienia, a czém pospieszniey przedsięwziąć srodki ratowania, tém pewniey i spodziewać się należy zapobieżenie długim cierpieniom, na które osoby takowe wystawionemi bywają. Srodkami temi są Nr. 11. a odwarum kwiatu Sgo. Jańskiego, w którym maczać

chusty we czworo złożone wycisnięte i okładać te lub owe części nadinne u zuciem cierpień zajęte, przy użyciu tych czas niemały pozostać z powodów, raz, że powyższe znamiona z utrząśnień pochodzące zupełnie nie ustana, a które i tak dość często przy spiesznem zaradzeniu nie zwykły zawsze prętko opuszczać, drugi raz ażeby tym częściom dać trwałe umocnienia, do czego służą stosowne do miejsc utrząśnionych obwiązania, a tych noszenia zaniechać prędko nie radzę. Zniemałym takóž skutkiem na otrętwienie podskórnych nerwów części utrząśnionych służą, smarowania oleiu zkwiatem Święto Jańskim gotowanym, i kłórenby dla szczególne go w nim ludu pospolitego zaufania w domowey aptece utrzymywać wypadają, nie tak łatwo dozwalać go, iak zwykle bywa, wewnątrznie po tyżce, dwie, parę na dzień razy z piwem grzanem używać a to dla przyczyn, że oliwa do gotowania z tym kwiatem często inżiest podsterzała, i znowu gdyby i ze świeższą był robiony, ten przecho wywany długo w cieplem do tego miejscu zwykły gorszyć, co drażni żóładek żółć zapala, do niestrawności znacznie się przyczynia, iakoż może powiększyć wymioty, i tak dość często z tych przy-



czyn pochodzące, lub odbiciami i burgotania, a nie raz i samą febrę niestrawności wzbudzić — Na miejsce oleju Świętojańskiego do smarowania służy maść pod Nr. 21. Jtu w początkach zwłaszcza zwykły się często febryczne wzruszenia przygorące, wnet silniejsze, wnet mocniejsze przyłączać, pokąd ten stan trwa, a tém bardziey przy wymiotach, dyetę lekką czas nieiaki zachować, i od téy do czasu zupełnego wymiotów wstrzymania nie odstępować iak powoli do twardszcy powracać.

### O z a n o k c i c y.

Nieraz mocne przyciski, uderzenia, ukłucia w palce urąg, a bydz może, lubo daleko rzadziéy, jeżeli nie z zewnątrzney dypozycyi i u palcy nóg zrządziąg obrażonego miejsca zapalenie, temu jeżeli się z początku nie zapobieży, przechodzi, w ropienie a przy chorobliwych sokach i w gangrenę. Przytém zwykły silny ból a do tego nienstaący dręczyć, jeżeli ten przypadek dotyka wiek młody, drażliwą osobę, dość często przyłącza się silna febra, gorączka, lubo te być muszą przytomnemi, iako towarzyszki zapaleń, przecię nie tak natężone

ne, iak u osób powyższych, gdzie nieraz i wzruszenia nerwowego układu dostrzegać się daią, nieraz przez współnictwo pomiędzy sobą części i członków, zwłaszcza kiedy przy zaniedbanym początkowo ratunku już toż zapalenie przechodzi w ropienie, gdzie powszechnie daie się uczuwać nieiakié w miejscu obrażoném pukanie, zwykła cała ręka aż do pachy obrzmiewać wraz z swym pod pachowym zawalkiem, że użycie téy części bywa nader bolesne i dokuczające. —

Zanokcica w zględzie cierpiący części dzieli się na cztery gatunki, czyli raczéy na stopnie — *Pierwszy* z nich ma swoje siedlisko w samém palca brzusa skóry, i najpowszechniéy się zdarza po poprzedniczym powierzchowném zapaleniu téyże, gdzie powstaie pęcherzyk napelniony ropą, albo na samym koncu lub po stronach paznokcia, anieraz ropa utwarza się pod samym paznokciem i wtenczas przyłącza się silny ból rozchodzący się aż wzgórze. — *Drugi* ma swoje siedlisko w tkance komórkowatey pod skórą, i ten gatunek najpowszechniéy utwarzać się zwykły w brzescu palcy. A lubo i przytém gatunku ból silny towarzyszy, przecię nierozciąga się takowy po zagranicę zajętego miejsca,



obrzemie przy nim jest daleko mniejsze, a głukanie (*fluctuatio*) się ropy nader mało uczuwać się daie. Trzeci znowu gatunek ma swoje siedlisko wściągaczach i pochwach palcy, wszelako przy palcu od niego zajętem przy nader silney boleści nader mało dostrzegać się daie iego obrzemie, ale za to wręce a więcéy ieszcze więy stawie, nie raz tak silny ból rozciąga się aż do łopatek i temu towarzyszy febra mocna. Czwar-ty i ostatni gatunek nadewszystko utwarza się przez zapalenia błonki kostney (*periostium*) a lubo i przy nim ból silny jest przytomnym, wszelako zenże nie rozciąga się do ręki a nawet i do przedręki, obrzemie zaś nawet przy cierpiącym palcu nie daie się postrzegać. Zopisu tych czterech gatunków leczenia stosowne do każdego czynić wypada, tak przy pierwszym otworzyć spiesznie wypada wrzódek przy końcu paznokcia, i to by dź musi dostateczne, przestrzegam że zwykłe przekłucia spilkami, igłami, niepomogą, i owszem przez niepotrzebne drażnienie i tak bolesnego miejsca być może szkodliwszém, poczem zwykt paznogieć obumierać, a dla nieprzeszkodzenia zagoieniu potrzeba ile się tylko da obciąć niższy brzeg iego, a kiedy stary paznogieć powyżéy się oddziela,

nowy zwykt się utwarzać. -- Lecz jeżeli się ropa pod paznogciem znayduie, potrzeba tenże przez skrobanie skłem, lub ostrym nożem otworzyć, aby przez toż otwarcie ropy wypływ ułatwić. — Drugiego gatunku leczenie im jest pospieszniejsze zapobiega zwykłym następstwom, do których po zapaleniu ropienie nadewszystko bywa spodziewaném, na usmierzenie zatem zapalenia zwłaszcza przy bólu silnym, potrzebuo jest piliawek 3. 4 u bólem zajętego palca przystawić, czynić okładania Nr. 20 albo na miejscu iéy wziąć soli Armoniaiku łót jeden, wody półkwarty, kwaterkę kamforowego spirytusu, wody Gulardowéy, do tych srodków takóž do liczyć potrzeba naparzania wody wrzącéy, do której wsypać kwiatów bżowego, rumianku, lub rozpuszczenie ciepłe mydła w wodzie przykładac, jeżeliby się i-kie obce ciała np. drzazgi i t. p. znaydować miały, te wyjąć wypada, aby uniknąć drażnienia które zrządzać zwykły, a przytém i by dź przyczyną ciężłego bólu zapaleniu towarzyszącego. I w tych tu gatunkach, przy których zwykła febra i gorączka się przyłączać, tém bardziéy gdy jest silnieyszą, równie chłodzącą dyetę prowadzić należy, a że ta przy zapalen warunkach jest umiessczo-



na, do nich się więc odsyła. Na przypadek trwania bólu po użyciu tych środków naydalej do dnia czwartego. przywołać lekarza ran, aby ten na krzyż otworzył miejsce, gdzie się daie uczuwać zebrana ropa, lub gdzie ból jest przytomnym i to uczynić wypadła chociażby się jeszcze ropa nieznaydowała, a krew tylko wypłynęła, wszelako nłgę znaczną wcierpieniach otwarcie takowe sprawia, a które nawet w potrzebie znawca i powtórzyć nie zaniedba. Leczenie trzeciego gatunku, które się na drugiey lub trzeciey kostce palców zwykł znaydować. To zawiera się w pospieszném otwarciu, które nad dni trzy przedłużać niemożna. Nader rzadko zwykło się zgromadzenie ropy na cierpiącym miejscu znaydować, daleko częściej na dłoni, i którą takż przez otwarcie wypuścić. — Czwartego gatunku leczenie takż otwarcia potrzebuie — Umieszczone tu gatunki, zanokcić, dla tego są położone, żeby znając ie z opisu wczesnie przywołać ran lekarza; chcąc uwolnić się od kłectw, utraty cząstkowey kości palec składających, nie raz pojedynczo, lub i kilka razem przy ręce, na której się zanokcice znaydują. —

O wpadnięciu w ucho różnego owadu. —

Uszy i otwory nosa, są to części do których powietrze ma, iak mieć powinno nieuszkodzony przystęp, z którym dość często rozmaite owady, robactwo, wciskać się zwykło, i nie małe zrzadzać boleści, co do uszu znaydowane w nich pchły, mrówki, muchy, itp. że nieraz tamże i swe gniazda zakładały, iakoż nasiona owadu w tych organach złożone, za pomocą ciepła życie w nich odbierały. Im głębiej się w kanale słuchowym znaydują, tém gwałtowniej zrzadzać zwykły boleści, do których przyłącza się nie raz silna gorączka, głowy bóle, mairczenia, zapalenie wewnętrzne ucha, uszkodzony słuch, ledwie nie powszechnemi są owadu tego bytności następstwami. Jeżeli nie za głęboko zatrzymują się, łatwo mogą bydź z niego przez podwóyną szilkę na końcu nieco splecioną wydobyte, lub gdzie się znayduie lekarz ran przez pincetę, z tém wszystkiém kiedy się już aż do błonki bębenkowey ucha wcisnęły, już ich z tamtąd wżaden sposób dobyć nie można, iak tylko życie im odebrać. Na ten koniec użyć można wycisnionego soku z piołunu, z bagna swinięgo. (le-



*dum palustre*) nieco wody wapiennej lub wódki, nie może być skuteczniejszego, nad wpuszczanie, gdzie się apteka w bliskości znajduje, olejku migdałowego ten bez drażnienia i tak zdrażnionych części, lubo nie zaraz, wszelako czasem odbiera tymże życie, w niedostatku olejku można również dobrym skutkiem użyć oleju lnianego, rzepakowego, oliwy, aby tylko nie były stare, gorzkie, ponieważ takowe mocno drażnią, a przez co można i zapalenie, przy nim i ból znaczny powiększyć. — Do wpuszczania tych soków lub podanych olejów, które nieco zlecić wypada, chory powinien głowę trzymać na stronę przeciwną, by ucho, w którym się owad znajduje, wolne do wpuszczania po kropli kilkanaście, a nieraz i do wypełnienia onegoż wlewać, przez co zdarzyć się może, że na wierzch oleju spłynie, po napuszczeniu chory czas niebaki w tym położeniu głowę trzymać powinien. — Zdarza się także, że znajdujący się owad sam wypada, zaleciwszy choremu czas niebaki ucho na stronę odwrócić, niekiedy znowu uda się tenże owad wydobyć, obwinąwszy drutu koniec bawełną, którą miodem lub rozpuszczonem w wodzie gęsto cukrem dobrze posmarowawszy

przez kilka lub kilkanaście minut w uchu obracać, pomiędzy inny owad pchła najłatwiej wbawelną się wciska, i w niej pozostaje, włożywszy jej kawałek, można ją wprzód kilką kroplami olejku terpentynowego napuścić. Znoszą daleko łatwiej pozbyć te owady, sarkawszy w niego powyższe ciekłości dla zatracenia im życia, a przez kichanie na ten koniec zarządzone pozbyć się ich zupełnie można. Równie tenże przypadek z owadami z pyłem, a nawet i znacznie szerszymi ciałami w powiekach zająć może, w takim razie unieść potrzeba i rozszerzyć powieki, nachyliwszy głowę, mrużyć niemi, aby ze strumieniami łez spłynęło, lub też dopomódz częstym wody przemywaniem, lub kąpać oko w wodzie, nalawszy na łyżkę, dłoń, wprowadzić rznięcia, które w niem ciała obce sprawić zwykły, są do znoszenia przykre, dokuczające, zapalenie powiek i samych oczów sprawujące, dla uniknięcia tego ile możności tarcia palcami powiek wystrzegać się należy, a gdyby miało zająć zapalenie przez długi nieco tychże ciał pod powiekami pobyt, takowe usmierzyć okładaniem mleka zwolnionego, w którym moczyć parę ząbków szafranu. —



*O ukąszeniach przez iaszczurki  
lub węże. —*

Przez ukąszenie miejsce obrazone staie się zapływem ostrości iadu zmienionem, zapalonem, obrzmiałem, do tego przybiera koloru niebieskawego, a następstwem tego bywa sylny ból, rozciągający się od miejsca zranionego aż do serca, nie raz nawet przystępuje i gangrena. Sam zaś nieszczęśliwy dręczony bywa tęsknościami, przytém blednie, żółcieie, puls jego słaby, nierówny, opuszczający, uszkodzone tchnienie, smutne oczy, dreszcz, zimne poty, i takoweż ręce lub nogi, wymioty, silne serce bicie, po téj scenie przystępuje powszechne całego ciała obrzmienie, częste omglwana, nie raz konwulsye, wścieklizna prawie i inne największe utracie życia zagrażające symptony. Tak tych iako domowych a nawet i lesnych wściekłych zwierząt iady, o których się poniżej mówić będzie, nie konieczną jest potrzebą, aby z rany ukąszonej wysysanemi były do krwi, dla wyprowadzenia iednéj z nieszczęśliwych chorób wścieklizny, dosyć jest na tém, że ta zbyt mała częśćka iadów przez ukąszenia w ranie pozostała, przenosi swe skutkowanie do całego nerwów układu,

zrządza w nim potężny nieład, wyprowadza wzwyż nadiemnione oprócz innych jeszcze zjawiska, nie udzielając się bynajmniej krwi innym ciekom zwierzęcym, iakoż od 12. do 14 godzin inż przez współnictwo rażonych wranie nerwów, z całego ciała nerwami przystępować zwykły nerwowe symptony wyżej położone. Niekiedy znów po ustaniu zupełnem wszystkich skutków wzruszeń nerwowych, wszelako na długi czas w obrażonéj części paralizowana niemoc pozostaie; iako i długo trwająca, wleczeniu zaś uparta żółtačka —

Leczenie tych ukąszeń iako i innych to iest domowych lub dzikich zwierząt iest toż samo. i zawsze wymaga tychże samych srodków tak wewnętrznych iako i zewnętrznych. Przy wstępie tak waznéj aczkolwiek nieszczęśliwéj w swych skutkach materyi, dla niepotrzebnego srodków takowych powtarzania, innych ukąszeniach, bądź to domowych zwierząt, bądź to dzikich, iakoto: lisów, wilków a nawet i dzików, zbiór takowychże do naynowszych wynalazków położę, aby na przypadek ich użyć, iak zawsze mieć takowe w apteczce domowéj, gdzie téż one umieszczone mi zostaną. — Pierwszą a nayskuteczniejszą lubo bolesną radą iest w zapobieganiu



wybuchowi choroby, miejsce ukąszone i okolice jego im spieszniéy tém bezpiecznieéy wyrzuć, gdzie się to bez niebezpieczeństwa da uczynić, w przypadku gdzieby téy operacyi uczynić miejscowosc niedozwalała, ranę samą przybrawszy nieco i zdrowego ciała ponacinać, tak więc przez wyrznięcie czyli ponacinań rany zdziałane, wstanie ropienia długo utrzymować i zagojenia nie dopuszcząć. Na ten zamiar służy masć Nr. 25. którą raz lub dwa na dzień nasmarowawszy fleytuszeki przykładac, radzę takóž zdobry m skutkiem wcieranie oliwy, a bydź może i z tymże samym skutkiem wcieranie oleju lnianego, około rany lub i samą ranę smarować, wszelako masć powyższą nie radziłbym opuścić. Gdzie tylko wypadnie uczynić nacieranie, a wyrzynania miejsce nie dozwala, ranę zaraz octem, wodą dobrze posoloną nacierać, co do ukąszeń powyższych przez węże, lub iaszczurki, lubo nie zawsze bydź mogą zjadliwe, przecie nie znając gatunku węża iadowitego np. (*Crotulus horridus*.) Wąż okropnik (*coluber*) zmia, nawet okularnik, zawsze się bezpiecznieéy uczyni, kiedy się dopełni narzynan lub i wyrznięcia samego ukąszonego miejsca, i postąpić z raną, jak się podało, — Mocno w prawdzie na téż u-

kąszenia zalecają odwar z korzenia indyckiej wirginianskiej, (*radix Senegiae*;) na przypadek takowy umieszczam tu jego robienie. Wziąć 1ót 1. lub półtora, gotować tenże w półtory kwaterce wody do zostania się kwaterki, przecedzić, o-słodzić miodem i dawać po łyżce co dwie godziny, dla niemożności mienia tegoż korzenia pod ręką udzielam wcale inne lekarstwo domowe, i to jest nie małego skutku, wziąć octu kwaterkę, jeżeli bydź może piwnego lub miodowego, aby tylko były tegie, lepiej przecie winnego, któren dla wielu dzielnych swych, skutków w każdym prawie dworze znaydowałyby się powinien, zagrzać zdwoma łyżkami masła, i na ciepło po dwie łyżki na raz często wypić, aby przez dzień przynajmniéy taką ilość wypić można, i dziennie podwójnie taką ilość spotrzebować. Przy tym domowym srodtku przynajmniéy przez dni ośm zostawać, i długo trunków gorących, potraw zbyt do strawienia twardych, z mięs zas wieprzowin wędzonych lub solonych nieużywać, ale raczéy przy rosołach, kaszach, owocach gotowanych, ogrodowych, lub dzikich pozostać przez dni, które się nadmieniony ocet zmasłem używa. Co do leków wewnętrznych służących na ukąszenie od wscie-



kłych zwierząt daleko pewniejszego skutku spodziewać się można przez zapobiegania wybuchowi choroby wścieklizną zwaney, niżeli tęy leczenia i kuletema, mnóstwo tychże potrzeba, iako powszechna matka wynalazków, lub szczególnie zdarzenie odkryło, lub dotąd wynayduie iedne na drugie, w skutkowaniu uwielbia, przenosi, doswiadczeniami ubogaca, a wkońcu i do wiadomości podaje. My zostaniemy tylko w wyborze ich, abyśmy znaleźć mogli wczasie potrzeby dostateczną liczbę skuteczniejszych, a na które się spuścić można, tępomyślniey im pospieszenie użycie ich przedsięwziętóm zostanie, spóźnione zaś albo bardzo bywa obojętném, lub wcale bezskuteczném; a to z dwoiakiego względu, *pierwszego*, że ieszcze przyięty iad nierozpasciera swego wpływu na układ nerwów, na któren szczególnie działa, a co wszystkie znamiona cierpień nerwowych wyżej nadmienionych potwierdzają, iż tenże ieszcze stać się może ułagodzoném, iak w wyprowadzeniu swych okropnych skutków w strzymaném, i tego się nie równie pewniey spodziewać mamy nadziei, ieżeli pospieszenie do wyrzynania lub nacierania obrażonych miejsc, iak się wyżej namieniło przystępujemy, z *drugiego*

znowu, że gdy tenże iad iuż rozpoczyna gatunkowo prawie zrządzoném kurczem działać, szczególniey początkowo na nerwy gardzieli, że też przełykać nie może ciekących rzeczy, przez co iuż się utrudnia branie leków, a czego szczególniey dostrzegamy wchorobie wodowstrel zwaney. (*Hydrophobia*) od ukąszeń zwierząt wściekłych pochodzący, gdy późniey tenże iad przedrażnia cały układ nerwów, i do naywyższego nieładu w swych działaniach doprowadza, iakoż skutki tego żadney wątpliwości nie podlegają, iakoż zapatrujemy się na boiaźń napoiów, na wstręcie do nich, na bystrości wzroku, na przystępującym zmysłowi; przystępuje wkońcu nayokropniejsze szaleństwo, wzmocnienie sił fizycznych aż do ich wysilenia życie zakonczającego. Tu znowu przekonywać się możemy, że iuż o użyciu srodków ani pomyśleć można, zawsze więcę początkowe spieszne zapobieganie przedsiębra-ném bydz musi: Zużywanych dotąd na ten zamiar srodków następujące umie-  
szczam.

Z przygotowań Chemicznych. 1

Węglan amonij (*ammonium carbonicum*) po ziarek pieprzu 3. 4. do 8



włyżce wody co dwie godziny zażywać; stosownie do wieku *np.* od 6. do 8. lat po 3. do 4. od 8. do 10. po 5. i t. d. Można także sole te z dodatkiem kamfory od  $\frac{1}{4}$  części ziarka do połowy całego a nawet i do 2. 5. również do lat wyżey podanych z dodatkiem cukru 20. ziarek — razem w moździerzyku zmięszać i co dwie lub 5. godziny po iednym proszku dawać popijając wodę. Zamiast tych srodków dobrze także służy rozciek ammonij i burztynu (*Liquor ammonij Succinatus*) po 5 do 10 i 15. kropel co 5. godziny także włyżce wody, i popić wodą, w latach zaś wspomnianych od 3. do 5. naywięcéy do sześciu kropel.

### Z o w a d u

Dwa dotąd używają od ukąszenia wściekłych zwierząt, to jest maika (*meloe majalis*.) (*i much Hiszpańskich*) (*cantarides*) Pierwszy za dawnego rządu trzymać nawet aptekarzom w miodzie nakazywano, i z tego pokraiane drobne cząsteczki po dwa razy na dzień używać. Drugi to jest muchy Hiszpańskie iako od pierwszego mocniéy działające, ostrożnié nader używać wypada, i lubo z kilku własnych doswiadczeń tak

na początku wywołania się wodówstrętu, iako i w późniejszy teyże choroby periodzie, potwierdziły swą zaletę. tak żebym tymże Hiszpańskim muchom za ledwie niepierszeństwo nad powyższe srodki przypisował. Muchy te w proszku dawane bydź mają, ato zprzyczyny, że ilość ich na każde wzięcie naylepiéy zapewnia się. Na lat zatem sześć weźmie się 1. ziarko pieprzu, cukru dra: 2. zetrzyć na proszek i podzielić na części 12. dawać z tych proszków 2 lub 3. na dzień w wodzie i popić napojami kleiowemi, iakoto z kaszy, ięćmiennéy, owśianéy, lnianéy wody, — od lat 6 do 12. weźmie się półtora ziarka do téyże ilości cukru, aż od lat 12 do 18. 2 a naywięcéy 3. tychże much także na 12 proszków od 18. i t. p.  $\frac{1}{4}$  części ziarka początkowo, postępując do pół ziarka, naywięcéy takich po dwa na dzień brać, dać wszelako przy braniu tych proszków przestrożę, że gdyby się ten przypadek miał zdarzyć u młodego, a do tego krwistego bądź to u płci męzkiey lub żeńskiey, za wezwaniem znawcy krwi upuszczenie, a nawet i powtórzenie uczynić radzę. Doswiadczałem nawet, że ten srodek znosił rozpoczynające się znamiona wodówstrętu, gdzie ieszcze do użytku z much Hiszpańskich nieprzy-



stąpiłem, że tenże sam dzielnie służył nawet i u niekrwistych lecz młodych.—

### Z wydziału roślinnego.

*Kurzyslad czerwony (anagallis arvensis)* od niemających lat, Pan Brum pierwszy doświadczał skutków naprzedniw wodostrzętowi. po nim doświadczenia pierwszego P. Kartheyzer stwierdził a z ogłoszeń wiele rządów Niemieckich nakazywały zaznaczać każdego z tą rośliną, aby się w każdym domie w nią zapatrywano, nie są i nowsze czasy wolne od ięj zalet, iakoż rządza poty mocne cuchnące, wolną sprowadza stolce, ma zatem niepoślednie przymioty, które całęj teyże roślinie kraju naszego przysznajac, niepowinny dawniey uwielbianych w wodostrecie skutków nadwerezac, powszych wynalazków natłoki. Są rozmaite z tey rośliny przygotowania, iakoto: wyciąg (*Extractum*) woda przekroplana (*aqua destillata*) Sok z niey, i essencia, gdy przygotowanie te pracy i zatrudnień potrzebują, suszona więc cała ta roślina z liśćmi i kwiatami na proszek utłńczona i przesiana niewielkiego potrzebuie zachodu, a przechowana w tey formie daje się od pół drachmy do całęj, a nawet i do 4. szkopułów, wod.

wodwarze teyże samęj całęj rośliny raz lnb dwa na dzień, ilość ta dla skutków wolne stolce sprowadzających urządzoną bydź może, co do wieku, np. na lat 6, 8, do 10. pół skrupuła do całęgo, od 10 do 15. 20. lat pół drachmy, a na starszy wiek zacząć od skrupułów dwóch postępując do całęj drachmy, aż do 4. skrupułów, — Przy użytku tey rośliny zostawać potrzeba od pokazywania się znamion tey choroby, a te powyżey podałem, chociażby najmnieysze się okazywały, do zupełnego ich ustania. Jeszcze ten proszek, a nawet i odwar z liści, kwiatów tey rośliny, i do samęj rany ukąszoney bydź może, iak powinien, użytym, ranę wprzód mocnym odwarem przemywać, maczane chusty na nią przykładac, a proszkiem posypować. Do odwaru na ten zamiar dodawać (*Spiritus Saliſ ammoniaci aqvo*;) rozciek ammonij wodny, kiedy iednak są doświadczenia, że sam odwar mocny tey rośliny w zagojeniu, w przytłumieniu iadu wsciekliźny ranie udzielonego, swą dzielną pomoc okazzał, nie iestem za niepotrzebną mięszaniną, mogąc poiedynczo tenże sam osiągnąć i skutek. — Nasze znowu czasy ogłaszają użycie rośliny żabienca, babki wodnéj. (*Alisma plantago aquatica*.) Robią z niey odwar np. łutów 2. lub



5. do półkwarty, gotując do zostania się kwaterki, i ztego dają po 2. lub 3. razy na dzień po części, żeby ta ilość codziennie spotrzebowaną być mogła. Sądzić wprawdzie o skutkach téj rośliny nie jestem w stanie, rośnie u nas na brzegach rzek, jezior, w rowach, mokrych miejscach, do doswiadczeń powinna być w téj chorobie użytą, dla świeżych odkryciów, i zawiadomienia o nich, potóżyc iéy nie przepomniałem. Ten więc jest wybor srodków przeciw ukąszeniom od węzów, iaszczurek, wściekłych wilków, lisów, psów, kotów, świń, a zatym i przeciw chorobie z nich wypływaiący wściekliznie, wodostretem, zwaney. Położyłem takowy dla użytku, radą jest pracownika, aby się w apteczkach domowych znajdował, nieprzepomnę ich tam umieścić, lepiej i bezpieczniej jest mieć ich zapas, iak niedostatek, nie raz to się doswiadcza, że za szczególną natury dziełaniem nader do obiaśnienia trudném, ieden z tych srodków pomyślnie zrradza skutkowonia, gdy drugi z nich mniéy lub wcale nieużyteczny. — Maiąc więc wybor i zapas na takowy przypadek, można każdego czasu od iednego srodka udać się do drugiego. —

*O ukąszeniach owadu iakoto  
komarów pszczoł  
oss i t. p.*

Ukąszenie takowe ledwie nie za zatrute uważacby można, ponieważ uczą nas doswiadczenia, że owady, zbyt ostrą a zatym i szkodliwą ciekłość przez swe ukąszenia wpuszczają; iakoż: przystępują z palenie, silno bóle, a gdy takowe ukąszenia w miejscach kilku tkliwych, drażliwych, i u tychże osób zdarzają się, przytęczać się zwykła mocna febra i gorączka, zwłaszcza, kiedy przy ukąszeniach swe żądło zostawiają, daleko szkodliwiej działają przy różnych ciądyspozycjach, iakoto szkrofuliczney, skorbutyiczney, artrytyczney. i t. p. *Leczenie* zapobiegając znacznemu nie raz zapaleniu, jest skuteczne początkowe, zaraz po nastąpieném ukąszeniu czynić okładania zimnéj wody z octem zmieszanej, jeżeli nie ma pod ręką gotowego okładania pod Nr: 20 umieszczonego, równie i wodę Gulardową, wino przeznaczyć można. Jeżeli zaś, iak się nieraz przytrafia, bóle i zapalenia się powiększają wraz z obrzniętością, niezwłocznie przykładac chłodne, z lnianego nasienia, rumianku, bżowego kwiatu zmlekiem gotowane, a gdy miejsce ukąszone



dozwala, nawet moczenia w mleku, odwarach kwiatów tychże, Inianego nasienia, do których czwartą część mleka dodać można, a nawet i więcej w dostatku jego; na zmniejszenie wzruszeń febrycznych, usmierzanie zapaleń, zapobieganie ropieniu nader dzielnie się przyczynia dyetta chłodząca, i leki, a że o tych się już przy febrach zapalnych nadmienię, tam więc czytelników odsyłam, a tu tylko dodać przestrożę nader ważną, aby nie drapać mieysc ukąszonych chcąc uniknąć dalszych boleści, ran, nie raz trudnych iak upartych do zagoienia, tém bardzięj przy dyspozycyach ciał wyżył wspomnianych. —

*O chorobach zużytku mięs chorego bydła pochodzących. —*

Dać nam wprowadzić naypospolitszy pokarm, i odżywność domową zwierzęta, ile się znaydują same wstanie zdrowia, (usunąwszy na stronę choroby ich, które żadnego uczęśnictwa zarazy pomiędzy tym lub owym gatunkiem do dalszego rażenia niewydaia, a którym iako ciała organiczne, znatury fizycznęj podlegają.) Podpadaia wszelako chorobom zaraźliwym, i te zarażaią iedne ga-

tunki, gdy drugim też same chorobliwo rażące pierwiastki bynajmnięj nie szkoda, tak może chorować bydło rogate, kiedy bynajmnięj od téj natury choroby nie bywaią thniętymi wieprze, owce, i tak się ma nawzaiem rozumieć: Z względu zatęm zdrowości domowych zwierząt na pokarm służących zawisło i zdrowie ludzkie, iakoż smutne i dość liczne nauczaią doswiadczenia, że wieprzowe, wołowe mięsa, za nim same padły, chęcią niegodziwego zysku, a ochronienia się od straty bite, i na pokarm sprzedawane, zrzędały zgniłe febrę. — Choroby takowe iako przypadkowe nie powinny wyprowadzić znaydować mieysca, gdzie dozorcze oko wgląda w to wszystko, co tylko życie ludzkie przy zdrowiu zachować powinno: wszelako bydz mogą przypadki, a z nich i powstawać choroby zaraźliwe, które nawet udzielić się mogą i wcale z chorego bydła mięsiw nienżywaiącym. Dla uniknienia więc chorób, zaraz z początku, jeżeli bydz może tak spieszo, zanim mięsa te wżółdku nie zaczną się przez proces trawienia rozkładać i pierwiastki swe chorobliwe do krwi bydz doprowadzonemi, gdzie już doleczeniu choroby wybuch nastąpić musi. Użyć proszku zipekakuany na wymiot, aby co



prędkiej przyczynę choroby z zółdka usunąć, poczem zachować się przez dni kilka przy lekkich pokarmach, iakoto kleiach, rosółach, barszczach; przy napoiach kwaskowatych, iakoto: wodą z octem zaprawną, a pod noc wypić skłankę bżowych ziół. Gdyby iednak po dni kilku miały wzruszenia febryczne, gorączka przystępować, i te iako wstęp rozpoczynający choroby uważać, można bezpiecznie dać na wymioty, a o wolnych stolcach zapomnieć nie wypada: na oba te zamiary dawać proszek Nr. 14 polecam. Wreszcie wzmaganie się febrzy, gorączki, rozpoczęcie febrzy zgnilłej lub zgnilłej nerwowój oznaczają, w tym razie postąpić sobie w leczeniu potrzeba podług dać się mianych przepisów przy febrze zgnilłej nerwowój, do których cytelnika odsyłam. —

*O kroście w pospółstwie Żydów.  
ką zwaney. —*

Z powodu, że ta krostka oprócz innych przyczyn powstawać zwykła tręfunkowo z żucia zepsutych niezdrowych pokrmów, do których i mięsiwa chorego bydła iako i ryb należą, ma równie i przyczynę dość często w szczególny powietrza dyspozycyi, tu iey opis kła-

dę dla poznania, obrzmienie dość płaskie rozciągnięte palące i nader dokuczające; skóra brunatno czerwona i mająca często plamki czarne. Nieraz ta krostka nader prędko w gangrenę przechodzi, nie raz dopiero w dni kilka, i ta się okazuje przez popielatawy lub niebieskawy pęcherzyk, na samym końcu obrzmienia. Zawsze do nięj łączą się osłabień, czucia, bóle, zimne poty, omdlenia, nie raz powstałe iako symptom febrzy żoźney, zgnilłej te wszystkie i inne znamiona iako i febrzy, przy których się okazuje, wielkie życia niebezpieczeństwo oznaczają. Nie raz różney bywa wielkości, i do znaczney przychodzi; najpospolicięj obiera sobie siedlisko na karku, pomiędzy łopatkami, a nawet i na tyłku. Leczenie bydz powinno miejscowe czyli powierzchowne, iako i wewnętrzne. Pierwsze zasada się na usmierzeniu stanu bolejącego, palącego, aby ile możności niedopuszczać ropienia, iak łatwo przystąpić mogący gangrenie, i to właśnie czynić wypada w pierwszym choroby stanowisku. Na ten zamiar służą chłodne okładania z rumianku kwiatu, piołunu, ozanki czosnaku, (*teucrium scordium*) kory wierzbj żożyny, wszystko po równych częściach drobno pokraiane: dodać kwasu chlebo-



wego i octu ile do zrobienia gęszczy potrzeba, zwolniwszy często odmieniając przykładać, gdyby iednak spóźniony ten ratunek miał byćdz przedsięwziętym lub i zaraz początkowo przy szczególnych ciał dyspozycyach nie był dostatecznie skutkującym. a miejsce, na którym stała krosta, wraz z nią miały dostawać skorupy gangrenowéy, przywołać lekarza ran, ażeby ten porobił nacinań, dla uwolnienia zgniléy cuchnącéy posoki, i dalsze miał aż do zupełnego zagojenia staranie *Leczenie zaś drugie* czyli wewnętrzne zawiera w sobie oddalenie saméy przyczyny lub też i febry, do której się jako symptom przywzięcie, jeżeli zużytku niezdrowych pokarmów, co prędzey dać na wymioty, i to wskazanie przedsiębrać można chociażby i wpierwszém choroby wywołaniu się, wzruszenia układów ogólny organizm stanowiących, i ich powiększone czynności, iakoto: potów, uryny, wypróżnień górą i dołem, wielce się do wyprowadzeń chorobliwych pierwiastków po zagranicę ciała, a zatym i ozdrowienia przykładaia, dalszy zaś bieg téy febry wleczeniu zupełnie odpowiada febrze zgniléy czystéy lub też i znerwową połączonéy, a że niżej postę-

powania tych oboygą feber się podadzą, do opisu tych środków odsyłam. —

### O przypaleniu i oparzeniu.

Oboygą naybliższym iak następny skutkiem iest zapalenie téy lub owéy części, na którą bezposrednio różne stopnie gorąca, palnych rzeczy krótsze lub dłuższe ich skutkowania działaią, różne też przysiępuia symptomy, ale tym silniéjsze, im miéysca obrażone są delikatniéjsze, czulsze, drażliwsze, zwłaszcza u osób takowych. Można tym skutkom cztery główne stopnie oznaczyć, iak w postępowaniu użycia środków podać. —

*Wpierwszym* a do tego naybliższym stopniu, bywa tylko część zaczerwienioną bez żadnego następnego obrzmienia, chory zaś lekkiego swędzącego gorącego bólu wobrażonéy części doznaje, i przytem żadna febra się nieprzyłącza, *w drugim* inż czerwoność bywa powiększoną, brunatną, okaznie się nabrzmienie, agdy sparczenie lub opalenie iest szersze, przyłączać się zwykła febra znaczniejsza. *w trzecim* znouu albo zaraz lub nieco późniéy od sparczenia lub przypalenia, okazują się na miéyscach obrażonych pęcherzyki napelnione cie-



kłością wraz z obrzmieniem, przytęm iuż bywają febra i ból daleko silniejsze, i te powiększać się zwykły, kiedy miejscami skóreczka przedartą lub wcale odiętą zostanie. *W czwartym* znown stopniu zrządzone oparzenia przez stałe ciała, suche, przez ciekące zaś wary wilgotną, zimną gangrenę wyprowadzają, i ta albo zaraz po oparzeniu przystępuje, lub wskutku poprzedniczego mocnego zapalenia. —

### *L e c z e n i e.*

Oparzenia pierwszych dwóch stopni uważać można za zapalenie, aktóre rozeysć się powinno, iakoż na ten koniec okładania wody zimnój samej lub z octem zmieszanej, woda Gulardowa, woda pod Nr. 20. kartofle tarte lub inne owoce tłuczone świeżo, zioła wraz z ich sokami, iakoto: sałata, szczaw rozchodnik, smarowania olejem lnianym samym, lub z czwartą częścią atramentu, a gdyby towarzyszył ból mocny, można chłodne czynić okładania bół uśmierzające, tu można przeznaczyć śmietankę słodką lub kwaśną, papki z maki nasienia lnianego, tartej bułki z mlekiem, i dodać, gdzie się suche szalein ziele starte znajduje. *W trzecim* znownu sto-

piu uważać należy: jeżeli po oparzeniu lub opaleniu oszczędzoną skóreczka została, powyższe srodki przykładać, i te dość pospieszne ulepszenia sprawiają. a gdyby zaś nie było skóreczki, iuż też same srodki uważać można za drażniące, ból sprawiające, służyć więc nie mogą, a na to lepiej służą olej lniany, śmietana, masło świeże bynajmniej nie solone, lub maść następująca do smarowania: wziąć żółtko od jaj rozbić powoli, dodając potrochu łyżek dwie, trzy, lub ile się tylko da z żółtkiem oleju lnianego połączyć, dodać do tego kleiu z lnianego nasienia z wodą na wolnym ogniu wyciągniętego i precedzonego łyżek parę, lub gdzie się znajduje pchle nasienie, pigwowe, z którym także tym sposobem robić można kleie, i domięszywać, można takż, gdzie nie ma tych nasion, lub zatrudnienie sprawiać rozbicie kleiu z lnianego nasienia, miejsce ich zastąpi białko od jaja, lecz to dopiero po zmieszaniu oleju lnianego z żółtkiem dodać na samym ostatku potrzeba, ubiwszy go wprzód na pianę: chcąc zaś te srodki na miejscu sparzonym przykładać, z którego skórka odeszła; takowe albo cieniutkiem płótnem, lub gazą, muslinem, co jest pod ręką, obwinąć, a na wierzch nadmienione srodki przykładać



Po dniach kilku zwykł się ból zmniejszać, w ten czas lekko stiskających i rozmiękających razem pomieszanych użyć srodków iakoto: oleju, masła niesolonego, smietany, z dodatkiem albo ałunu twardego w wodzie rozpuszczonego np: pół kwintli do dwóch łyżek wody, lub octu z ołowiu (*acetum plumbi*). lecz jeżeli oparzone miejsca są liczne a do tego szerokie, wystrzegać się z octem ołowianym, wody Gulardowej, ponieważ długie ich użycie przez wsypanie części ołowianych zrzucić może boleści w kiszkach. — Obok srodków powierzchownie do przykładania służących, a tu umieszczonych, równie i bez wewnętrznych iakoto: dyety przyzwoliley obeysć się nie można, i te zastosować należy do febry i iey stopnia. Tak jeżeli bywa mocną, iaką bywa przy sparzeniach znacznych licznych, na częściach drażliwych czułych, u osób zwłaszcza iakoz czułych drażliwych, leki i dyeta służą też samo, iakie się przy febrze zapaloney podadzą. Przy sparzeniach zwłaszcza obszernych wzagoieniu starać się należy, aby blizny po nich nie zostały. Co do czwartego stopnia, gdzie, iak się wyżej nadmienilo, gangrena przystępuje, nie można podać srodków, iak tyl-

ko przywołać lekarza ran, aby ten stosownie do okoliczności działał. —

### O o d m r o ż e n i a c h

Każda część ciała, która przez różne stopnie zimna osieroconą została z ciepła naturalnego, bądź to na zawsze lub czasowo, zmienia swą postać obrzmiewa czerwienieie, boli, a miejsca odziębione przechodzą w otwarte rany, lub utratę dalszego przeznaczenia: Nic tu nie wspominam o całego ciała zmarznieniu, przy którym ciekli, włókna tracą swe życie, takowe zdarzenie mieć będzie swe miejsce w rozdziałku czwartym, w tym zaś mówić się będzie o częściowych odziębieniach, nadmieniam, że nie konieczną jest potrzebą aby tylko mrozy i zimna miały rzadzić odziębienia, dosyć jest wystawiać tę lub owę część lub część ciała na zimno i wnet na ciepło, iakoz te dwa naprzeciwne sobie co do wpływów i skutków bodźce dość liczne odziębienia rąk, nóg, palcy w ciepłych izbach zrzadzają, kiedy, iak się ledwie nie powszechnie dzieć zwykło, zmrozów, zimna, wilgości, części te do pieca, kominkow, dla przedszego ich ogrzania zbliżamy. Z tey to przy-  
czyny zwłaszcza u dzieci i starszych na



wet osób tém prędzėj, kiedy ich organ skóry z natury jest udelikatnionym, zbyt drażliwym, niechaj ta przestroga służy nadal za naukę, kto z nięj tylko korzystać zechce. —

### L e c z e n i e.

Odziebioną czyli odmrożoną za świeża część lub cząstkę do ciepła zbliżać lub ogrzewać nie można, ażeby zupełnie się ię na zawsze nie pozbyć, i owszem należy ją wprzód sniegiem trzeć, co czynić wypada dłużej powoli, aniżeli znatężeniem pospiechu pokąd czasowa życia utrata przez powrót ruchu i czułości niepowróci. Lecz i wtém postępowaniu ostrożność zachować należy, aby część odziebnięta przez silne tarcie nie odpadła, co się łatwo stać może np. przy końcu nosa, przy uszach, ponieważ cząstki te nie mają żadnych kosteczek. W niedostatku sniegu można okładać, obmywać też cząstki lub i moczyć większe części w wodzie zimnėj, któręj zięb powiększyć się daie przez dodanie do wody soli kucheunnej i saletry. Po odzyskanyu ruchu i czuciu części odziebniętej, można ię wódką mocną albo kamforową obmywać, samemu zaś choremu dla wzbudzenia lekkich potów

dać ciepło pić bżowe ziółka, albo melisę, herbatę, lub i ciepłe piwo, — Gdyby przypadkiem przez nieostrożność dodano odmrożonęj części zawiele ciepła, a przeto doprowadzono do niezwyčajnego obrzmiewania, bólu, a nawet i czernienia wtych razach nienależy zmieniać srodków, iak tylko nacierać sniegiem, okładać zimną wodą, i to wszystko czynić, co się wyżej podało, lecz jeżeli ten sposób ratowania opóźniono, a gangrena już przystąpiła, co się często zdarza, można jeszcze doswiadczyć, jeżeli uleczenie przez okładania ziół korzennych w wodzie gorącey moczonych, iakoto miętkwi, czosnaku, melissy, kwiatu chmielu, nieco kory wierzbowej, nie nastąpi, a co się często udaie. — Pozostała zaś odmrożonęj części słabość ustępować zwykła przez smarowania wódką prostą lub kamforową, lub gdzie się znajduie, wódką lawendową, kolońską. Utwarzają się nawet dość często guzy odmrożone na częściach, które lekko okrytemi bywają, iakoto na rękach, nogach, nosie, uszach, a na które przemienne wnet zimno wnet gorąco skutkuje, i te obrzmiewania, czyli guzy, miewać zwykły cztery stopnie, Pierwszy z nich stanowi umiarkowaną czerwoną obrzmiałość, i ta powszechnie w umiar-



kowaném cieple szwędzenia sprawia. Drugi znowu toż obrzmienie bywa daleko mniejsze, czerwienisz, nieraz i ciemno niebieskawe, ból, uczucie gorąca, szwędzenie, są daleko niż przy pierwszym stopniu silniejszymi, bardziej dokuczającymi. Trzeci znowu stopień przedstawia się, kiedy na obmarzłym miejscu powstają pęcherzyki wodniste, ciepłość w sobie utrzymujące, a te pękając zrzadzają odeyscie skóry przechodzące wranki, dość często w zagojeniu uparte. Czwarty a najwyższy odmrożenia stopień, już guzy odmrożeń przechodzą w gangrenę, i to się przytrafia po zaniedbanym ratunku. Zwyczajny najpowszechniejszy tym odmrożonym guzom podlegać osoby czują i drażliwą skórę mające, które do zimna nie były przyzwyczajone, lub które za ciepło się utrzymywały, pocenia niedoswiadczały, lub ciasne noszą obuwia, i te także, które przy zmianie zimna jeszcze części ciała zamaczują. Powstają takowe guzy odmrożeń w zimie, a latem następują, i znowu zimną na tychże samych częściach powracają. Najsilniejszą przeciw wszystkim stopniom odmrożenia obroną jest przyzwyczaić się zwolna do zimna, i nigdy za ciepło części odmrożeniom podległe nie trzymać, zimną wodą się ob-

my-

mywać, a kiedy uziębłą nie wchodzić do ciepłych izb pierwę lub temi gorzejsz do ognia lub pieca ciepłego się zbliżać, ale wprzód przez tarcie przywrócić uczucia zacieplenia tych części.

Dwa stopnie wyżej opisane potrzebują środków już nadmienionych, iakoto: tarcia śniegiem, okładania zimną iaką tylko bydlę wodą, lub z dodatkiem soli, iak się wyżej podało, zimniejszą zrobić, na tenże sam zamiar służy woda z pod Nr. 20 do której przygotowania należące rzeczy w aptece domowej trzymaćby należało, kwas siarczany rozcieńczony, woda Gulardowa, pary z octu, okładania cybuli pieczonej, tartęj rzepy załutem, olejem lnianym, lub kopnym, np. rzepy z obierzynami tartęj garści 6. Alunu pół uncyi, oleju tyżek 4. zmieszać to wszystko, i na okładania przeznaczyć, równie się doradza na tarcie olejek terpetynowy, rozmarynowy, iak i moczenia w wodzie wapiennej z niegaszonego wapna, świezo robionej. — Obrażone iednak od przemrożeń części, które się obwiązać i ochraniać iak inne nie dadzą, na tych nosić, iak kogo stać, woskowane płótno, lub taftę pokostowaną, a pierwsze można i w domu zrobić, wzięwszy płótna aby nie było grube, roztopić wosk żół-

Część II.

29



ty wraz z terpentyną np. 5 części wosku 4. terpentyny, i w tém płótno, z którego się robić mają szkarpetki i t. p. umaćzać, ostudzić. — Trzeciego znowu stopnia leczenie jest, przy którym, iak się wyżej nadmienilo są guzy odmrożone bolejące, i zapalone, służą zaspakalające łagodzące srodki, iakoto: przykładania piławek na części odmrożone, okładania i naparzania z kwiatów bzowego, rumianku, bobków, po usmierzeniu zaś boleści, zapaleń, lekko sciskając, służą iakoto: odwar skóry wierzbowey, dębowey, lecz i o dyecie przepomnieć nie należy, wszystkie rozpalające natury napoje, zbyt rozgrzewające i zysniące pokarmy, bez oczywistego pogorszenia stanu zapalenia, użytymi bydź nie mogą, i owszem zupełnie się trzymać dyety, iako się przy febrach zapalnych poda. — Nadmienilo się wyżej; że rany ropiace po odziębieniach bywają trudne i długie wleczeniu, ale w tym przypadku wielce wstrzeźmliwość w pokarmach i napoiach dopomaga, a nadto nie zawadzi, kiedy nie kiedy lekkie Laxowania, przeznaczając na to np. Soli Glaubera łótów dwa, wody ciepley pół kwaterki rozpusciwszy dać rano na czczo wypić, popić herbatą lub rumiankiem, dnia nawet tego za posiłki mają bydź rosoly,

kleie, kasze, iak winne dni służy dyetą umieszczona przy febrach zapalających. Powierzchownie zaś służą podsycające srodki, iakoto: woda Gulardowa, maść tegoż nazwiska, plaster bleywasowy, maść bleywasowa, którą w potrzebie i w domu zrobić można następującym sposobem, wziąć bleywasu miarko tartego łutów 2. masła lub sadła niesłonych świeżych łutów 6 i zmieszać; miasto téy masci można i następujący użyć: — Wziąć koperwasu białego (*citriolum album*) miarko utartego np. ćwierć łóta, do łótów 6 3 masła lub sadła zmieszać i do przykładania przeznaczyć, iako i wodę, miasto Gulardowey, wziąwszy tegoż koperwasu ćwierć łóta do półkwarty wody, do opatrywania przeznaczyć. — Wszelako opatrywanie musi bydź pospieszne, i wszystko wprzód do niego przygotować należy aby przystęp powietrza mocno rany pogorszącego ile możności wstrzymać, równie i utrzymywanie spokoyności części ropiącay się wielce do zagoienia przyczynia, na przypadek zaś zastarzałości tych ran, chcąc ie zagoić radzę, kazać zrobić źródełko (*fontanella*) i toż codziennie opatrywać, iak w przyzwoitey czystości utrzymywać. — Lekarz ran poda do te-



go srodki i wskaże sposób opatrywania. Przechodzące zaś odmrożenia w gangrenę, iak sama gangrena leczoną być ma; a na ten przypadek poradnik nie podać nie może iak przywołać lekarza, zewnętrznego, aby tenże uczyniwszy co do ręcznego działania należy opatrywanie wskazać, jeżeli jego przytomność ciągła, dla niemożności być nie może.

### *O gwałtownym serca biciu.*

Nie dać poradnik żadnej rady na przeciw gwałtownym serca uderzeniom które mogą dość często, albo zwielkości zbyt częstym serca, lub innych wad jego — albo przeszkód przyległych iemu części pochodzi ale tylko iest mowa, że się iako znamiono do wielu, a nade wszystko kurczowych czyli spazmodycznych chorób przylęca, iakosz w macicznych cierpieniach i Hipokodryi dość często dostrzegać się dać równie iak przy zbytnej czułości i drażliwości nerwów, z przyczyn gniewu, smutku, żalu, radości, a nawet i przy użyciu trunków gorących, kawy tęgiej często dniem używanej przy wstrzymaniu stolca, wiatrów, i odpływów zwyczajnych u płci kopieć, dołącza się do niego nieustany śmiech, napadać nawet zwykły cho-

robiwe, drażliwe czułe osoby, podwieczór, udając się do nocnego spoczynku, lub w krótkce po obiednym posiłku. — Zanim się nadmienione gwałtownego serca uderzenia usuną przyczyny przez srodki niżej podane, zktórykolwiek przyczyny pochodzi, tylko na prędcie iako usmierzające dzielnie służy, przykładanie wokolicy serca wody zimnej, w której zmaczawszy gąbkę lub chustę we czworo złożoną, kilka minut trzymając po lewéj stronie piersi, to często powtarzać, bez uprzykrzenia ciągnąc, pokąd toż bicie serca niezwolnie, co nawet za każdym powrotem jego czynić należy, lecz po każdym wody zimnej przyłożeniu miejsce to chustą obsuszyć potrzeba. A że zwykle, że się przy tém serca biciu ciało znayduje w lekkim zapocieniu, nie raz i mocniejszym, na co mieć wzgląd potrzeba, należy więc powoli z przykładaniem zimnej wody postępować, lepiéj się zatem uczyni, pierwéj wolną, dalej chłodniejszą, a w końcu i zimną iak tylko być może przykładając, nie zapominając bynajmniej o osuszeniu chustą suchą miejsca zamokzonego. — Jeżeli od stolca i wiatrów wstrzymania przy zwolnieniu bicia serca przez przykładanie zimnej wody, nieczekać dać enemę wolną zrumianku



oleju lnianego, masła słonego, trochę mydła wod warze tym rozpuszczonego, a w końcu z wody letniéj trzech części a czwartéj octu winnego. — Stósowne do okoliczności. można takowe enemy, nie większe jednak nad kwaterkę co godziny, dwie, powtarzać, dać, miasto herbaty pić *Melisse*. — Jeżeli znowu znadżycia trunków gorących, obok srodka miejscowego. to jest zimnéj wody przykładania kwaskowéj natury napoiów używać, iakoto: wody z octem, sokiem kwasnicy, lub mleka stucznego, które się już wyżéj tyle razy powtarzały. Téż same srodki służą przy témże biciu serca ukrwistych, a nawet i zgniewu, złości radości pochodzącemu, gdzie, ile można takowych wystrzegać się, ze smutku zaś, z żalu, takóž przypomnieć nie można o przykładaniu zimnéj wody, w spokojności chorego zostawić, dając mu po kilkanaście kropel np. 20. wylżce wody (*Spiritus nitri dulcis*), likworu Anodini, powtarzając co godzina aż do zwolnienia bicia. — Kwiśte młode osoby uległe tym serca biciom wystrzegać się powinny użycia trunków rozgrzewających, pokarmów zbyt żywiących, kawy tegiéj, kleiów, zaś legumin, warzyw, zmałą częścią mięs, od których: wyłączyć po-

trzeba wieprzowe, słone, tłuste, kaczkę, gęsi, napoie dla nich naylepiéj służą piwo lekkie dobrze wystałe, często takóž dyetę choleryczne, żółciowe do gniewu skłonne osoby, z dodatkiem kwasów roślinnych, barsezów domowych, a latem szczawiu użyć; przytém wystrzegać się mają tak szkodliwych dla siebie namiętności, od których zwykło toż bicie serca pochodzić. — Osoby znowu, które napastowane bywają od niego pod wieczór, wcześnie przed snem posiłków używać mają; i to lekkich do strawienia, iakoto: kaszy, mleczywa, jeżeli ie złożyć, lub owoce gotowane, a przytém spokojność umysłu zachować. — Upłci zaś kobicéj od wstrzymania czyszczenia zwykłego, gdzie iako symptom zwykło się przedstawiać, poniżej przy opisie téj słabości podadzą się srodki doradcze, wszelako przy napadzie bicia gwałtownego takóž nie zapominać o przykładaniu zimnéj wody, w sposobie i ostrożności tu podanych. —

#### O tak zwanéj marze.

Kiedy we snie daie się uczuwać ciężar przyciskający piersi i tchnienie nieraz zbyt pracowite, morderujące, a nieraz i głośno słyszeć się dające, napada nie-



które osoby, wpospółstwie zajętym od dawnego przesądu nazywać zwykły *marą*. — Pochodzi to od leżenia na wznak, osłabliwie ukrwistych, lub też i u osób słabą trawność mających, gdy też na wieczorny a do tego późny posiłek w krótko przed spaniem idąc, potraw niestrawnych i suchych, lub też i wiatry sprawujących używają. Takowi wystrzegać się powinni na wznak sypiać; dobrze zatem uczynią, kiedy wałek sianiem wypchany podłożą sobie w tyle po stronie, na której sypiać polubnięć są przyzwyczajeni, i tak się spać idąc położyć. Do tego wczesnych kolacyi używać, i to łatwych do strawienia i wiatrów niesprawiających, służyć na ten zamiar, kleie, kasze, iaja miękko gotowane, drobiu białego mięsa pomiernie iedzone, pieczone lepiej niż gotowane, serów kartofli lub tym podobnych wystrzegać się, a krwiści zas spać idąc wody szklankę, nieco octem piwnym, winnym do miły kwaskowatości zaprawną, możnięsi lemoniadę, a inni barszcz domowy, po skłance wypić, i na tem wspiera się całej mary leczenie. —

### *O krwi płuciu.*

Przy téj tręfunkowey chorobie krow zwykła się z zakasliwaniem wypłu-

wać, tu jeżeli jest z kanału powietrznego powszechnie bywa jasno czerwona, rzadka, a z masy płuc pienista i czarniejsza, wszelako stać się może niebezpiecznem z przyczyn, że mniej lub więcej organa tak ważne do życia, któremi są płuca, zwykły cierpieć. Przy krwi płuciu mogą być przytomni, lub nie, febra, gorączka, a te jeżeli trwają, ledwie nie najczęściej przechodzą wciąż i trudną do uleczenia chorobę, również jak kiedy spóźnionym bywa ratunek. Poprzedzają to krwi płucie, lechtanie w gardle, przebiegające liców zarumienienia, uczucia ciśnięć, bólu i gorącości w piersiach pomimo innych przyczyn rządzących krwi płucia, mocowania się, dzwigania ciężarów, prace nęteżone, biegania szybkie, miano wicie wupały, przyciski na piersi, zadania gwałtowne, silne krzyczenia, przystępuie nawet przy katarycznych reumatycznych cierpieniach, i w ten czas najczęściej znajduje się w stanie zapalnym system płuc. Do liczby tych przyczyn należy takos wstrzymanie odpływów zwykłych płci kobiecey, lub hemoroidycznych, więcej ukrwistych, młodych dobrze żywionych, wsily zamożnych, mogą także krwi płucia napastować i słabe, delikatne drażliwe osoby. Ztego przed



stawienia nie tylko co do różnicy samego krwi płucia, ale nawet i co do ciała budowy; dwa stany w krwi płucia uważać należy, chcąc skutecznie temuż zaradzić, nie tylko na wstrzymanie, ale nawet i do częstego powrotu zapobiegania. Poznać więc te stany wypada. Pierwszy z nich można nazwać czynnym, iakosz tego przyczynami są znaczna drażliwość serca i arteriów czyli tętnów, tę przyczynę można nazwać naturalną, dla nięcy to wszystko cokolwiek drażni, co wznieca, co wzburza krew, co nadgromadza ku sercu, iakoto rozgrzania ciała przez natężone jego ruchy, przez użycia potraw korzennych, słonych, przez rozgrzewające napoje, ziab, przez wiatry, przez wzbudzające namiętności iakoto gniewy i t. p. przystępuje i sprowadza krwi płucia w stanie czynnym, (*active*). — Drugi znany stan można nazwać naprzeciwym pierwszemu, czyli stan osłabień bądź to z naturalnej ciała budowy, bądź to z osłabienia, iest wypadkiem przyczyn, do których liczyć można iako naybliższe, wolna, miękka, słabowita ciała budowa, a którą pomnożyć są wstanie następujące przyczyny, iakoto: rozwiozłe życie, częste obcowania, poprzednicze choroby, częste krwi puszczenia, smutki, troski,

nędza, żale, wkońcu to wszystko co krew rozrzedza, a naczynia krwiste do niedostatecznego i słabego działania przysposabia. —

Przepowiedzenia krwi płuciów  
są następujące.

- a) Im mocniejszy i dłużej trwa krwi odpłucie, a ciło słabsze, tym bywa niebezpieczniejsze, iakosz dają się przedstawiać skutki, w mocnych osłabieniach, w ziąbie ciała, w badości prawie trupiennęcy twarzy i w omdleniach, konwulsyach, a nawet i nastąpić mogący z tęcy przyczyny śmierci. —
- b) U krwistych młodych tęgicy budowy, w siły zamożnych, niedostrzegamy wprawdzie powyższych znamion, iakoto: badości twarzy, ciała ziąbu, omdleń i t. d. wszelako wciągu tęcy choroby przy obfitości krwi, wypłucia chociaż w pómniejszym stopniu, przylączyć się mogą. —

Tu ieszcze nadmienić wypada, że różne krwi płynienia, naprzeciw którym oddzielnie przy każdym potrzebne udzielą się srodki ratunku, zwykły stósować się do Epok życia, tak np. młodzi do



odpływów krwi z nosa, starszego znowu wieku, do urynowań krwistych, u płci zaś kobiecej do płynięć z części rodných. —

Nadmienione krwi płucia, iako i następne krwiotoki, o których się mówić będzie, w zarządzeniach koniecznie środków wymagają, które się stosować powinny do tych dwóch różnic, to jest do czynnych czyli mocnych i do słabowitych, które one zwykły zrzządzać.

*Zasady ogólnych leczeń. —*

Te mają nam służyć ledwie nie do wszystkich krwi odpływów, agdzie wypadnie iaki do nich uczynić dodatek, nieomieszkamy takowy położyć. —

Z tych zasad jest nader ważną w którymkolwiek stanie krwi płuciów i krwiotoków, chociażby te i pochodzić miały z naruszeń mechanicznych iakoto: skaleczeń, pchnięciów i t. p.

a) Zachować najzupełniejszą spokojność duszy i ciała, to jest: gniewu, głośnego i długiego mówienia wystrzegać się, zgrzyzoty, nie-smaki od siebie oddalać, i wcierpliwość się opatrzyć. —

b) Równoległe ciała położenie ile możności utrzymować, w łóżku nie

*Leczenie krwi płuciów i t. p. 461*

czynić poruszeń, przewracań, a tём szkodliwiej prędkich okrycia pościeli, nie mogą zbyt ogrzewając być użytymi.

Bez dopełnienia tych zasad i następnych środków użycie, nigdy nieodpowie tak pomysłnie, pospiesznie, ani też ochroni od nowych napadów. —

*Leczenie krwi płucia z powiększoną siłą żywotną.*

Zawiera wsobie dyetetyczne i lekarskie środki, a że o tych już się przy pierwszym stanie zapalenia mówiło, co się więc tam podało, wszystko użyć należy przy czynnem krwi płuciu, aby przez też środki bynajmniej ile tylko jest w sposobności naszej wszelkiego unikać krwi wzburzenia. —

*Leczenie krwi płucia z umniejszeniem siły żywotnej czyli ze słabości.*

To znowu zawiera wsobie użycie środków, które mogą i miejscowe i ogólne osłabienia znieść przez użycia leków wzmacniających, posiłków dyetetycznych, a przeto i zapobiegać krwi dalszemu rozrzedzeniu, na ten zamiar skierujące, wzmacniające w pomoc przy-



brać należy. — Z pierwszemi iednak postępować wypada, aby od łagodniejszych zacząć postępując do mocniejszych. — Tu służą początkowo odwary z ziół rzepicy (*Agrimonia Eupatorium*) (gniazdoszu, przywrotniku) (*Alchemilla vulgaris*) (Święto Jąskie ziele wraz z kwiatem lub samego) (*herba vel. cum floribus hipericonis*) do których dodać można nieco kory wierzby kruchey, ale ta jest skuteczną z młodych rocznych gałązków z dwu lub trze hletnię, wierzby pospolitey (*salix alba*) np. którego z tych ziół i kwiatów po garści dobrej, półgarści skór nadmienionych gotować w kwarcie wody do zostania się półowy, przecedzić, osłodzić miodem lub cukrem, przestudziwszy dawać po parę tyżek od iedzenia naraz co 2. lub 3. godziny i popić wodą. — Zwazać więc na skutek tych srodków potrzeba, a gdyby tenże po 2. lub 3. dniach nie miał się dość porządnym okazać, następujących bardziej sciskających w pomoc użyć należy, zwłaszcza przy rozwolnioném miękkim, wężniastem, obwisłym bladém ciele, srodkami temi są kurze ziele (*radix Tormentillae*) kory dębowe, i żelazo moczone w occie winnym, którego przepis znajduie się pod liczbą 26 kurze ziele może bydź w odwarze i ko-

ra dębowa gotowanemi, np. wziąć 16t 1. 2. kory korzenia gotować w kwarcie wody do zostania się półowy, przecedzić, osłodzić miodem i dawać takż po parę tyżek od iedzenia na raz co 2. lub 3. godziny. Alun wproszku z cukrem po żarek pieprzu 10. do 15. co 3. godziny wlyżce wody, i popić wodą, aco się dotyczy kropli robionych z octu i żelaza, te albo same wlyżce wody otymże, co wyżej, czasie po 15, 20 dawać, lub można też tyżkę stołową wlać do odwaru z kory dębowey albo kurzego ziela. — Ostrzegam, że te srodki razem brać nie wypada, ale są one umieszczone do wyboru, gustu chorego, lub uczynić wbraniu ich odmianę. Przy użyciu tych srodków, chociaźby i napad krwi plucia lub innych krwiotoków ustał, czas niemały pozostac, a tém dłużej, kiedy one są wypadkami budowy ciała, którey rys wyżej dodałem. Nadmienię tu muszę, a nawet i przestrozę umieścić, ażeby tak przy czynnych krwi płynieniach lub pluciach, iako i ze słabości pochodzących, wystrzegać się używania wszelkich potraw trudnych do strawienia, lub wiatry sprawuiących, oba te gatunki takowych pokarmów mogą się znacznie do pogorszeń przyczynić, nadymając żołądek, kiszkę, cisną bło-



ne przedziałową płuca, a oprócz że technienia krótkie sprawiają, równie i powroty lub powiększania krwi płuciów i innych tej odpływów sprowadzają. — Należy i uważać należy, aby wolne natury oddychy utrzymywać, na przypadki zatem wstrzymanego stolca, przez branie enemow wyżej tyle razy powtarzanych, niekoniecznie codziennie, ale przynajmniej co drugi dzień jest potrzebne.

#### *Zachowanie się potrzebne.*

Dyeta zaś w tym stanie osłabienia jest następująca, iak wcale od powyższego stanu różniąca się tu bezpiecznie służą pokrzepiające siły pokarmy, iakoto: rosoly mocne, galarety mięsne, klęie z kaszów, iaja same, z mlekiem smietankę rozbitą, polawki z piwa samego, wina na wpół zwodą lub piwem gotowane; miernie przestudzone, pieczone nawet z drobiu białego mięsa, papki z mąki żytniej wprzód w worku płóci nuyim mocno gotowaney, iak naylepię wysuszoney, a potem przesianej, w następujący sposób robionej wziąć łyżek dwie takowey mąki, mleka do rozrobienia ile potrzeba, na wolnym ogniu do mierney gęstosci gotować, można do upodo-

ba -

bania osłodzić cukrem; a nawet i dodać masła świeżego łyżeczek parę, i to często przez dzień po łyżce na raz, lub też i na ieden posiłek parę razy stósownie do apetytu używać, — Takoz i klę z porostu płucnika (*Lichen Pulmonarius*) którego u nas iest podostatkiem, rośnie obficie na starych dębach, wprawdzie gorszko smakujący, sciskającego smaku, przecie goryczy znaczną część odjąć mu można, moczając tenże godzin kilka, dobrzę z wody wycisnąwszy suszyć w cieple, z tego wziąć garści dwie, trzy, gotować w półtory kwarty wody do zostania się połowy, precedziwszy znowu parować aż do lipkości, tę osłodziwszy brać po łyżce, dwie często przez dzień. Takisz klę posilający robić można z korzenia storczyku samcowego (*orchis mascula*) (lub storczyku kukawki) (*orchis militaris*) które dobywszy z ziemi, oczyścić z nich skorupki, opłókać nawlec na nitkę moczyć godzin 6. w zimney wodzie, potym przez półgodziny gotować i wcienu ususzony do licznego użytku zachowywać, z tak przygotowanego korzenia można następującym sposobem robić klę, przetłuc tenże w moździerzu, wziąć parę łyżeczek od kawy, do półkwarty wody wrzucić, powoli w garnuszkę mieszać do niego dodawać,

Część II.

50



zagotować razy kilka, takż mięszając, aby się nie skawalał osłodziwszy cukrem lub miodem często brać po łyżce, klej ten rozciąciwszy wodą letnią można za napój nader pomocnie używać. Tu przepisana dyeta służąca wstanie osłabienia przy krwi płuciu, lub i winnych krwiotokach, może być wskazaną z dobrym skutkiem i przy czynnych krwi płuciach, krwiotokach, nadewszystko w przypadkach gdyby były obfite nie tak prędko wstrzymać się dające, chorego znacznie zsił pozbawiały, a co się dotyczy tych klejów tu podanych, mogą być bez najmniejsz obawy używanemi. — Jeszcze tu dodaję upominek, ażeby osoby podległe krwi płuciom i krwiotokom żadnych obcisłych sukien, a płeć zaś kobieca brygłów nienosiła, ieżeli pragnie swe zdrowie utrzymać, inaczey próżna iest z głuchym rozmowa. —

### *O wymiotach krwistych.*

Poprzedzać ie zwykły następujące znamiona, uczucie ciężaru w sercu, bólu w okolicach żołądka, nieraz i dość znaczne; po nad żołądkiem bicia tętnow, dopiero przystępują wymioty a zniemi krew wnet czarna zgęśla, wnet ciekąca.

wraz z potrawami po ich użyciu lub bez nich — Znamiona te dość często niebywają przytomnemi w poprzedzaniu tych wymiotów — Oprócz wielu przyczyn zrządzących też wymioty, iako to: ostrość żółci, zanieczyszczania flegmiste żołądkowe, ostrych korzeonych przypraw użycia lub trunków zbyt rozpalających mianowiciey u młodych krwistych osób, zwykły nawet przy tych wymiotach lub po nich zimne poty krwawa biegunka, kolkowe boleści, przyłącza się i te lubo zwolnienia zdaig się zrządzać, wszelako po dni kilku nowy tychże wymiotów przystępnie napad. Oprócz wielu przyczyn te, wymioty wzbudzających, położemy te które się dość często przytrafić mogą, a temi sa gwałtowne w okolicie żywota uderzenia, mocowania się, dzwigania, lub też spadnięcia z umiarkowaney wysokości, powstać takż mogą u płci kobiecey z przyczyn wstrzymanych czyszczeń, u męszczyzn hemoroidycznych płynięć.

### *Leczenie tych wymiotów zawiera w sobie trzy uwagi. —*

Pierwsza stanowi w samym napadzie użycie środków na ich wstrzymanie.



Druga po ich ustaniu usunięcie przyczyn, które takowe wyprowadzać są wstanie.

Trzecia przedsiębrać środki wzmacniające, aby na nowo nie powracały.—

*Środki służące do tych  
uwag.*

Do pierwszej należą częste obmywanie nóg ciepłą wodą z octem zmięszaną lub winem, dawać enemy 2. lub 3. na dzień, z oleju lulanego, masła, wody, mleka, serwatki, odwaru rumianku, do picia rozcieńczony wodą kwas siarczany Nr. 52. okładania żywota czynić, jeżeli latem, świeżym szaleciem przekraianym i wplotno zawiniętym, zimą zaś suszonym takż wplotno zawiniętym, powinien być pierwszy wuacznik z wodą zagrzaną — Do tych środków dodać można przyłożenie na żywot plastru z much Hiszpańskich, Synapizmów, stawiania banków. —

Do drugiej jeżeli te Przyczyny zawierają w sobie powyższe, to jest zgnatownych uderzeń w żywot, mocowań, i t. p. nie zawadzi osobliwie u młodych krwistych małe uczynić krwi upuszczenia lub na żywot po kilkanaście piławek przystawić, niezatrzymując bynajmniej

odpływu ię, okładania żywota ziołami, korzennymi, iakoto: Melissą, miętkwią, piołunem, wodą gorącą sparzonych, a na wierzch skrapiać materacyki, wódką kamforową, lub i samą okowitą: z Leków zalecam nadmienioną wodą z grzanką do niley kwaskowatości rozcieńczonym kwasem Siarczanym zaprawną, osłodzoną cukrem lub czystym miodem, służą takż nalania z pod Nr. 11. lub w następstwie kwiatu tranku gurnego, kwiatu Sto Jan'skiego samego lub razem z zielem dawać po łyżce 1. 2. co parę godzin, Można takż lekko bardzo smarować żywot maścią Nr. 21. znowu iesli pochodzą z zatrzymanych miesięcznych odpływów, można krwi z nóg upuścić, nogi wlepieć w wodzie z gorczycą moczyć, reszta środków podane zostaną przy opisie tej choroby niżej położonej, Jeżeli wstrzymanie Hemoroidów, otwarcie ich przez piławki do stolca przyłożone, półkąpiele w wodzie letniej porazie iednym codzień chodzenie, iężdżenia umiarkowane czynić, wysztrzegać się rozgrzewających napoiów, potraw korzennych, cybuli do nich. Jeżeli od wstrzymanego stolca, dawać enemy wyżey nadmienione, okładać żywot z odwaru rumianku, lnianego, nasienia, mydła, i te często odmieniać,



dawać proszek Nr. 6go pół kąpiele wle-  
tniej wodzie 2. - 3 razy na dzień po-  
wtarzane. —

Do trzeciej znowu uwagi należy  
ściśle wznacniająca żywiącą zachować  
diety, a ta właśnie służy która się powy-  
żej przy słabym osłabieniu krwi płuców  
i krwiotoków pólta, przy tym czas dwu-  
tygodniowy pozostać, pozwoli do tward-  
szych posiłków postępować. — Z srod-  
ków lekarskich służy odwar z porostu,  
krzyżownic, kór wierzbowych, które się  
powyżej podały.

### *O moczu krwistym.*

Krew odpływać może z uryną, ten  
gatunek odpływu rozróżnić należy od he-  
morrhoidalnego płynienia pęcherza, że  
krew czysta płynie. Wszelako płynąć  
może z kanału moczowego, pęcherza, lub  
nerek, w pierwszym przypadku powsze-  
chnie bywa czystą, w dwóch zaś osta-  
tnich bywa z uryną zmieszana, i przy  
tych towarzyszą miejscowe bóle woko-  
licach pęcherza do których przyłączają się  
i nerek. — Mogą te krwi płynienia na-  
der łatwo zrazić, zwłaszcza u młodych  
krwistych osobliwie w upały, nadużycia  
trunków rozgrzewających, potraw ko-  
rzennych częste icedzenia, lecz oprócz

tych przyczyn są częściej nierównie i  
następujące, iakoto: z upadnienia zude-  
rzenia mocnego w okolice części mocz-  
wych, skakania nierozsądne i. t. p. Ma-  
jąc zatem wzgląd na takowe przyczyny  
podają się środki do nich, końcem le-  
czenia tego płynienia z nich pochodzą-  
cego.

### *Leczenie.*

Do uwag, na które być baczny  
wleczeniu potrzeba, należy usmierzanie  
boleści, jeżeli te są przytomne, tym  
bardziej kiedy się do nich przyłączają  
mocniejsze lub łagodniejsze febryczne  
wzruszenia. — Tu więc służą sztuczne  
mleka, z bani ogórków, konopnego na-  
sienia robione, a tych już się dał przepis  
w wielu miejscach pisma tego. Mleka te  
sztuczne można za napój używać, a po-  
miedzy te służy i następujący środek,  
wziąć oleju lnianego, czystego świeże-  
go np. półkwatki, rozbiwszy dwa żółt-  
ka od jaj dolewać potrochu oleju, mie-  
szając nieustannie, aż się pomieniona  
ilość oleju iak najlepiej połączy, osło-  
dziwszy do upodobania cukrem miłym  
lub czyszczonym miodem, często dniem  
po pół łyżki zażywać. — Po ustaniu bo-  
łów albo gdy tych niemasz i febrycz:



nych wzruszeń, oprócz tych sztucznych mleczyw, lub samego mleka zwodą zmieszanego, alboż odwarem korzenia storczyku, o którym się wyżej mówiło, również z dobrym skutkiem służą odwar kwasnicy suszonej, albo sok iey zwodą, lub sama woda z kwasem siarczanym lub octem mocnym, co się pod ręką znajdzie. — Okładania zimnej wody okolic dróg moczowych, lub obmywania tych często powtarzać. — Przy tych środkach zostawać należy aż do polepszenia, a gdyby to opóźnić się miało, wtenczas służą środki, które się przy krwi pluciach ze słabości pochodzących umieścili. — Leczyć tu spokojność ciała, duszy, dyeta przypomnianemi być niepowinny, w czym się zachować mają stosownie do podanych przestrog i przepisów.

*O zbytecznych a do tego często napadających czyszczeniach miesięcznych. —*

Pomimo innych wad organicznych mogą mieć za przyczynę tarcia tych części, jakoto: tancowania, pożądliwe bodce, bądź to fizyczne lub moralne, użycia potraw zbyt żywnych, korzennych, napoiów rozgrzewających, słabość ciała lub tych części miejscowa odziedzi-

czona, noszenia cięższych bryków, dzwigania ciężarów, prace natężone, złości, pożądliwości i. t. p. —

### *Leczenia.*

To wniczem się nie różni od poprzednich krwi odpływowi ich różnicy, o których się wyżej mówiło, i też same służą do nich wskazani srodki, dyeta iako i inne warunki: np. zupełna spokojność duszy i ciała. Z tym wszystkim gdyby długiego czasu usunięcie tych przyczyn potrzebowało, a odpływ nawet był nader obfity, temu miejscowo wprzód zaradzić wypada, na ten koniec zalecam okładania wodą zimną z octem zmieszaną żywota, części wstydlwych, lub na wpół przykładac kieliszki wodą ciepłą rozgżane na brodawki piersi, wkładać w pochwę maciczną uwinięty zplotna wałeczek któren wprzód w rozpuszczonym ałunie w wodzie umaczać np. Ałunu łót ieden do półkwarty wody, a po półgodziunym lub dłuższym nieco czasie powtórzyć można, toż i na ten koniec użyć skubanków w rozpuszczeniu ałunowym maczanych gdzie niema pod rękę gąbki któremi pochwę wypełnić wypada, lub sprycowania z wody i ałunu po raz dwa trzy dniem robić, gdzie się to



da uczynić. — Po ustaniu zupełném nie-  
radzę się zaraz poruszać, unikać gniewu,  
potraw wiatry sprawujących lub tru-  
dnych do strawienia, a tém bardziey  
takowych, które się do nich przyczynia-  
ją, co do wszystkich przyczyn rozcią-  
gnąć wypada, dla uniknienia ciągłych  
chorób, które byż muszą wypadkami  
tego odpływu.

### *O krwi płynieniu Macicz- ném. —*

Płynienie to wcale się różni od czy-  
szczeń miesięcznych i połogowych, ia-  
koż niema z niemi żadnego związku, na-  
pada dość często wolne od ciężarów,  
rodzące, a nawet i ciężarne, w ten czas  
poronienie jest spodziewane, Przyczyny  
oprócz połogów przy których się zda-  
rzają, gdy o tych wroździatku następ-  
nym mówić się będzie, są gniewy, zło-  
ści, uderzenia mocne wżywota część ni-  
ższą, upadnienia, dzwigania, wypręże-  
nia, mocne potknięcia i t. p. Dla roz-  
poznania więc i rozróżnienia tego odpły-  
nienia od innych umieścić postanowi-  
łem, środki zaś naprzeciw temu działa-  
jące, są też same, które się przy zbyte-  
cznych upływach wyżej podały. —

Do tych płynień należałoby iesz-  
cze domieścić i płynienia hemoroidy-  
czne lecz że te są powiększey części sku-  
tkami rozmaitych przyczyn, iakoto: zat-  
kań wątroby, sledziony i wielkich na-  
czyn krwistych wzywocie, przez sie-  
dzenie ciągłe, prace umysłowe lub też  
i nadużycia trunksów gorących nabyte,  
nie należą więc do płynień zwyczaj-  
nych iako raczey chorobliwych, a tym  
więcey kiedy i często i obficie krew  
z naczyń hemoroidycznych odpływa, i  
te powszechnie napastować zwykły oso-  
by wyżey wymienione życia prowadzą-  
ce, gdy pracujący, używający poruszeń  
ciała są od nich wolnemi, pierwsi za-  
tym na przypadek ten znaleźć mogą radę  
u Lekarzów, gdy lud wieyski będąc od  
nich wolnym, żadney nie potrzebuie.

### *Wstrzymanie naturalnych czysz- czeń.*

Dwoiaki stan do rozpoznania zоста-  
ie, pierwszy kiedy czyszczenia w cza-  
sie zwykłym wcale się nieprzedstawia  
i to przytłumieniem *drugi* kiedy płynę-  
ły a ustaia zastanowieniem, zatrzyma-  
niem, nazywami. W obu tych przypad-  
kach towarzyszą następujące Symptomy,  
iakoto ociężałość głowy pól tęskności bi-



cia serca, osłabiona strawność, wybladłość, obrzmiewania powłazeczne, i same opuchliny, inne zastępcze krwi odpływy, osobliwie, w krwistych temperamentach, w kwitnącym wieku, iakoto: krwi płucia, usiłowania hemoroidyczne, technienie krótkie, prędkie, chociaż przy powolnem ciała poruszeniu mordowania się. Pomimo przyczyn które zajmować mogą wady organiczne, powszechnemi są, słabość ciała ogólna, niedostatek drażliwości, która się przez obrzmiewania ciała, ociężałość, powolność w chodzie przedstawia.

#### Leczenie.

Do niego obok ociężałości i niechęci chodzenia, poruszenia ciała rozmaite, iakoto: łancowanie, jeżdżenia, pierwszą prawie stanowią ratunku zasadę, i tu pomagają suche nacierania żywota, krzyża, udów, nóg, ze środków lekarskich Nr. 5. do którego dodać można kropli z żelaza Nr. 28. wczwartę części. — Biorąc czas nieiaki te krople, można pomiędzy niemi uczynić odmianę, zażywając proszek Nr. 6ty przez dni dwa, po nich znowu wrócić się do kropli. — Na przypadek, gdyby te środki po używaniu ich przez czas niemaly, zamiar-

#### O wstrzymaniu czyszczeń it. d. 477

wi nieodpowiedały, iak się dość często zdarza, wtenczas sądzić możemy o niedość sprężney, zastabey, leniwey włókien mięsnych czynności, przy których zamulenia, zaflegmienia części zapładzających są przytomnemi, można więc śmielej do drażliwszych środków użycia przystąpić, które winały nader ilości rozpocząć, czas nieiaki przy nich pozostać, i dopiero powoli dozę ich powiększać. Środkami temi są np. bobki tłuczone, nasienie z marchwi, Mira, aloes, iakoż można z nich zrobić proszek w następujący sposób: wziąć bobków lub nasienia z Marchwi łót ieden, cwierć łóta Miry tartey, cwierć kwintli aloesu, cukru łutów 4. zmieszać na proszek, albo miasto aloesu dla zbyteczney jego goryczy i przykrości w zażywaniu, proszku z korzenia ciemierzycy czarnęj tęż ilość, dodać jeszcze zniemałym skutkiem można szafrana cwiesć kwintli. Z tego proszku właśnie wczasie okazującym się przez następujące usiłowania natury, iakoto: ociężałość stawów, całego ciała, wzniesienie i nadęcie żywota, kolki, i krzyżów boleści, dawać po razy dwa lub trzy na dzień na dobry koniec noża w wodzie, i popić wodą, albo też i gotowaniem następujących: ziół, np. bylicy, róży czarney, lub bylicy bożej



go drzewka (*artemisia abrotanum*), rozmarynu, którego się z nich podobą, do kwarty wody dobrą garść zagotowawszy raz, przykryć naczynie, od ognia odstawiwszy dać ostygnać, przecedzić i pić po pół filiżanki za każdym proszku zażyciem, a oprócz tego, można resztę wypić przez dzień, i tak dalej czynić należy. Do tych środków służą także, nóg moczenia w wodzie z solą lub odwarem z korzenia tataraku, którym nawet i naparzenia po razy dwa na dzień czynić, bańki wietrzne na niższej części żywota stawiać, podwieszowania po nad kolanami na kwadrans czasu dwa razy dniem przedsiębrać.

Przy używaniu tak mocnych środków następujące uwagi umieszczam, pierwsza z nich jest aby wczasie usiłowań natury i przedstawiających się przez nie znaków, o których wyżej mówiliśmy, żadnych kwaśnych potraw nieużywać, w innym zaś czasie iak najmnięj, takowe bowiem wielce się do zmniejszania ciepła naturalnego, iako i powolniejszego krwi wżycie krążenia przyczyniają, druga, że środki ostatnie, iak się wyżej nadmienilo, rozpocząć w małej ilości, postępując z ich braniem, iednak nie radzę odważać się dawać, do złości skłonny, młodym, krwistym nigdy,

gdy dobrze zastosowanemi bydź mogą chociaż i u młodych, lecz w temperamencie zimnym flegmatycznym, Trzecia zawiera w sobie pomocną radę, utrzymywania ciepłe części rodnych, żywota, nóg, Czwarta żeby pomiędzy używaniem tych środków choć raz w parę tygodni brać na laxowanie, i na to przeznaczają się proszek z salappy od 20 do 30 ziarek, którego zażyć rano naczczo w wodzie, popić herbatą, lub melissą, rumiankiem, i dnia tego wstrzemięźliwie się w iedzeniu zachować, nie używać nic ztwardych do strawienia pokarmów, piąta: że środki mocniejsze iak mogą bydź pomocnemi przy powyższych konstytucjach, tak nader szkodliwemi się stać mogą w krwistych temperamentach, cholerycznych, drażliwych, a tu osobliwie służą małe z nóg krwi puszczenia, nóg moczenia, do pół ciała kąpiele, Sól Glaubera po ćwierci łota po razy dwa co drugi dzień w letniej wodzie rozpuszczona do brania, piławków stawienia na częściach wstydliwych, a dyeta mnięj zwierzęca iak szczególniey roślinna się zaleca. —



*Przyczyny do zastanowień plynień miesięcznych są następujące. —*

Nagłe zaziębienia, silne gniewy, przelęknienia, troski, nieprzyjemności, używanie kwaśnych potraw, sciskających, zimnych napoiów i wiele innych błędów w dyecie, których się ta płeć często dowolnie dopuszcza. Jeżeli takowe zatamowania przystępują z tych przyczyn nieraz powstają nagromadzenia krwi do głowy, piersi, przystępują zawroty głowy, szum w uszach, ból oczów, obrzmienie twarzy i czerwoność zbyt uczona policzków, a co do piersi, dech krótki, kaszle, nieraz przyłączać się zwykły i cierpienia nerwowe, iakoto: kncze żołądka, kiszek, trętwienia, omglenia, sciskania szczęk, płacze, śmiechy, łkania bicia serca i t. p. Leczenie zatem w tym przypadku niecierpi zwłoki, osobliwie ukrwistych, młodych, są potrzebne następujące ratowania, krwi upuszczenia z nóg, nóg moczenia, pół cieple kąpiele, okładania ciepłe żywota, części rodnych, odwarem rumiankowego kwiatu, wewnątrz zaś dawać essencją bobrową po 30. kropel wylżca wody co 3. godziny lub też samą essencją ulotną (*Tinctura Carstoria Aethetica*) albo wziąć 1. 2.

do

do 3. pieprzu ziarek stroju bobrowego suszonego na proszek z trochę cukru i tyleż żarek szafranu zmieszać i dawać w tymże czasie zażywać z niemałym skutkiem użyć można samego proszku z Jpekakuany, wziąwszy wagi pół ziarka z cukrem zetrzyć na proszek, i także dawać iak powyżej, można do niego mieszać cukru lub i z nim proszku z kózka (*valeriana*) ziarek 10. do 15. domieszywać. Przy tych srodkach zostawać aż do powrotu czyszczeń, ale jeszcze raz powtórzyć, aby się nie zaziębiać, i unikać tych wszystkich przyczyn wyżej podanych, które się do zastanowień ich tak silnie przyłożyły. Nieraz ta płeć kobieca przed nastąpieniem ich doznaje znacznych boleści, wymiotów, kolków, spazmów, w łędzwiach i Krzyżach bólów, i tu można tychże samych użyć srodków, które się tu umieściły, z dobrym skutkiem radziłem przed przyściem regularności użyć proszku Jpekakuany sposobem wyżej podanym, aby kilka lekkich wymiotów zrządzić. —



O białych z części rodnych  
płci obojga płynie-  
niach.

Odplywy te mające do rop podobieństwo, mniéj lub więcéj ostréj lipkości lub kleykości z kanału moczowego u płci męzkiéj, a u kobiecéj zaś z części zewnętrznych pochwy macicznej i saméj nawet macicy, a te rozróżnić od nieczysty obcowania potrzeby, lubo i te być mogą skutkami okazać się, początkowo zaś nie przylacza się do nich ból i zapalenie, iak dopiero w dalszém trwaniu, zwłaszcza przy szczególnéj dyspozycji, płynienie to staie się ostrzeysze, gorętsze, szczególnie u kobiet, u których to obrzydłe złe zwielu przyczyn bywa w leczeniu uparte. Może jednak czas nieiaki trwać u téjże na pozor okazującéj się zdrową, i żadnéj na ciele zmianę dostrzedz nie można, daley iednak przystępują schudnienia, słabowitości, boleści lędzwi, krzyżów, płuc, żołądka, strawność i pożywność słabieją, odbijania, wymioty, nieregularne stolca oddawania, drżenia i chwieiania się członków, osobliwie nóg, daley przylączają się tęskności, serca mocne bicia, przy małych to większa ciała poruszeniach, iakoby sklniące, zawilgocone oczy, nie-

bieskawe pod niemi obrączki, obrzmiewania twarzy, powiek, płynienia miesięczne nieregularne, zaszcupłe lub obfite, a przy nich pomnaża się też płynienie, materya staie się żółcieyszą, ostrzeyszą a nawet i cuchnącą, przystępują w skutku takowego płynienia wystąpienia macicy (*prolapsus uteri*) poronienia, niepłodność, w końcu materya płynąca coraz staie się gryzącą, razi części, zapala je, utwarza wrzodki cuchnącą ropę sączącą, pomnaża się coraz powszechna słabość, obrzmiewania całego ciała, kaszel suchy, poty mocne, kleiste, odplywy krwiste, febra i gorączka trawiące, i te życie zakończają. U płci zaś męzkiéj oprócz płynień z kanału moczowego iest jeszcze i powierzchowne pod skórą przykrywającą, i to przez zaniedbaną czystość może się stać ostrą, robić wtychże miejscach raneczki Przyczynami do téj choroby są oprócz następujących, nadpływ chorobliwego wydzielania się kleiu wte części, a do odlegleyszych czyli zwyczajnieyszych należą: słabość, chorobliwa drażliwość tych części, i to nawet wszystko, cokolwiek takowy stan zrzadzić może, iakoto: życie rozwiozłe, lubieżne, nędzna pożywność tłuste potrawy, rozgrzewające, a do tego ciepłe, rozwalniające napoje, osłabiają-



ce, namiętności, iakoto: troski, żale, smutki, nędza, i t. p. chorób częste napady, oddziedziczone, tychże części osłabienie, lub wskutku częstych a do tego ciężkich połogów, krwi odpływów, lub wstrzymania zwyczajnych nabyte, do tych dodać można nieczyste obcowania, samogwałty; naparzenia się niepotrzebne, nosenia ciśnących bryków, pozostałe nieczystości po połogach, zaniedbane umywanie się wczasie połogu, niechęć do karmienia piersiami matki swych dzieci, słowem to wszystko co drażni, co osłabia, co nagromadza do tych części krew, a znią i ciekłości kleiste lipkie. —

Srodki doradcze zasadzają się na dwóch warunków nader ściśle dopełnieniu, bez tych i naylepszego skutku leki zostaną bez użytku: —

Nayprzód odmienić zupełnie dietę, zaniechać używania mięs tłustych, ciast, mącznych potraw, i zawięle roślinnych, przeciwnie wszystkie te potrawy być powinny bardzo łatwemi, do strawienia, a do tego mieć własność posilającą. — Znapoiów także wystrzegać się herbaty, i ta im bywa tęższą tem szkodliwszą z powodu, że zbytecznie nerwy drażni, ieżeli ją dla polubności używać chcemy, powinna być lekko robio-

na, a do tego dodać można łyżeczkę araku, rumu, wody cynamonowey, wody z kwiatu pomarańczowego, wina burgońskiego, francuzkiego, atoli w tym przypadku przeniósłbym nad herbaty użytek, i zamiast iey miętkiew pieprzną, macierzankę (*urpilum*) szalwią tak niegdy sławną, i to zwielu ważnych użytków, aczkolwiek mnię dla podniebienia smakowitą: tu należy takż na herbatę sto ziarn; albo kapucinska cherbata (*chenopodium ambrosioides*) można w prawdzie używać kawy, iak popolicie się piie ze smietanką, przecie znierównie większym skutkiem służy na wpół z żołędią paloną. Na ułagodzenie ostrości humorów, można użyć odwaru z korzeni Łopianu, perzu czarnego, slazu, wziąwszy każdego po garści dwie do półgarca wody, gotować do zostania się połowy, przecedziwszy ostudzić i co dzień takową ilość wypić po sklance, wyłączwszy godzin dobrych trzy po iedzeniu. Lekarstwa znou na umocnienie służy i ogólnie i miejscowo, z powszechnych służy kóry wierzbowe wyżey wspomniane, kto może, chine, z dodatkiem do każdéj filiżanki kropel 15. do 20 pod Nr 28 zmieyszcowych służy sprycowania z odwaru ięczmienia, rzepaku, ziela (*agrimonia*) np. do kwarty



wody, ięzmiennęj dodać rzepaku dobrą garść, zagotowawszy przecedzić i na tenże użytek przeznaczyć, sprycniać się po razy dwa na dzień, to jest rano i na noc, można także wtym odwarze zwinięte płótno w wałeczek umaczać i wczęści głęboko włożyć, nieżle także służą nakadzenia się nad mierzę, mastixem, a gdyby te nie miały skutkować, co się dość często zdarza przy długich płynieniach; od łagodnych i lekkich sprycowań które się podają, do mocniejszych przystąpić: tu więc służą odwary z kór wierzbowych, dębowych, woda zimna wapienna, obmywania zimną wodą niższej części żywota, krzyżów, po razy kilka na dzień powtarzać, przy tych środkach dobrze służy iężdzenie konne, otwarcię mówiące, że daleko użytecznięj, skutecznięj bywa zapobiegać wczesnie początkowemu pynieniu tak dziś zagegęszczonemu ledwie nie powszechnie niżeli ię leczyć, do pierwszego przykładu się dzielnie ciągnie moralny, fizyczny, a że otych już się przy radach odcho-  
wań dziecinnych obszerne podały zasady, do nich więc czytelników odsy-  
łając dodam, że nawet potrzebne jest roztropne prowadzenie wczytaniu książek, tak dziś polubnych, dla młodej płci nader niebezpiecznych, niemnięj

zaznajać ię wczesnie zważnością czy-  
szczeń miesięcznych, przekładać nie-  
szczęsne skutki, iakich się spodziewać ma-  
ią z obcisłych ubiorów, i że przeciw nim  
nie masz dzielnięj służącego środka, nad  
noszenie do por roku stosownych su-  
kien mi nowicie gatek, przez co by osobli-  
wie w naszym klimacie ochraniając części  
rodne od wpływu odmian powietrza,  
zimna, wiatrów, ocalać się mogła nie tyl-  
ko od płynień tych, ale nawet od cier-  
pień winnych częsciach współnictwie  
będących, iakoto: bólów zębów, głowy  
piersi; kaszłów, katarów, a prócz  
tych i spazmadycznych sciskań wywo-  
cie przed przyściem lub wczasie czy-  
szczeń miesięcznych:— Jeden ten środek  
wielu za poradą moją ochronił od tak-  
wych cierpień a zniemi i uwolnił od  
połączonych zniemi womitów.— Dotąd  
się mówiło o płci kobiecej, teraz się po-  
dadzą środki na płynienia bolesne z ka-  
nału moczowego u płci męskiej. Roz-  
wiozłe życie, lekkie kompanie, użycia  
nadwczesne rozpalających trunków, la-  
twe przystępy do innej płci, mowy gor-  
zące i t. p. są tych płynień bolesnych  
przyczynami, przy nich towarzyszą bo-  
leści wurynowaniu, nabiegają poblizsze  
części, palenie w kanale moczowym. Do  
leczenia tych są dwa periody, pierwszy



znich stanowi zachowanie scisléy diety, unikania napoiów rozgrzewających, potraw mięsnych, zbyt korzennych, tłustych, osobliwie zaś wystrzegać się potrzeba mięs słonych, wędzin świeżych, wieprzowych, przy lekkich zatem pokarmach roślinnych, mlecznych, słowem chłodzących wszelako wpierwiaszki odżywnie obfitujących pozostać wypada, pokąd tylko towarzyszą przypuszczenia uryny, boleści, lub po iéy odpływie w kanale moczowym palenia, a po ustaniu tych nader skromnie powracać do zwykłych pokarmów, zwyszczeniem się jednak gorących napoiów, słowem tego wszystkiego, co może krew wburzać, zapalać, a boleści powiększać: tu służy piwo lekkie dobrze wystate lub woda czysta. — Z srodków zaś doradczych służą mleka sztuczne znasion bani, ogórków, nasienia konopnego, lub odwary zkrwienia ślazu, pietruszki, perzu, wody z lnianego nasienia branie proszków z Saletry, kremotartary, np. dr. 2. pierwszéy, uncją iedną, drugiego zmieszać po dobréy łyżeczce od kawy 3. lub 4. razy na dzień z wodą żazywać, odwarami zaś tu podanemi popić, przestrzega się iednak aby przy braniu tych proszków mleczyw sztucznie robionych nie używać, lepiéy się

więc uczyni, kiedy się do kwarty wody odwarów: ślazu, perzu, wody lnianéy, doda iedną drachmę Saletry czyszczonéy, piąc takową tyzannę po sklance maléy razy kilka na dzień wyiawszy godzin 3. 4. po iedzeniu, gdzie napoie te studząc ciepło żołądka uszkadzają strawność. Do tychże srodków na usmierzienie boleści służy i następujący, wziąć oleyku migdałowego, wniedostatku iego lnianego czystego nie starego 1p łyżek 4: rozbić zdwoma żółtkami od iaj powoli dodać czystéy wody, skuteczniéy ieszcze nalania miętki, które się robić zwykło iak herbata, pół kwarty zmieszawszy osłodzić czém się podoba, i brać po maléy sklance razy kilka na dzień. — Zniemałym skutkiem służą kąpiele letnie, ag dyby nie było téy sposobności, moczenie członka w wodzie ciepłéy, na w pół z mlekiem zmieszanéy, po kwandransie czasu, co razy dwa trzy na dzień powtarzać. Im prędzéy zaraz od początku uczucia swędzenia, palenia, w kanale moczowym, bolesnych odpływów uryny doznawać przychodzi przystąpić należy do zachowania scisléy diety i użycia wskazanych tu srodków, tém pospieszniéy bezpieczniei to złe i wdalszych swych skutkach léczoném bywa, i tak się ma naprzeciwie rozu-



mieć, spóźnienie, niezachowanie się wscisłej dyecie, rozpalania moralne i t. p. zwykły dość często to złe tak trudne w leczeniu przedłużać i wciągle zamieniać płynienia, niszczące ciało, z sił pozbawiające do przeznaczenia zaś swego mniej użyteczne części czynić, ztracając w nich potrzebną sprężność — Czyli zatem przez zaniedbanie, czyli, jak się zdarza, że przy zachowywaniu się w wszelkiej strzeżliwości, wszelako nie zaraz zwykło ustawać, a czasem i obficie płynąć, co tém bardziej osłabienia po sobie zostawia, wypada pomyśleć o umocnieniu powszechném, a zatem i tych części: a to stanowi drugi period leczenia. Na ten zamiar służą moczenia w zimnej wodzie, obmywania części poblizszych, i to czas niejaki po razy dwa razno, nie zaraz po wstaniu ale wgodzinę dobrą, drugi raz pod wieczór, lecz i tu ostrożność zachować wypada, aby te części niebyły zapoconemi. Do środków wzmacniających z dobrym skutkiem służą nalania następujące: wziąć rumbarbarum pokrajanego cwiereć do pół łota, nalać wody wrzącej półkwarty, moczyć na ciepłym trzonie godzin 12. po ostygnienu przecedzić, z tego nalania zżywać, co 3. 4. godziny, pełną łyżkę od jedzenia popiwszy wodą. Środek ten

działa wprowadzie powoli, wzmacniając drogi urynowe iak strawności dopomagą, a przez ten ostatni skutek wielce się do ogólnego sił wzmagania przykłada. Dla pospieszniejszego jednak skutkowania, tam zwłaszcza, gdzie się toż płynienie zdarza przy konstytucyi słabej, flegmistey, gębczastej, obrzmiałej, do każdego brania powyższego nalania rumbarbarum dodawać kropli Nr. 28. po 15. dalej i 30. a na przypadek upartości miasto rumbarbarum brać odwary z kór wierzbowych, które się już powyżej umieścili: lecz i do tych także dodawać żelaznych kropli. — Dalsze zpołączenia z rozmaitemi chorobami tych płynień wypadki, iako przechodzące zamiar wydawcy pisma tego, odsyła się do znawców. —

### O Biegunkach.

Przy chorobach dziecinnych umieściłem biegunki, gdzie bywają towarzyskami zębów wyrzynania, przeładowań i tam ku temu podane zostały przepisy, tu znowu jest mowa o biegunkach starszego wieku, przy którym daleko więcej wpływa do nich przyczyn, i te nam wpoiedynczym tylko charakterze dla łatwiejszego zaradzania pominąć wypada.



Obsite rzadkie stolce, bez lub z boleściami żołądka, mnięcy lub więcéy naturalne co do farby łayna od dawania, do czego przylączają się niekiedy i wzruszenia febryczne: przyczynami do nich są zgromadzenia się ciekłości do kanału kiszek, które już wtęy ilości nie mogą być wssysanemi, iak są zgromadzone wskutku drażnień tegoż kanału, np. przez zanieczyszczania dróg pierwszych nadużycia trunków rozgrzewających, korzennych potraw, i tego co tylko zapopieszny ruch kręty, kiszek zrządzić iest wstanie. —

Wszelaką wogólności może być uważaną bieg: raz za uzdrawiającą drugi raz zaszkodliwą, do pierwszey należy każda szkodliwa materya, któręy pozbywając przez biegunki od natury zrządzone, chorych dz uzdrowienia doprowadzają, drugą stanowi ta, przez któręy obfitość, częstość, a do tego i trwanie, zwielu osieroca pożywności ciało, zostawuie po sobie znaczne kiszek osłabienie, a nieraz i przeszkadza dobrotliwym natury usiłowaniom w pozbyciu się przez inne drogi wyprowadzenia rozmaitych materyi. Z tego podziału wspartego na skutkach iakie biegunki wyprowadzają uznawać, wypada że pierwsze, iako uzdrawiające żadnego leczenia nie

potrzebuje i owszem, gdyby były wswym biegu uszkodzonymi, różne za sobą choroby sprowadzają. Ta przestroga iest dla nas potrzebną, aby nie zaraz biegunki takowe zatrzymywać, a tém szkodziwięy, kiedy na ten zamiar używamy rozgrzewających srodków, iak to bywa u pospólstwa wódka z pieprzem, polewka z imbierem i t. p. wnet opuchliny, obrzmienia powszechnie lub twarzy, nóg, krótkie tchnienia przystępują. do nich łączą się burgotania, częste rżnięcia, utrata apetytu i inne z uszkodzeń natury pochodzić mogące chorobliwe stany, wystrzegać się zatem należy użycia srodków moc sciskających mających, iakoto: odwaru czarnych jagód, proszku z kurzego ziela i t. p. ale uczyni się naleypleięy, kiedy dostrzeże sam chory, że przed biegunki téy napadami cierpiał np głowy bóle ciągłe, utratę apetytu, niesmak, rozdęcie żywota, wymioty, osłabień sił doznawał i t. p. przy nastapieney zaś biegunce coraz ustają te symptomy, i że do sił powraca. Przykłady te służyć mogą za skazówkę i do innych cierpień, które znoszą biegunki, te więc z natury swéy za uzdrawiające uznać potrzeba i bynajmnięy im przeszkadzać nie należy, żadno też leczenie nieznayduie mieysca iak tylko zachowanie przy-



zwolitej dyety co do pokarmów i napoiów, tu służą rosóły nie tłuste, ani korzenne, kleie, ryż, więcej pieczone niż gotowane mięsa, wyjąwszy wieprzowe, gęsi, kaczki, ciasta tłuste, a wszelkie jarzyny i ogrodniny, twardszemy bowiem natury pokarmy, nie mogą iak być otwarcie szkodliwemi z powodu, że się przyczyniają do biegunków tych utrwalenia, i że mogą zamienić uzdrawiającą w szkodliwą, z napoiów służą woda zgrzana, z winem, mnię i piwo może być szkodliwsze, nie nadto a do tego wystate iak najlepsze. Drugie są znówu szkodliwemi, temi są wszystkie bez wyjątku, które bieg chorobom przerywają i tymże przeszkadzają, np. przy febrach wyrzutowych, iakoto ospie, odrze, szkarlatynie, zwłaszcza na początku, gdzie powszechnie wyrzuty te itp. wstrzymywać zwykły, przy przesileniach chorób np. w czasie zapoćń, lub kiedy każda z tych biegunków zbyt uczułych, uprowadzając z sobą wiele pierwsiatków odyżwnych, cały proces odradzania się wstrzymuje, przy czym sił osłabienie, wychudnienie ciała, skłonności do innych chorób, coraz zmniejszający się apetyt, w końcu częste mgłośc i same omglenia, utrata ciepła naturalnego, ziomb nóg, rąk, odęcie żywo-

ta są ię następstwami, a im dłużej trwaia, i sama śmierć przystępuje.

### Leczenie.

Powszechnie wspiera się na usunięciu przyczyn, środków doradczych ku temu wyborze i celu uzyciu, a te zawierają w sobie dwa wskazania, które mogą być z sobą połączone: z ostatnich iest.

Pierwsze na wyprowadzenie lub też ulagodzenie przyczyn drażniących, drugie na ulepszeniu zawielkiej słabości i drażliwości kanału kiszowego. Co do pierwszego wskazania przypuściwszy, iak się najczęściej zdarza, zanieczyszczenia żołądka i kiszek, te więc poza granice ciała wyprowadzić należy: dać więc należy proszek z Jpekakuany ziarrek 20. na raz w wodzie, lub tenze zmieszać zrównemi częściami rumbarbarum zdarza się nieraz, że przy wymiotach przez uzycie srodku tego zrzadzonych, to iest wymiotach, przy których się daie uczuwać kwas. ostry szczypący, przy laksowaniach znówu ściskania rżnięcia, boleści w kiszach, tu więc użyć wypada napoiów klejkowych, które już tyle razy podane zostały. — Znówu przy zbyt uczułej drażliwości kanału kiszowego, użyć można następującego



srodka wziąć proszku z ipekakuany np. cwierć do pół pi-przu ziarka, krochmalu czystego ziarek 10. w niedostatku Gummy arabskiy, i tyleż cukru lub bez niego zmieszać, i co 3 godziny ieden zażywać popliając wodą zluianego nasienia, lub odwaru slazu pospolitego korzenia, w końcu i kleiów zkaszw sobie posiadających, iakoż skutek którego zrządzieją względem utagodzenia drażliwości rozciąga się nawet i do wolnéj transpiracyi, przez co humory od kanału kiszek do całego podskórza lekko pędzonemi zostaną, a na ten ostatni zamiar wpomoc dzielną przybrać można i brania wolnych kąpieli, po razy dwa na dzień, po których zaziębienia wystrzegać się należy. — Na usmierzenie zaś kwasu, uczuwać się przy wymiotach lub bez nich wgardle dającego, zdobrym skutkiem służą woda wapienna, miętkwiana, których można półowę domięzzywać do Nr. 3. brać po parę Łyżeczek od kawy razy kilka przez dzień. Po utagodzeniu drażnień przez powyższe srodki, gdyby miała trwać jeszcze biegunka, lub iak się nieraz zdarza, że ta przez czas długi staie się nieiako przyswoioną, wkorzenioną (*habitual*) a przeto przykładą się do wyniszczeń ciała i innych wypadków wzwyż wspomnionych, tu więc

po.

potrzeba następujące przedsięwziąć srodki, tak lekarskie iak dyetetyczne. Lekarskie są następujące: wziąć rakowych oczów na miatki proszek startych, proszku korzenia tataraku, po równych częściach np. po łocie, kto chce dodać korzenia goryczki krzyżownic (*gentianna cruciata*) takoz na proszek utartego łot ieden, zmieszać wszystko i po łyżce od kawy z rana o 11 i w godzin 4 po iedzeniu w wodzie zażywać. wodą popiwszy, lub na miejsce tego proszku zażywać kropli Nr. 5. z dodatkiem 4. części kropli żelazem moczonym z Nr. 8 z tych brać po 30. w łyżce wody 3. lub 4 razy na dzień, popić wodą, albo zrobić nalanie następujące, wziąć korzenia tataraku, goryczki krzyżownic, kory wierzbowej, wyżey wspomnionych każdego po łotów 3. pokrajać dobrze, nalać kwartę i czystey okowity, i kwartę wody, moczyć w naczyniu przez godzin czterdzieści dwie. wycisnąć, przez bibułę przecedzić, i po łyżce od iedzenia w tychże co wyżey godzinach zażywać, przy użyciu tych srodków czas niemający pozostać wypada, chociażby już biegunka ustala, a to żeby trawność pokarmów niżey umieszczonych iak naydoskonalej utrzymać, przez co wzmocnienie żołądka, całego kanału kiszek, tu



dzień ciała, powrót sił, następują, i co większa niedopuszczą tak łatwego téj biegunki powrotu, dyetetyczne przy użyciu zaśrodków są mocne buliony, rosół, aby nie tłuste, kasze kleiowe, kleje z nich galareta storczyku, z płucniku, porostu, już nadmienione, woda czysta za napój, albo wnieć ugasić kawał żelaza czystego, lub kilka gwoździ wielkich upalonych i w wodzie po kilka razy gaszonych, pieczone mięsa umieszczone w gorze, zgotowanych zaś iak nymniej używać i to nie tłuste z chrzanem lub musztardą, potrzeba takowe dobrze pożyć, po użyciu zaś tu dozwolonych pokarmów nie prędzćy iak w godzin 2. 5. napoiów wyżćy nmieszczonych lub też i piwa dobrze wystętego używać, możni mogą i kostowniejszych napoiów po kieliszku wypiać.

### O Biegunce szczególnego gatunku.

(*Lienteria*)

Poznawać się zwykła, że przwięte potrawy a nieraz i napoje wcale nie strawione przy boleściach żywota, lub i bez nich stołcem odchodzą. Przytomnym bywa mocny apetyt, powszechnie zaś iego utrata lub nader mały, zbraku zatem

pożywności ogólnćy musi ciało chudnąć, zsił opadać, a wskutku przystępują opuchliny lub suchoty. — Przyczynami do nićy być mogą niedostateczna moc trawienia, za szybki ruch krćty kiszek, do oddaleńszych znowu przyczyn liczyć można to wszystko co uszkadza trawność i drażnienie tych części pomnaża np. poprzednicze długo trwałe biegunki, dysenterye, mocno laxujące lekarstwa, nadużycie piw, trunków rozgrzewających, nieraz takos powstać przez wstąpienie podagrycznćy artrytycznćy materyi.

### Leczenie.

Wspiera się na utrzymaniu lekkiey do strawienia dyety, i któraby w żaden sposób nie czyniła powiększania przyczyn drażnienia i za pospiesznego ruchu krćtego kiszek, wszystko zatem użytem bydź może nawet co do srodków Lekarskich, które się przy biegunkach poprzedniczo umiesciły.

### O Cholerze chorobie.

Znakami téj choroby są: mocne wymioty, biegunka, do tego przyłącza:



ią się znaczne żołądka i żywota boleści. Nieraz ten biegunki gatunek poprzedzają uczucia zgag, wiatry, a dopiero przystępują wymioty i biegunka, przez pierwsze wyrzucaną bywa żółtawa, zielonawa, lub ciemno szarawa żółć. Takowe wypróżnienia uszają zrzędzać nie do ugaszenia pragnienia, które wskutek do tych części znacznej ciepłoty przypływu a osieracania z nich wyższych części przystępują, gdy ta choroba czas niemają, trwa dostrzegamy: że puls zaledwie się dać uczuwać, że ziąb członków, poty zimne, gwałtowne serca bicie, czkawka, omglenia, mniaczenia, a wkońcu przystępuje z palenie części tu wspomnianych, a gangrena ich życie zakończy.

#### *Leczenie.*

Zawiera w sobie ułagodzenie drżnień, i zapobieganiu zapalenia łatwo przystąpić mogącego, iakoż służą kleie z kasz iako to: owsianney, ięczmienney, mleka sztuczne tylo razy nadmienione, lekkie wyprowadzające srodki, iako to: kremontartari w proszku na w pół z cukrem utarty np: po łócie, i dawać co parę godzin po łyżeczce od kawy z wodą, kleiami dać popić. — Je-

żeliby ta choroba pochodzić miała z użycia trunków nie dobrze wyrobionych, iako to: młodego piwa, co się po wsiach nader często zdarza, służy z dobrym skutkiem albo woda wapienna po łyżce od iedzenia dla młodych do lat 10, 12, 15, dla starszych po 2, 3 na raz co parę godzin, z równymże skutkiem służy proszek z węgla twardego drzewa, pierwéy takowe iak naylepiéy wytląć należy, można z tego proszku np: łót ieden, drugi cukru, zmieszać i dawać miodym na dobry koniec noża, starszym po sporej łyżeczce od kawy, lub na spory koniec noża, co 2, 3 godziny z wodą, i wodą popić. — Jeżeli zaś pochodzi od użycia zdrowiu szkodliwych, mianowicie roślin, to się odsyła do srodków, które się przy zatruciach części 1 na stronie 237 podały; a w końcu używać należy leków wzmacniających, i te się umieściły przy biegunkach: z dobrym także skutkiem przykładania na żywot: z rumianku, miętkwi, szalwii wzięwszy każdego z tych ziół po garści dwie i tyleż lnianego nasienia, w mleku na papkę rozgotować, tę rozsmarowawszy na chustę na żywot przykładac, odmieniając często, można takż w pomoc przybrać pół kąpiele w ciepłej wodzie, powtarzając, podług potrzeby 2, 3 razy na



dzień, trzeba w nich od pół godziny do trzech kwadransów siedzieć. — Znowu gdyby ta choroba pochodzić miała z przyczyn wstąpienia wyrzutów skórnych, iako to: ospy, szkarlatyny, odry, świerzby, takż częściej kąpać w wodzie wrzącej, w której moczyć wprzód gorczycę całą. potem roztworzyć wodą wolną: z dobrym skutkiem służą przykładanie na żywot synapizma, plaster z much hiszpańskich, ciepłe picia miansto herbaty melissy, miętkwi polney ogrodowej lub też i piopżney, iaka się znich w domu znajduie. Przy tych środkach zapominać niemożna o dyecie, a ta się zupełnie zaleca podana przy bieguncie.

#### *O zatrzymaniu stolca.*

Z samego nazwiska poznać się daje ulegać zwykli temu konstytucyą udorowani do zatkania stolca, o który się na karcie 64. mówiło. — Przyczynami byǳ mogą twarde łania, i te zrzǳać zwykły użycie kartofli przy szczupłym ciału poruszeniu i mącznych potraw które żadnego kisenia nie mają, chleba razowego niedobrze, wyrobionego, wypieczonego, nadewszystko ciepłego, wczasie upałów, kiedy się zawiele pocą lu-

dzie, są pracując na nie wystawieni. Ztego zatrzymania, iezeli to za długo trwa, powstają rżnięcia żywota, odbijania, koliki wietrzne, tchnienia krótkie, głowy bóle, zawróty, utrata apetytu, wymioty, uwolnienie zatém stolca przyspieszać należy, żeby przez wstrzymanie iego nieprzystępowała febra, gorączka i silne wzywocie boleści, które nawet za lekkim żywota ręki macaniem uczuwać się choremu powiększone dać, w tenczas łatwo przystępują wymioty stolcowe i gangrena kiszek, śmierć za sobą sprowadzić mogące.

#### *Leczenie*

Wspiera się na użyciu środków na posiłek służących i lekarskich przez usta wziętych, iako i przez branie enem, o pierwszym się mówić będzie, gdy drugie pod literami umieszczone podaiemy.

Zadnych do strawności twardych rzeczy w żaden sposób używać się nie ma, i owszem ciekące, iako to: rosół, aby te nie były tłuste, korzenne, same przez się, lub gdyby, iak się często zdarza, do picia były obmierzłemi, w tenczas można do



ni h dodać nieco soku cytrynowego, kwaśnicy, barszczu burkowego, zacynionego, lecz tylko do miłej kwaskowatości; kleie z kasz: ięczmiennéy, owsianéy, perłowej, owoce gotowane, iako to: śliwki, jabłka, gruszki, jeżeli te bardziéy rozdęcia żywota nie sprawują. Za napoje służą takż kleie ciękie z nadmienionych tu kaszów, które nawet na wpół i do rosolów domięszywać można. Przy tych więc posiłkach i napoiach pozostać potrzeba, pókąd uwolnienia stolca nie nastąpią — Srodki zaś lekarskie są następujące: i z nich

- a). Enemy z rumianku, korzeni i ziela ślazu, do których można dodawać gotując te zioła szczypci kilka kaszy ięczmiennéy, owsianéy, lub przetłuczonego lnianego nasienia, po przecedzeniu tego gotowania, można dodawać parę łyżek od iedzenia oleju lnianego, oliwy tyżkę, co się w domu znajduje, masła niesłonego, zioła te i z kaszami na enemy przeznaczone nawet gotować z serwatą z słodkiego mleka, i z téy saméy takż enemy dawane byż mogą, nie większe iednak iak po kwaterce naraz co 2 lub 3 godziny, iak potrzeba wymagać będzie. — Na przypadek, gdyby te przy ściśnie-

niu zbytelném kiszek nie miały skutkować, można do nich nieco mydła dodawać np: na pół kwaterek tych enem, ćwierć łota, lub też i z sam go oliu lnianego, gdzie zwłaszcza boleści żywota są przytomnemi, tam drażniących enem, iako to: z liści senesowych, soli kuchennéy dawać nie radzę, lecz zalecam powyżéy umieszczone, to jest: z rumianku, ślazu, lnianego nasienia, serwatki, a gdyby i te, iak się przytrafia; nie miały dostatecznie skutkować, w tenczas zwolniwszy 3 szęści wody 4 octu winnego, takowe enemy dawać nawet i zimne: wszystkie tu podane enemy nie mają przecie być często dawane, osobliwie kiedy poprzednio kilka ich żadnego skutku nie uczynią; rozdymają bardziéy żywot, i pracowitsze tchnienie zrządzaią. — Żeby zaś i te podane enemy miały się nie dość skutecznie okazać, w tenczas przystąpić do dawania ich z dymu liści tytoniu, lubo się do nich podały narzędzia przy rątkowych, które też i przy rycinach są umieszczone, z tém wszystkiém dawać można z lulki, nasy-pawszy w nią tytoniu, odpalić go,



aby na wierzchu popiół tych liści niego płace się pokrył, w tenczas lule przykryć należy płótnem, i dąć lekko, aby ulecieć mogące iskry ciała nie obrażyły, tym sposobem przez cybuch gładki, tłustością zasmarowany, w kiskę stolcową dąć gdyby dawanie z dymu tego enem miało trudność i zachód czynić, zwłaszcza gdzie palenie tytniu w domu nie bywa używanem, tam miasto dymnych, przeznaczyć odwar nieciężki z tytopiu, którego mierna szczypta do kwatereki wody jest dostateczna, ztém wszystkiem, tak dymnych z liści tych jako i odwaru z nich nie radzę używać bez zezwolenia znawcy. Dobrze takż służy czopczki robione z soli kuchennej i miodu równych części, te pierwsze wysuszyć potrzeba, można robić takowż czopczki ze świecy łoiowój, mydła. Mamy zatém liczne enem robienia sposoby, aby naprzeciw przyczynom skutecznie działać mogły. Wpomoć tych, gdzie zwłaszcza pośpieszyć z uwolnieniem wstrzymanego za długostolca potrzeba, a przeto i wczśnie złym skutkom wyżey umieszczonym czyn-

nie zapobiec, służy następujące środki:

- b). Kąpiele ciepłe po za pępek z wody czystej, można do nięj dodać łotów 6, 8, mydła tallowego, w nich od pół do trzech kwadransy siedzieć raz lub dwa na dzień, a nawet i trzy, gdyby miały powiększać się odęcia żywota, technię ciężkie, boleści żywota, okliwosci, po takowej kąpeli aż do czasu brania drugiey całej żywota okładać mocnym odwarem, rumianku, Inianego nasienia, w którym takż łotów kilka mydła rozpuścić można, i w tym chuskę kilka razy złożoną umoczywszy, dobrze wycisnąć, tak często cały żywot okładać, żęby na nim nie zastygały. Okładania gdzie trudnem jest kąpeli branie zastąpić mogąich mieysca, do tego użyć można ieszcze i smarować żywota co dwie lub trzy godziny, i na ten zamiar służy maść pod Nrem 21.
- c). Z lekarstw zaś wewnętrznych następujące podaję: Przy młodych a do tego krwistych służy proszek Nro 6 lub 14 do otrzymania skutku, gdzieby się przyłączać miały rznięcia, boleści, kotki, można pomiędzy temi proszkami na przemia-



miany z niemi lub i bez nich następującego mieszania używać, wziąć olejku migdałowego, lub w niedostatku jego oliwy nie staréy, lepiéy zaś służy olej lniany świeży, z tych, które się zaydują, i wziąć tyżek 4 do 6 zbić powoléy z dwoma żółtkami od iay, domieszać kwaterkę wody czystéy, soli Glaubera łótów dwa w wodzie gorącéy, filizance iednéy rozpuszczoney, nieco przestudziwszy domieszać, a osłodziwszy cukrem lub miodem, dawać na raz po pół filizanki, albo tyżek stołowych dwie, trzy, niezapominać przecie częstego picia chociaż sznupłego naraz, na te zaś służą kleie ciękie z kasz nadmienionych, a nawet i ze sliwek w wodzie gotowane, lepiéy nad inne napoje. Przy tych srodkach i dyecie zostawać potrzeba, pókąd co tylko jest wstrzymanego w kanale kiszkowym zupełnie wyprowadzoném nie zostanie. Wszelako gdyby przystąpić miały znaczne boleści a do nich febra, gorączka, przy użyciu środków wyżéy wspomnionych niezawadzi i do krwi puszczenia przystąpić, końcem zapobieżenia przystąpić mogącemu lub już przystąpionemu tegoż kanału zapaleniu, lecz i tu dla pewności lepiéy jest wezwać rady znawcy, tylko w tenożas ośmielić się można do téy operacyi działania,

gdyby wypadła potrzeba z powodu znamięn wyżéy umieszczonych, a nadewszystko z boleści w żywocie febry, gorączki, a znawcy rady tak prędko zasięgnać nie można. Dopomaga się takóż do pozbycia się stolca picie kawy ze śmietanką, palenie tytoniu, przy tém nie spluwać, co iest szkodliwém po iedzeniu a to ze względu, że odpływ téy cieczy mydlastéy natury do strawności dzielnie pomagającéy znacznie téż uszkadza, tak dalece, że nie raz wychudnienie całego ciała przez obfite śliny spluwanie nastąpić może, przez co i żołądek nie dostatek dymem tytoniu owych pierwiastków drażniących żołądek i kiszki przez współnictwo z nim będących, dla wzruszenia opieszalego ich ruchu krętego, aby pozbycie stolca łatwieysze nastąpiło. Jeszcze i tu ostrożność potrzebną umieszczam: aby w czasie zapocean nie dawać enem, lecz oczekiwać pókąd z potów nie ostygnie chory.

#### *O Kolce i iéy różnicach.*

Poznać się z bólu w kiszkach, i ten albo być może miejscowym, albo zaymującym kanał kiszkowy, zatem w całym żywocie, być może ten ból znośnym, iak nader przykrym, mocno do-



kuczałącym, regularnie, lub nie, w pewnych czasach napastującym lub trwałym, z biegunkami lub wstrzymaniem stolca, przyczem i odęcie całego żywota nie raz bywa przytomnem.

Zanim dla doskonałego zaradzenia poniżej umieścę tych kolek gatunki, pochodzących z rozmaitości przyczyn, powszechnie napastujących: kładę za powszechną do nich przyczynę drażnienia zwłaszcza cienkich kiszek, i ku temu też ogólne podadzą się środki doradcze, aby przez użycie ich ułagodzić te drażnienia, a przez to i zapobiec tak przystąpić mogącemu cienkich kiszek zapaleniu, iako i innym niebezpieczeństwem życiu zagrożającym następstwom.

Do oddalenia więc czyli ułagodzenia tego drażnienia używa się: 1. napoie obwiałające, tu służą kleie wzwyż wspomniane. 2. najmniej drażniące, wyprowadzające lekarstwa, iako to: powyżej nadmienionej mieszaniny, olejku międzałowego, lub innych olejków z żółtkami od iay, przytym używać na pokarm nie rozgrzewających pokarmów, iako to: kleiow na w pół z rosołem, do którego nie mają braniem być korzenie, nie powinny być nawet tłuste żółtka miękko gotowane, wreszcie przy każdej kolce

należy zachować iak nayspilniey następujące zasady:

a). Nie zapominać nigdy o otwartym stolcu, i tenże utrzymować, do czego służą enemy wyżey położone z ostrożnością drażniących.

b). Zachowywać w ciepłe nogi, żywot, na który przykładac gotowania rumianku kwiatu, lnianego nasienia, i to często przykładac, mając bacność, aby na żywocie nie zaziębiały, użyć takż z wielkim skutkiem można smarowania całego żywota co 2 lub 3 godziny, do czego naznacza się Ner. 21. gdzie dozwoli mieyscowa zručność, przybrać w pomoc całego ciała kąpiele, lub tylko do pępka, i to stosownie do okoliczności, to jest: do upartości bólów, lub ich zwolnienia, raz, dwa lub i częściej na dzień powtarzać, przestrzegam, że woda powinna być miernie ciepła, bynajmniej nie gorąca, takowa kąpiel wiele zaszkodzić może, czas zaś siedzenia w kąpieli, jeżeli dozwolą boleści, a kąpiele oneż uśmierzają, oznacza się trzy kwadransy do godziny, można do wody wrzącej rozrzedzoney przez dodatek zimnej być mającą, wsypać garści



dwie lub i więcej kwiatu z rumianku. Po wyjściu zaś z kąpieli znów powrócić do okładania i smarowania, co czynić bez uprzykrzenia należy, aż do czasu powtórnej kąpieli i ustania boleści.

- c). Przy każdej zaś mocnej kolce zagrażającej niebezpieczeństwem, przystąpić należy do krwi upuszczenia, nie zważając nawet na przyczynę, która by ją zrzadziła, ponieważ usunięcie przyczyny tej lub owej dość często czasu nie dającego się oznaczać wymaga, gdy w tymże chory paść może śmierci ofiarą przez gwałtowne boleści. Dla wszelkiej ostrożności, iaka się zachować powinna przy krwi upuszczeniu, umieszcza się uwaga, żeby nie za wiele krwi na raz z ręki upuścić, co by chorego mogło osłabić, najlepiej się zatem uczyni, kiedy się umiarkuje, że ię odpłynęło np: kwatka, jeżeli zaś chory mocnej konstytucyi, wieku młodego, a do tego krwisty, można upuścić i nieco więcej, wszakże jeżeli po tém krwi upuszczeniu dostrzegamy zwolnienia boleści, na tę upuszczoną krwi ilość poprzestać można, a gdyby zwolnienie tych

- tych boleści miało być chwilowe, nazad powrócić, lub nie miały ustawać, można powtórnie z tego otwarcia lub nowego krwi upuszczenie skutecznić, agdyby chory miał być słabowitej konstytucyi, połowę tylko, to jest półkwatki, dać odpłynąć, i zachować względem powtórzenia ię też samą uwagę co do zmniejszenia chwilowego lub powrotu tychże boleści, iako też i na stopień febrы gorączki, towarzyszącym częstokroć kolkowym cierpieniom kiszgowym.
- d). Przepomnieć takż nie należy i o kolkach kiszgowych, przy których nader często kolków napady przywięzują się, te albo dla wstydu, lekkiego uważania za nic, niedbałości, od chorych taionemi bywają, wysledzić więc koniecznie wypada, wszakże wezwawszy znawcę dla usunięcia na swe miejsce kiszki wystąpionę, zwykło wnet usmierzać kolki, gdy przeciwnie przepomniawszy o ię wysledzeniu, a témbardziej zaniechawszy ręcznego ratunku, iak tylko najspieszniej pomaga, o utratę życia przyprawia chorego.



e). Nakoniec wystrzegać się potrzeba wszelkich drażniących zbyt używać środków, tak w względzie lekarskim iako i dyetetycznym, iak się to wyżej nie bez ważnych przyczyn nadmienilo. — Przycho-  
dzieny teraz do poznania różnych przyczyn i pochodzących od nich kolek gatunków, z tych iest:

### *Kolka wietrzna.*

Poznać się przez rozdęcie żywota, i ta dotykając rękoma żadnego nie sprawuje bólu, wydaie jednak burgotania, odeyscie zaś wiatrów uśmierza owe rozdęcia i inne przykrości. Przyczynami do tego są usposobienia w kiszkach z niedostateczney tychże sprężności, lub uzyskaney przez częste używania wiatry sprawujących pokarmów, przy braku zwłaszcza potrzebnego dla ciała poruszenia.

### *Leczenie.*

Napady tych kolek następujących środków potrzebują: rościerań flanelą całego żywota, smarowań oliwą, olejem lnianym, z dodatkiem nieco kamfory, którą w nich rozpuścić, lub też i

użyć można na ten zamiar maść Nr. 21. okładania żywota zimną wodą, enemy z teyże, stosownie do potrzeby raz, dwa na dzień, dawane, z wewnętrznych zaś służą: magnezya angielska w proszku, np: do pół łota wziąć, kwintlę proszku z korzenia tataraku, albo wpuścić na tę samą ilość cukru kropel 4 do 6 olejku kopru włoskiego, lub anyszkowego, zetrzyć na proszek i brać na dobry koniec noża co parę godzin w łyżce wody, popijając wodą lub nalaniem melissy, miętkwi, rumianku, także z dobrym skutkiem służy proszek z węgla, pierwszy iak najlepiej wypalonych, sam przez się także można go zmięszać z równemi częściami magnezyi, korzenia tataraku, także na koniec noża lub po małej od kawy łyżeczce, albo kropel bobrowe same przez się po 30 na raz w tymże czasie, lub spiritus salis ammoniaci volatilisi od 15 do 20 kropel z wodą. Po ustaniu zaś paroxyzmu kolki, który nayeściej w napadzie tym zwykł bywać natarczywszym, używać potrzeba wzmacniających środków, do czego służą Nr. 3, 24, dzielniey zaś skutkomiich pomaga wstrzemięźliwość w użyciu potraw wiatry przynoszących.



*O Kolce z zaziębień.*

Kataryczne cierpienia lub wstąpienia wyrzutowe oprócz podagrycznych chorób zwykły ten kolków gatunek wyprowadzać. Powszechnie przy nich towarzyszy febra, gorączka, iako znamiona mniejszego lub znaczniejszego zapalenia, przyczyny do nich są uszkodzone pocenia, przez zaziębienia lub picia zimnych napoiów w czasie rozgrzania się, dżdżyste czasy, mgliste, mieszkania wilgotne i t. p.

*Leczenie.*

Wspiera się na uśmierzaniu boleści miejscowych i ułagodzeniu kurczowych (*spasmus*) cierpień, na ten zamiar służą przykładania synopizmów Ner 18 iako prędkiej drażniący organ skóry miejsca, gdzie się cierpienia kolków przedstawiają, można w prawdzie i na tenże sam zamiar powoli działający przykładac plaster z mouch hiszpańskich, tak na miejsca od bólu zajęte, iako i na łytki, można przybrać w pomoc kąpiele ciepłe, nóg moczenia, rozcieranie częste całego ciała chustami, flanelą, co się z tych rzeczy w domu znajduje. Wewnętrznie zaś środkami są poty sprawujące i wyrzutów powrót zarządzające, tu służą albo przez

się proszki Nro 10. lub mixturę Nro 11 ciepło pić miasto herbaty miętkiew, melisse, bżowy kwiat, rumiankowy, co się z nich w domu znajduje. Dyetta także w paroxyzmie cierpień powinna zawierać rosoly, aby nie tłuste z mięs wołowych i innych, kleie, kasze, ryż, iasia międkko gotowane, napóy zwyczajny, lub też i z powyżey podanych tu ziół, kwiatów, nie powinien być zimny lecz zwolniony, a zatym na przypadek zatrzymania stolca dać enemę otwierającą takoz, z rumianku, kleiu, lnianego nasienia, oleiu iego. Nade wszystko unikać potrzeba nowego kolek tych powrotu przez trzymanie się ciepła, co do odzieży i pościeli.

*O krótkim tchnieniu czyli Dychawicy.*

Uszkodzone ciężkie dyszące tchnienie z uczuciem w piersiach, tęskność z powodu nieregularnego przez płuca krwi przepływu pochodzące, nazywać zwykliśny dychawicą albo krótkim tchnieniem, pracowitem. Tchnienia takowe nierównie się trudniejszemi stają przy wolnym nawet ciała poruszeniu. Kiedy toż tchnienie do wyższego stopnia dochodzi, krwi przepływ przez płuca staje się trudniejszym, przeto



nadpływ iey do mózgu zrządza, przyłączają się w skutku ciągle głowy bóle, oczy czerwienią, występują prawie ze swej kolei, obrzmiewają naczynia krwiste na szyi, chory chrapi mocno, z utęsknieniem oczekuje chwili wolniejszego w płuce powietrza brania, dla którego nieraz siedzieć ciągle jest przymuszonym, obawiając się, aby leżąc nie został uduszonym, w takim stopniu znowu nazywa się toż tchnienie (*orthopnea et cutarrhus suffocatus*) czyli katar duszący. Do niego przyłącza się kaszel suchy mocno morderzący, w ten czas nazywa się tchnieniem suchem (*asthma sicum*) lub też z wyrzutem flegmy nie raz z krwią zmieszany nazywa się znowu (*asthma humidum*) przyłączać się zwykły zimne poty, w końcu choroba ta zakończyć zwykła albo istotnem uduszeniem, paralizem, lub przechodzi w płuc opuchlinę.

Ma ta choroba siedlisko albo w samej płuc massie lub też i w odległych od nich częściach, np: w zatłokach wątroby, śledziony, a zatem w wydrążeniu brzusznej, a co do swego trwania, albo bywa periodyczne albo też nieopuszczające. Rozliczne są do niej przyczyny, iedne z nich, iako z wad organicznych wypływające, a te lubo ul-

gę przez leczenie sprawić mogą, ale samego uleczenia nigdy; te więc w naszym piśmie opuszczamy, zostawiając znawcom dochodzenie zaszyłych wad w częściach organicznych, od których toż, pośrednio pochodzi, zostaniemy tylko przy tych przyczynach, na które Poradnik udziela skuteczne środki, dążące albo do ulżenia, lub też i być może do uleczenia. Przyczyny zatem, które usuniętemi być mogą w części lub zupełnie toż tchnienie zrzadzające przejdziemy, i środki do nich podamy.

Od nadpływu krwi do płuc, które może być skutkiem wstrzymanych naturalnych krwi odpływów, témbar dziej ukrwistych, młodych, iako to: u płci kobiecej, czyszczeń miesięcznych, u płci znowu męskiej hemoroidycznych.

### Leczenie.

Wspiera się na przywróceniu wstrzymanych odpływów, a zatem postąpić sobie wypada, iak się powyżej przy wstrzymaniu płynień miesięcznych podało; a co do hemoroidycznych lubo o tych się nie nie mówiło, z powodu, że otwarcie ich, jeżeli bywa sztuczne, to jest przez piławkę, nie może być ina-



czey uważane, iako że ten środek bardzo ustala plynienie to chorobliwe, któremu raczey zapobiegać wypada, wszelako nie masz ogólnego prawidła bez potrzebnego wyjątku, tak i przy otwieraniu hemoroidów, jeżeli się przez poprzednicze odpływy odziedziczone, bądź też przez życie siedzące, lub w skutku zapchań wewnętrzności w żywocie położonych, albo przez użycia ciągle trunków rozgrzewających na- było, a późnię wstrzymane zrządzaia toż technienie, w takim więc przypadku, dla uniknienia większego niebezpieczeństwa, któreby wyniknąć mogło z téy przyczyny lubo rzadkię, iak daleko częścię z wstrzymanych plynień miesięcznych, przystąpić do ich otwarcia potrzeba, końcem zaś napadom tym zapobiegania, używać poruszeń ciała, konnych iężdżeń, wstrzymać się od tego, co się przyczyniło do hemoroidycznych cierpień, i to jest iedno z nayskuteczniejszych środków.— Przystapiemy do dychawicy suchey.

### *Dychawica sucha.*

W tym gatunku dychawicy upartym jest kaszel, i dopiero za wielkiem wzruszeniem całej płuc massy udaie

się nieco oderwać flegmie, zawsze iednak technienie uszkodzone jest nieodstępniem.

### *Leczenie téy Dychawicy.*

Wspiera się na środkach powszechnych iako i lekarskich, do powszechnych należą pomieszkania i położenia wilgotne. Do lekarskich zaś służą odwary, storczyka kukawki, korzenia słazu, a o tych się iż powyzey mówiło, niemnię odwar z otrąb żytnich lekko prażonych, miodem osłodzonych, krórego można używać za napóy. Do trzech kwaterek na dzień wypić, Dyteta służy tu nleczna, przeto kłóseczki lane; biały chleb, perlowa kasza, w niem gotowane, zdrowy i naturze choroby odpowiadający daia pokarm.

### *Dychawica z zaziębień.*

Do téy przyczyn policzyć można następujące, iakoto: po zażraniu się picie zimnych napoiów, lekkie ubiory w porach zimnych, mroźnych, dzdzystych, mglistych, przez zaziębienia, wstąpienia wyrzutów, iakoto: odry, szkarlatyny i t. p. przez uszkodzone poty przy se-



brach katarycznych, reumatycznych, podagrycznych cierpieniach.

*Leczenie.*

Wymaga pospiesznego potów powrotu i co prędzey uwolnienia płuc od szkodliwcy, która się na nie rzuciła, z powyższych przyczyn materya do poruszenia, tćż służy wskazania i następne środki wewnętrzne Nr. 8. i 9. gdyby zaś te środki do wzniecenia potów lub przywrócenia wstąpionych wyrzutów, za tym nie miały dostatecznie skutkować, iak zrządzić ulgę w cierpieniach dychawicznych, do silniejszych przystąpić wypada. a tu znowu służy Nro. 9. 10. 11. 26. Powierzchownemi zaś środkami są przykładania synopizmów na piersi, na ręce, plastry wizykatory, nóg moczenie w wodzie z gorczycą i solą, nacierania całego ciała chustami lub kamforą w przód nacieraniem 2. 3. razy na dzień powtarzać, pokarmy mają być lekkie do strawienia, iakoto: rosoly, kleie, kasze, iaja miękko gotowane, a co do napoiów, te nie mogą być inaczej iak zwolnione dawane, na to służy bżowy kwiat, rumiankowy, melissa, herbata, tez same środki u-

żytemi być powinny na dychawice od reumatycznych cierpień.

*Dychawica odkurzawy lub wyziewów ostrych.*

Przyczyny takowe łatwo daią poznać następującą dychawicę, ponieważ wniedługim czasie zwykła po nich następować.

*Leczenie*

Zawiera wsobie używania środków mających własność obwiłania kurzawy, ulagodzenia wyziewów ostrych, służy więc pomiędzy inne kleie z kaszów: owsianey, ięczmienney, kleie z storczyku kukawki, odwar sżazu korzenia, woda lnianna, i tę pić za napój, można też z nie małym skutkiem używać oleiu lnianego świeżego, w niedostatku oleyku, migdałowego z żółtkami rozbitego domieszawszy do niego n. p. do 3. lub 4. łyżek, któren się z tych oleiów wdomu znayduie, z 2. żółtkami świeżemi, i dodać tyleż łyżek miodu praśnego, czystego, zmieszawszy brać często przez dzień po parę łyżeczek od kawy, ale przestrzegam, żeby te oleie nie były stare, takowe miasto



pomocy nieomylnie stan tćy dychawicy pogorszaia, przy tych srodkach pozostać wypada, pokąd nie ustanie dychawica lub krótkie tchnienie. Dyeta ma być lekka do strawności, słodkawey a mydlastey do tego natury pokarmy są ićy nayprzysiaźniejszemi, więcćy iak mięsna, oprócz bowiem rosółów niekorzenych, iaia świeże miękko gotowane, marchew, pasternak, słodko gotowane buraki, aby nie ze słoniną, tćm bardzićy starą, iako i mączne potrawy w mleku gotowane, powinny być przeznaczonemi chcąc wesprzeć przez dyetę skuteczność podanych tu srodków. Jeżeliby zaś miały do nićy wpływać wyziewy ostre np. kwasu solnego i t. p. oprócz powyżćy nadmienionych lekarstw wewnętrznych, pospieszyć wypada przykładaniem na piersi synopizimów, plastru wizykatoryów, a co po ostatnim ieszcze utrzymować aż do polepszenia ropienie.

### *O Kaszlach.*

Cokolwiek tylko przedrzaźnia płuca i błonę przedziałową (*dyaphragma*) że wzruszenia niezwyčajne następuia, należćć może do przyczyn kaszel zrządzaiaćcych, czyli te przyczyny bezpo-

srednie działaia na płuca, i przedziałową błonę, lub też w innych częścicach odległych od płuc się znayduia, wszćlako wzwiązku ogólnym z niemi zostaiących. Zwykły się ten kaszel przedstawiaćć, albo wilgotnym to iest z wyrzucaniem flegmy, i ten się nazywa powszechnie wilgotnym, może się do uzdrowienia przykladaćć, ile z flegmy odeysciem uprowadza drażniaćć pierwiastki, ile trwa nie dlućgo, ieżeli zaś uprowadza z soba odżywne pierwiastki, wtenczas ciało zwykło usychaćć, widocznie z sił opadaćć i nazywa się co do skutkow za soba sprowadzaiaćcych nader szkodliwym, drugi znou kaszel bywa, przy, którym nieraz i silnieyszych od pierwszego kaszlu płuc wzruszeniach przecięćć albo zbyt mała częścika flegmy odchodzi lub wcale nie, nazywa się kaszlem suchym.

Oprócz przyczyn, które też kaszle wyprawadzaia, gdy onich nićy mówićć się będzie, a których są tylko skutkami dalekołćzęścićy, liczniećy, uważaćć ie możemy, że są tylko zjawiskami innych chorób, usmierzenie zaś tych chorób za przezwyććiężeniem i usmierzeniem ich przyczyn zupełnie znosićć zwykły i kaszle oba. Poznamy przyczyny, które się zwykły nayspospoliciećy zdarzaćć i kaszle wyprowa-



dział do tych więc przyczyn przedrażnie nie w nadmienionych organach sprawujących należą iako oddalone, następujące.

- a) Nadpływ czyli nagromadzenie krwi od płuc.
- b) Flegma zwyczajnie wydzielana w zawałkach albo gruczołkach (*glandulae*) kanału oddechowego zwłaszcza kiedy z jakiegokolwiek przyczyny ostrości nabiera.
- c) Ulotne takż drażniące materye rzucające się posrednio na płuca, na kanał oddechowy i temi być mogą zaziębienia nóg, głowy, piersi, kataryczne, artrytyczne cierpienia lub i te, które przez związek jedynie i współnictwo drażniąc inne części, są wstanie zrządzić i drażnienia w płucach i kanale oddechowym. Przyczynami temi być mogą takż.
- d) Zaflegmienia dróg pierwszych, to jest żołądka, kiszek, a takowy nazywa się kaszlem żołądkowym, i onim to wraz z niego znamionami mówić się będzie.

#### *Leczenia ogólne.*

Te zwykły się stosować do przyczyn też kaszle wyprowadzających a

których są one skutkami. W użyciu naprzeciw nim środków wskażemy zakowe tymże porządkiem, iakim przyczyny do nich wyżej położyliśmy, a zatym:

#### *Leczenie do przyczyny a)*

Najczęściy nagromadzenie się krwi do płuc i kanału oddechowego bywa do kaszlu przyczyną, u młodych krwistych przy wstrzymanych krwi płynieniach u płci kobiecey, hemoroidycznych u męskiey, potrzeba więc środków przez któreby odciągnąć do innych części ciała toż krwi nagromadzenie (*plethora*) środkami zaś ku temu są nóg moczenia, pół kąpiele, krwi upuszczenia z nóg, wszelako rady nawczy do tego wezwać, branie miodku octowego Nr. 13. po łyżek parę przez dzień, często odwar z korzenia storczyku, lub też oba te środki zmieszawszy po łyżce od iedzenia zażywać na raz, i też branie powtarzać podług natężonego kaszlu, aby go usmierzyć, dla uniknienia łatwo przystąpić mogącego krwi płucia, można takż i przez laxowania umiarkowane zrządzać kierunek od płuc do kiszek kanału, na ten zamiar służy proszek Nr. 14. któ-



rego brać na dzień po razy kilka, aby wolne stolce 2. 3. na dzień uskutecznić, na pokarm służyć owoce gotowane iakoto: jabłka, gruszki, śliwki, lub powidła z nich, mleczywa z kłóseczkami, żkaszami klęły w sobie mającemi, najmniey mięsiw, a rosoly nie mają bydź tłuste, tęgic, korzenne, marchew na iarzyngę, szpinak, pasternak, są bardzo pomocnemi, dając posiłek chłodzący wszelako żyźniący. Za napóły służy odwar ze slazu korzenia na w pół z mlekiem, ale dnia tego nie radzę kwasnych potraw używać. Równie za napóły służy odwar ięczmienia samego, lub przybrawszy do gotowania równe części korzenia slazu, zawsze iednak ięczmieni opłókać, i wprzód razy kilka zagotowawszy z wodą, którą zlac, i dopiero wspólnie gotować.

### Leczenie do przyczyny. b)

Zawiera wsobie 4. wskazania 1. rozrzedzenie, 2. poruszanie 3. obwiianie ostrości 4. wyprowadzenie téż. Pierwszych trzech wskazań srodki tu podać się miane mogą być razem połączone, kiedy czwarte zawiera wsobie utrzymać kaszel umiarkowanie, aby przez niego usposobiona iuz przez ten-

że

że, flegma wyrzuconą być mogła, inaczeý wstrzymanie może znacznie utrudniać tchnienie, oddychania. Srodkami temi są Nr. 2. 13. 14. pomiędzy tych srodków używaniem brać po tyżce od iedzenia odwaru storczyku, Nr. 27, lub téż można z tego odwaru trzecią część dodać do Nr. 11. i przy tych srodkach pozostać, pókad się flegma nie rozrzedza, iak łatwieysza do wyrzucania. — Dopomaga temu zamiarowi silnie za napóły odwar z korzenia brodawniku mleczowego (*Leontodon tarataxaceum*) w sposób tu zrobiony: wziąć suszonego i pokraianego łótów 6. gotować w półtory kwarty wody przez dobry kwadrans, przecedzić, ostudzić, osłodzić nieco miodkiem octowym, popić nim można branie powyżzych lekarstw, oprócz tego kiedy niekiedy przez dzień po maléy szklance pić, żeby tę odwaru ilość codziennie zpotrzebować. Na przypadek, który nie jest tak rzadkim, gdyby przez słabość kaszlu nie mogła być rozrzedzona w zawalkach, i poruszona iak ułagodzona w swéy ostrości flegma być wyrzuconą, co nie raz głos chrapliwy, i rzęzenie téż flegmy, słyszeć się dający, przy ciężkiem tchnieniu daie doznawać: Naparzania nad octem mocnym domowym z ciepłą wodą



zmieszanym czynić po razy kilka przez dzień, polykając parę z tej mieszanki. Przytém wszystkiém zachować dyette pod literą a) umieszczoną, a pokonawszy ten kaszel przez środki tu podane, wypada przedsiębrać inne do wzmacniania tak zawalków iako i całego kanału oddechowego służące, o czém przepomnieć nie wypada, im dłużej silniey tenże kaszel udręczał chorych. Na ten tak użyteczny zamiar służą gorzkawcy natury środki, iako to: odwar korzenia omanu prawego (*Inula helenium*) wzięwszy tegoż ususzonego łót ieden, gotować w kwarcie wody przez pół godziny, precedziwszy osłodzić i brać 3, 4 razy na dzień po łyżeczce, gdyby zaś tego nie było pod ręką, miejsce iego zastąpić może krzyżownica gorzka (*poligala amara* lub *poligala vulgaris*) krzyżownica pospolita, której liście, osobliwie dolne, mające daleko więcej goryczki iak wyższe, a te się od dolnych różnią, że są kończatsze iak dolne, szersze, krótsze, nie są przecie i oba te liście bez użytku, o którym się tu mówi: wziąć ich np. garści dwie gotować w kwarcie wody do zostania po precedzeniu się połowy, przestudziwszy nieco osłodzić miodem czystym praśnym, i brać z niego

po parę łyżek od iedzenia 3, 4 razy na dzień. Do robienia tego odwaru, z powyższych krzyżownic, przybrać można też ilość porostu, płucnika (*lichen pulmonarius*), do teyże wody ilości, gotując, i tymże sposobem co wyżej zażywać. Chac istotnie pozyskać z tych środków nadmienionego skutku, dwu do trzech tygodni czasu na ciągle brać nie przeznaczyć wypada. Podają się tu w prawdzie różne zioła, a to, aby w czasie potrzeby, gdyby nie było którego z nich, o innych mieć wiadomość, i na tenże zamiar przeznaczyć można, ile że posiadają wzmacniające przyimoty.

#### Leczenie do przyczyny c).

Kasze pochodzące z zaziębień którekolwiek ciała części, lub przez tę przyczynę, wstąpienia wyrzutów, albo też kataralnych, reumatycznych i t. p. cierpień leczenia, ani też środków innych nie mają iak te, które się przy materjach tychże na swém miejscu podały, czytelników zatem do nich odsyłam. — A co do kaszlu z zaflegmienia dróg pierwszych pochodzącego, ten zastosowanych do niego wskazań i środków wymaga, te się więc podają,



## Leczenie kaszlu żołądkowego.

Zanim podamy środki, wprzód nam ięgo znamiona poznać wypada, a temi są: uczucia łechtania w okolicach żołądka, napady kaszlu po iedzeniach lub popelnianych w dyecie błędach, zamulania się ięzyka, w skutku słabe- go trawienia powstałe.

Na ulżenie kaszlu tego są wskaza- nia następujące: 1<sup>mo</sup> ażeby rozrzedzić i poruszyć flegmę. 2<sup>do</sup> Żeby ią przez górne lub dolne części z ciała wyprowa- dzić, to jest przez lekkie wymioty, lub sprowadzania ięy stoleami. 3<sup>io</sup> Żeby umocnić słabe żołądka na przyiętych potraw działania, końcem uniknienia nowych zamuleń, iak nieraz i ciągłego kaszlu, który całą pożywność ciała flegmy wypłuciem opatrzoną w pier- wiastki żyżwiące uprowadza. 4<sup>to</sup> U- mocnić żołądek, aby lepięcy trawił, a przeto i mniej był zdolnym do nowych zanieczyszczeń flegmistych. — Do pier- wszęgo wskazania, co znaczy dopełnić tego, czego osiągnąć uznaliśmy potrze- bę, służą następujące środki: wziąć korzeni suszonych drobno pokraianych, biedrzyńca zwyczajnego (*Pimpinella saxifraga*) łótów dwa, naląć kwartę wody wrzęcęy, i moczyć na ciepłym

trzonie pod przykrytém naczyniem go- dzin 24., przecedziwszy dodać soli ar- moniakupół drachmy, osłodziwszy mio- dem nie bardzo słodko, aby ostrość i korzenność tych korzeni w skutku swym do rozrzedzenia flegmy nie była nadto ułagodzoną. Z tego brać po parę łyżek od iedzenia 3, 4 razy na dzień, osobli- wie zaś na godzin 2 przed a w 4 po o- biedzie. Poiedynczy ten środek roz- rzedza potężnie zamulenia żołądkowe, ieszcze mu dodać ciepła tak do trawienia pokarmów nader potrzebnego. Mogą być i na ten sam zamiar następujące środki użytecznemi: wziąć omanu korzenia, iałowcu, po łótów dwa na tęż ilość wody która się podała do korzenia biedrzyń- ca, dodać pół łóta czyszczonego pota- żu, lub też można i opuścić, ze wszy- stkiem sobie, i co do robienia i co do bra- nia, postąpić, iak się przy biedrzyńcu podało. Przy poiedynczych tych środ- kach mocno skutecznych pozostać wy- pada niedziel dwie; dopiero za okaza- niem się na ięzyku mułu rozrzedzone- go, i zmniejszeniem się uczuciów łech- cących w okolicy żywota, i innych zna- mion przy wstępie tego kaszlu poło- żonych, przystąpić do wypełnienia dru- giego wskazania, to zawiera w sobie u- zycie środków, wymioty lub lekkie stol-



ce sprawujących. Przez pierwsze wyprowadzamy krótszą drogą zaflegmienia rozrzedzonego mufu, na ten zamiar służy Ner 2gi, który stosownie do potrzeby w dni kilkanaście powtórzyć można. Przez drugie: znajdujące się zaflegmienia w całym kiszek kanale i w części pozostałe jeszcze w żołądku przez stolce wyprowadzić, tu znowu służy Ner 14 proszek. Środki pod temi lezbami brać, żeby wolne stolce po razy 2. 3. na dzień sprawiły, co też dzień przez dzień biorąc do dwóch razy powtarzać. Pozostałe trzecie wskazanie, czyli umocnienie żołądka, do tego użyć Ner 3. Oprócz tych środków służy i następujący: wziąć pomarańczków niedożytych, suchych, iakie się w kożennicach znajdują, łótów 6. przetrwać w moździerz grubo, nalać na to wody półtory kwarty, pół kwarty nacyzyszej okowitki lub wódki francuskiej, moczyć w ciepłym miejscu przez 48 godzin, przecedzić i pić po dwie łyżki od iedzenia na godzinę przed a w 3 po obiedzie. — Przy tych czas niemały pozostać wypada, i owszem, im dłużej używaniu będą, tem trwalej wzmocnienie żołądka następuje. — Po dopełnieniu tych trzech wskazań, przeponnieć i o przepisie dogodny dyetty

nie należy. Służą więc: oprócz gęsi, kaczek, wieprzowin i wszystkich potraw tłustych, mącznych, kartofli, mięsiwa inne bądź to pieczone lub gotowane, a ostatnie z chrzanem, musztardą iść należy, z ogrodowin zaś: pasternak, marchew, buraki czyli to słodkie lub kwaszone, rzepa nawet, użytemi być mogą. Za napój zaś: oprócz piw tak krajowych, zagranicznych, wina wszelkie prócz iedney wódki, której użycia są szkodliwe.

#### O głowy bólach.

Bóle głowy zajmować mogą albo całą, albo po którejkolwiek stronie iey połowę, alboliteż i małą częśćkę teyże, przy niéy wszelako zwykły towarzyszyć ból silny. Pierwszy, który bywa ciągłym, a do tego mocnym nazywać się zwykły (*Cephalagia*) drugi (*Stacmirenia migrena*) a trzeci (*Clavus*). A że do każdej choroby być musi przyczyna, której choroba iest tylko skutkiem, toż samo się ściaga i do tych tu głowy bólów. Mogą zatem być przyczyny w samej głowie lub też pochodzić od części wcale od niéy aczkolwiek odległych, wszelako podług powszechnych orga-



nizacyi prawideł, ogniwa całości organiczney stanowią.

Bóle głowy, których przyczyny spoczywają wnięty samęty, oprócz rozmaitych wad zachodzących w samym mózgu, lub znajdujących się w nim ciał obcych, cieków, lub też i od złęty budowy kości przykrywających tenże, że takowym i sztuka lekarska mało co, albo wcale nic nie pomoże, tu opuszczamy: umieszczamy następujące do nięty przyczyny, które chociaż się znajdują także w mózgu, wszelako zaradzić im można: temi przyczynami mogą być, mocne mózgu wstrząśnienia, uderzenia silne, upadnienia na nięty, strzaskania kości mózgu przykrywających ostroscei chorobliwych processów, iakoto: weneryczney, skrofaliczney, zagorzenia, odurzenia przez wyziewy szkodliwe lub wonięiących kwiatów, rozgrzewania głowy przez upały, przeziębienia ięty, nadgromadzenia się krwi do naczyń krwistych mózgu przez uadużycia trunków, lub ich mieszanie zbytecznych, ciała poruszenia, puszczenia krwi obfite, szafowanie naturą, wstrzymanie zwykłych krwi odpływów, iako to: czyszczeń miesięcznych u płci kobiecey, u męzkiey hemoroidycznych: te więc i następne przyczyny, na któ-

rych usunięcie poradnika iest obowiązkiem skuteczne podać srodki, umieszczone ni są, leczenia zaś ich zastosowane mi będą do tych, od których przyczyn pochodzą. Do przyczyn znówu bólów głowy zawartych w częściach od głowy odległych należą, zanieczyszczenia flegmisto żółciowe, żołądka i kiszek robaki w tych częściach, przeładowania żołądka potrawami, lub użycia przechodzącego siłę iego trawności, wstrzymanie stolca.

#### *Zasady ogólne do leczenia.*

Stosować się powinny do usunięcia przyczyn od których pochodzą, i te pierwęty wysledzić potrzeba, chcąc im skutecznie zaradzić. Sledztwo to, ile być może, powinno się wspierać na wyexaminowaniu chorego o przyczynie, do czego zatym służyć powinien szereg przyczyn, które się do działania bólów głowy, bądź to całej części lub cząsteczki przyczyniać mogą, tak pochodzących od miejscowych przyczyn iakoteż i z przyczyn odległych od głowy organów. Przeydziemy zatym te przyczyny, aby przeciw bólom głowy od nich pochodzącym skutecznie zaradzić.



*Leczenie dotyczące się przyczyn  
w mózgu.*

Cosię tycze przyczyn przypadkowych, o których się mówiło, że się znajdują w samym mózgu, iakoto: wstrząszenia silne, uderzenia i t. p. wymagają środków umieszczonych już przy zbiciach głowy na początku rozdziałku pierwszego tej części, do których też się odsyła; co się dotyczy ostrości szkrofalicznej, te się już przy konstytucjach w rozdziałku Pierwszym drugiej części podały, oraz z przepisami dyetetycznymi, które główną i najtrwalszą stanowią leczenia podporę, są też najskuteczniejszymi środkami do usmierzni i pokonań nawet głowy bólów; od których pochodzą, do tych znów czytelnika odsyłam. A co się dotyczy przyczyn zagorzenia, odurzenia, te umieszczone zostaną, przy chorobach nagłego ratunku potrzebujących, od upalów zaś głowy bóle pochodzące usmierzonemi bywają, przez środki podane przy materji zapalenia mózgu, równie też same służą naprzeciw głowy bólom pochodzącym od nagromadzenia się do mózgu, od zaziębień zaś głowy, służy to wszystko, co się przy febrze katarycznej mówiło, od zbyte-

cznych znów ciała poruszeń, spoczynek iego i chłodzące napoje, iakoto: mleka sztuczne, i inne środki, które podane zostały przy febrach zapalnych od szafowania naturą, zaprzestanie, dyetta posilna i wzmacniające środki te są najskuteczniejszymi. Nalania zatym z kózku korzenia długo używane, a którego przygotowanie znajduje się pod Nr. 9, w przypiskach umieszczone, do których dodać obmywania całego ciała i głowy zimną wodą, co czynić wypada w dobrą godzinę po wstaniu ze snu, nie potrzebując żadnych dodatków, ile że iak się powiedziało, iż usunąwszy przyczynę znosi się ię skutek.

*Leczenie głowy bólów z przyczyn  
zawartych w częściach odległych od głowy.*

Bóle głowy od zanieczyszczeń flegmistycznych żołądka i kiszek, przez środki podane przy febrze żołądkowej, od żółciowych zaś, przez środki przy febrze żółciowej umieszczone, leczonemi bywają, bóle zaś głowy pochodzące od przeładowań żołądka potrawami użyćcia niestrawnych, jeżeli przystępują bóle głowy po użyciu ich świeżem,



dać proszek na wymioty z ipckakuany, lub na tenże sam zamiar rozpuszczony, w wodzie weynszteyn (*antimonu N. 2do*) wskutku zaś późniejszym tych przyczyn powstałe głowy bóle leczonemi bywają iak febry żołądkowe, a ta przy febrach przerywanych umieszczoną została, do czego czytelników odsyła się. Od wstrzymania zaś stolca podane zostały środki powyżey przy téżym materji, a od wstrzymanych czyszczeń płci kobiecey równie są powyżey przy opisie tymże umieszczone, niemniej i od płynień hemoroidycznych. Do tych więc materji w leczeniu głowy bólów z przyczyn tu wyszczególnionych, czytelników odsyłam.

### O kurczu żołądka.

Uczucie tęskliwego sciskającego bólu wokolicach żołądka, przy którym towarzyszą krzyżów boleści, wstrzymanie stolca, nudności, ckliwości, i same nawet wymioty: nieraz mocne omglenia, ziąb rąk, nóg, bywają przytomnemi nazywa się kurczem żołądka, iego napad zwykły przystępować po szczupłym niewinnym, iem mniej szkodzić mogącyin pokarmie. Liczne mogą być kurczowych cierpień przyczy-

ny, my się często zdarzających trzymać będziemy, z tych iest pierwsza słabość żołądka, a wskutku tego następują niestrawności, tworzą się zamulenia w żołądku, uczucie kwasu, a nawet i takowe odbiiania. Znamiona te przez następujące czynią daleko pewniejszem kurczowe żołądka cierpienia, do tych należą utrata appetytu, porywania kurczowe po posiłkach, iakoż ulegli im naylepiey się mają, gdy są głodnemi.

### Leczenie.

Wspiera się na następujących wskazaniach.

- a) Na usmierzeniu boleści tymczasowey.
- b) Na usunięciu zamuleń.
- c) Na wzmoocnieniu ciągłym żołądka.
- d) Na dochowie ściśleý dyetty, a ta prawie nayglównieyszą zamierzzonego celu stanowi podporę.

Do a) służą napoje kleiowe z kasz takowych, odwary slazu korzenia, storczyku, iuż wyżej tyle razy powtarzanych, Nr. 21 smarowania, pół kąpiele, enemý z oleiu lnianego. Essencya bobrowa, ulotna po 20. do 30. kropel w tyżce wody, podług potrzeby co



godzina, półtory, dwie, miasto herbaty do popijania pokroplach nalania rumianku, zmieszanego z żółtkami oleju świeżego lnianego z dodatkiem odwaru storczyku, tegoż częste po łyżce branie, i inne środki, które się przy cholerze umieszcily. Przy tych środkach pozostać wypada, pokąd tylko kurczowe cierpienia nie zwolnieją, długo przy ich użyciu pozostać nie można, a to dla nie pomnażania większego rozwolnienia żołądka, a zatym i jego osłabienia. Po czym przystąpić do wyprowadzenia zamuleni i innych zanieczyszczeń żołądka, do b) zatym służą użycie proszku samego z korzenia ipekakuanu pieprzu ziarek 5. do 20. rano nadecho włożyć wody, i popić wodą. Można i w dni kilka wzięcie iego powtórzyć, jeżeliby się zaflegmienie, zamulenie języka nie smak utrzymywały, dobrze także służą krople rumbarbarowe Nr. 23. Co do c) tu służą Nr. 3. 5. 24. i przy tych czas niemają pozostać wypada, wszelako używanie świeżego powietrza, poruszeń ciała w żaden sposób przepomnieć nie radzę, a co się tyczy dyetety zachowania, ta się nie tylko stosować powinna co do ilości potraw, ale nawet i co do ich natur, iakoż przymiot ostatnich nie raz zastąpić może naysku

teczniejsze leki, np. jeżeli iak się wyżej nadmienilo, daie się kwas żołądkowy czuć, i takowe odbijania nie raz chorych dręczą, mięsna dyetla lepięć daleko służy na ulagodzenie kwasu niżeli roślinna. która takowy pomnaża, wszelako z mięs wyłączyć można tłuste, wieprzowe, osobliwie świeże, kiedy słone, wędzone, dobrze pożute, nie mnięć ozory służą przez samą wzniecającą żołądka czynność, iako środki wzmacniające tenże. W ogólności są to otwarcie szkodliwemi wszystkie wyskokowe napoje rozgrzewające, równie iak potrawy korzenne, a do tego twarde do strawienia. Druga przyczyna kurczowych cierpień pochodzi z drażnień nieczystości żołądkowych dość często odpowiadających konstytucyi chorego: tak przy cholerycznym obłitość i ostrość żółci towarzyszy, przy flegmatyku, kwas żołądka, zaflegmienie, zamulenie. Przy tęg znowu przyczynie powyższe użycia środków dyetetycznych, a co do kwasu ulagodzenia służą takoz podane pod literą c) iako i magnezja Angielska iia proszek tartą po łyżeczce od kawy, 2. lub 3. razy na dzień żażywać z wodą, użyć się więc z podanych środków, iakie się pod ręką znajdą, wprowadzić ulagoda



czasowo kwas branie magnezji, przeci-  
cie daleko stałey działał gorzkiey na-  
tury rzeczy wzwyż przy liczbach 3.  
5. 23. 24. nadmienione, nie tylko na  
uogodzenie, ale nawet opieraia się sil-  
nie temuż, to się więc przy napadzie  
samym cierpień wyżej podało, iżko i  
do umocnienia żołądka to wszystko  
powinno być i tu używane.

Oprócz powyższych dwóch przy-  
czyn iako naye częstszych, równie zda-  
rzyć się może kurczowe cierpienie przez  
zaziębnienie, przy reumatycznych cier-  
pieniach, przy wstrzymaniu zwyczaj-  
nych krwi odpływów. Na te znowu  
przyczyny końcem pokonania cierpień  
kurczowych, ile tylko takowe nie są  
z przytomną febrą i gorączką połączone,  
sąż środki podane przy febrze kata-  
ryczney, po zaspokoieniu kurczowych  
cierpień, do których usmieszenia pospie-  
sznięzgo pół kąpiele, przykładania  
synopizmu, wizykatoryi na żywocie,  
rękach, łytkach, przyłączyć wy-  
pada.

### O Szkorbucie.

Ta choroba może być co do swo-  
ich znamion na dwa przebiegi podzie-  
loną. W pierwszym przebiegu począt-  
ko-

kowym przedstawiaia się odętości, o-  
brzmiałości, bladości całego ciała i twa-  
rzy, przyłączaia się: śniętość, ocię-  
żalność wznaga się osłabienie po szczu-  
pym nawet chodzie, suchość skóry,  
krótkie pokaszlujące tchnienia, świerz-  
biące, nabiegające, czerwone, łatwo  
przez dotknięcie się krew sączące dzią-  
sła, cuchnące oddychania, chwiejące  
się zęby, bóle po kościach, piersiach,  
stawach, plamy po rękach, nogach,  
żywocie, piersiach, twarzy, koloru  
prawie sinawego, żółtawego, sinego, i  
te bywaią różney wielkości, apetyt ie-  
szcze zwykły się przy tém utrzymywać.  
W drugim znowu podziale, czyli sto-  
pniu, powiększaia się powyższe znamio-  
na, a w skutku tych powstaią gębczaste,  
łatwo krew sączące czarne bolączki, czy-  
li wrzodeczki, osobliwie po nogach,  
do tego skłonności do krwistych od-  
pływni, iako to: uryny krwistey, bie-  
gunek takowych, przebiegające bóle po  
stawach, członkach, kościach, późnię  
przyłącza się kaszel z wypluciem po-  
dobnem do ropy, opuchliny, zgniła go-  
rączka, febra suchotna, i te smutny wy-  
chod choroby przepowiadaia.

Przyczynami do tey choroby są al-  
bo naybliższe albo oddaleńsze. Nay-  
bliższa wspiera się na niedostateczney



stałych części sprężności, a zatem i ich słabe na płynne części działania przyczyn i płynne usuwają się z pod zwykłej iak przynależy do siebie spójni. Do odleglejszych znowu przyczyn, które uważać można za nasiona do téj choroby to wszystko cokolwiek parowania skórne wstrzymuje, trawienie osłabia, nie zdrowy pokarm przysposabia, i rozwolnienie w częściach stałych wprowadza, iako to: wilgotne; zimne, lub wyziewami szkodliwemi zanieczyszczone powietrze, brak około siebie, bielizny potrzebnej czystości, użycie twardych tłustych do strawienia ciężkich potraw, niedostatek roślin, ogrodowin, czystej wody, ciągłe sinutki, niewygody, poprzednicze choroby. Wskazania do leczenia téj choroby są następujące: *Pierwsze* zawiera w sobie przepis pokarmów odpowiadających naturze przyczyn teyże choroby, bez ścisłego dochowu przez pokarmy i napoje do o. zdrowienia nie dojdziemy, ale nawet niewątpliwą przysposobiemy chorobę. *Do drugiego* ięj stopnia. Wybór dyetetycznych środków stosować się powinien do konstytucyi ciała, iakoż przy słabowitych, flegmatycznych, zimnych, pokarmy powinny być rozgrzewające więcej niż kwaskowatej natury, do te-

go silnie pokrzepiające siły, im więcej osłabienia ich doznaie, który z nadmienionych tu konstytucyi chory, tém więc rosóły mocne, korzenne, mięsowa świeże, prócz świnin, z chrzanem, musztardą, kasze kleiowe, najlepiey służą: wino, wódki, w miarę użyte; za napój zaś odwariałowcu, słodcu, woda żywiczna wielką podporę w leczeniu przez dyetetyczne środki stanowią.

Przy silniejszych nieco konstytucyach, gdzie do tego nie czują kwasu w ustach, w pierwszym zwłaszcza téj choroby okresie osłabień znacznych. Tu więc na dyetetyczne środki następujące się podają: Roślinne naturalnie lub sztucznie kwaszone, kapusta, buraki, owoce kwaskowe i takowe rośliny iako to: szczaw, ocet piwny, miodowy, tęgie, winny, w porze przyzwoitej śmietany kwaśne, barszcze, burakowy zacyniony miasto wody do zgotowania w nich mięsa świeżego na rosół, też same mogą być czyste za napój: wykazana dyeta tym jest skuteczniejszą przy powyższej konstytucyi, gdzie się jeszcze dostrzega puls mocny, wzruszenia febryczne, gorączkowe, kwasy znowu kruszczowe iako to: solny, saletrzan, siarczany, iakikolwiek z nich powinien być wodą rozcieńczony, aby



woda kwaskowato smakowała. Że użytek takowey wody powinien być ciągłym, zwłaszcza gdzie się okazuje rozpuszczenie krwi przez odpływy ięcy, urynę, stolce, lub zdziałanie bolączki celnace, przez takoweż oddychanie, aby tak użyta nie studziła ciepłika żołądkowego, przeto i nieosłabiała trawności procesu, z powiększeniem skutku opierającego się krwi rozrzedzeniu, iako i utrzymania trawienia, służy dodatek do nięcy czwartęcy części czystęcy okowitki; napoju tego 3, lub 4 razy na na dzień brać można po małym kielišku. To wskazanie służyć powinno przy powyższey konstytucyi. Przeciwnie zaś przy słabey lub po przestąłych chorobach w których siły są nadwężonemi, iako to: po biegunkach, dysenterjach, w leczeniu upartych, służy środki wzmacniające, żywniące, np. odwar storczyku Ner. 3, 5, 9, 24, 27,

Do tych środków takż i powierzchowne wiele się do uleczenia szkorbutu przykładają. Gdzie więc użyć można kąpieli ciepłey, takowe z dodatkiem do iednęcy po garcu okowitki co dzień czynić wypada, alboliteż gotować wprzód wodę z korzeniem tataraku, korami wierzbów, a gdzie nie ma

sposobności kąpania, odwarem tym raz, dwa, na dzień całe ciało obmywać.

Pozostaie ieszcze podanie środków naprzeciw obwisłości, słabowitości dziąseł, grzybowatościom na nich. Tu służy smarowania dziąseł miodkiem różanym, do którego np. łyżek 2, 3 dodać kwasu siarczanego rozciężzonego do kwaskowatości i piórkiem dziąsła smarować. Robić także można do płókania dziąseł mocny odwar z kór wierbowych, które się wyżej podały; do półkwarty tego odwaru dodać myrry na proszek tartęcy, ałunu po półkwentki i tym razy 2. 3. na dzień płókać dziąsła.

Nastąpione polepszenie uważane być powinno za wstęp dalszego leczenia, ale to już zawiera w sobie ciągłe używanie dyet wyżej podanych, zastosowanych do konstytucyi szkorbutyka, a o tym już się wyżej mówiło, ile zaś zręczność dozwoli brać kąpiele, przynajmniej ciało myć wodą letnią samą lub z dodatkiem 3 części okowitki, razy dwa w tydzień powtarzać, na gołem cieie nosić flanelkowe kaftaniki, gatki, aby takowe trąc nieustannie organ skóry parowania ięcy utrzymowały, z któremi chorobliwe pierwiastki w ciełkach pozostałe tak w płynnym jak uło-



tnym stanie z ciała wychodziły od zaziębień i tak zwanego reumatyzmu szkodliwego ochraniały.

### O Opuchlinie.

Każde wystąpienie i nagromadzenie się znaczne wodnistych lipkich ciała naszego ciekości, w którejkolwiek części ciała, jego wydrążeniach, lub po całym podskórzu nazywa się opuchliną, pomniejszą zaś nabieganiem. Tak pierwsze iako i drugie nader rzadką przez się stanowią chorobę, ale raczej są skutkami przyczyn powierzchownych lub wewnętrznych, iako też i następstwem poprzedniczych chorób. Przejdziemy też przyczyny porządkiem:

*Do przyczyn powierzchownych* liczyć można pomieszkania wilgotne, zanieczyszczone wyziewami ludzkimi w nich powietrze, wystawiania się na deszcz, słoty, zimna, przy nędznym i niedość ogrzewającym ciałem odzieży. *Do wewnętrznych*, znowu to wszystko, co może przedrażnienie z przedrażnienia wyprowadzać osłabienie, tu na przykład wpływa nadużycie trunków rozgrzewających, ich mieszanina, życie lubieżne, poprzedniczych chorób powroty, miękka budowa ciała, flakowa-

ta, obwisła: następczemi znowu przyczynami być mogą, zaziębienia w wodrze, lub po przestających febrach, długotrwałych, mianowicie czwartaczek zawczasie tych zatraconych, biegunkach, dysenterjach, częstym krwi upuszczaniu, lekarstwach gwałtownie laxujących, gorączkowych chorobach, w których przebiegu siły żywotne wyczerpanemi, iak sprężność włókien mięsnych, a przytym i naczynia wodniste, lipkie, tak dalece osłabionemi zostały, że znaczniejsza daleko tychże cieków ilość pomiędzy szparki włókien mięsnych, wtkankę kómkowatą, w wydrążeniach różnych, iakoto, żywota, piersi, w nich położonych organów, od których też i swe nazwiska otrzymuje, wydzielaną i tamże wstrzymaną bywa, niżeli tą ilość naczynia ssące przyjąć w siebie, do innych ciekości naczyń doprowadzić, poza granicę ciała, częścią przez poty, częścią przez urynę, uprowadzić nie są w stanie.

### Leczenie.

Zawiera w sobie użycie środków, przez które usunąć się mogą szkodliwe wpływy, obrzmienia lub i same opu-



chliny wyprowadzające, a te my do podziału wyżęcy umieszczonego podajemy stosownie,

Do przyczyn zatym powierzchownych nadmieniliśmy, iż należą pomieszkania wilgotne, takowe więc odmienić wypada na górzyste, suche, i któreby słońce ogrzewało, nie zapomnieć przytym o wysuszeniu pościeli, bielizny, odzieży, gdy i te znaczną część wilgoci wsiebie wciągają, nacierania flanną lub chustą ogrzaną całego ciała, rano i na noc czynić, pod wieczór zaś dla pozbycia się z ciała przez poty i urynę wilgoci, pić iak herbatę po rary kilka na dzień ziele zbiedrzeńca zwyczajnego (*pimpinella saxifraga*) alboli też mieć wpogotowiu essencyą z korzeni teyże rośliny w okowitce moczonych. Sposób robienia téy iest pojedynczy, tu się umieszcza. Wziąć suchych korzeni łótów 6. 8. potaziu czyszczonego pół łota, okowity czystéy kwartę, moczyć w naczyniu sklanném na ciepłym miejscu przez godzin 40. poczem wycisnąwszy mocno, przez bibułę przepuścić i do używania zachować. Stéy essencyi brać co 3. lub 4. godziny w dwóch łyżkach wody po 40. do 60. kropel i popić wodą, albo pić pod wieczór bzowy kwiat

międem osłodzony i octem do miłej kwaskowatości zaprawny po sklance ciepło, lub też rozpuścić łyżkę powideł bzowych, samych, albo na wpół z Jałowcowemi, w aptece domowéy znajdować się powinny, przynajmniej przepomnianeni wnaszcy nie zostaną. Tych więc wziąć pół łyżki stołowéy, rozpuścić w wodzie i wypić pod noc na raz, popić można albo bzowym kwiatem, albo ciepłym piwem, co przez kilka wieczorów powtarzać. Jeżeli znowu od wielości ludzi, co się jeszcze więcej do téy choroby zwykło przyczyniać, niskie pomieszkania, należy ią zmniejszyć a przynajmniej odświeżać często wniem powietrze w porze dogodnéy, w czasie wilgotnym, mglistym, dżdżystym, mroźnym: oczyszcza zanieczyszczone wyziewami ludzkiemi, a nieraż i domowych zwierząt w srogości mrozów przytułek wpomieszkaniach ludzi mających, palenie na kominie, i tym to srodkiem winni są nasi w swych chatach rolnicy ochronę zdrowia więcej, iak rzeźwości pracowitości zabiegom, przemysłowi rolniczemu silną od nędzy i iéy skutków zasłonę. Co znowu do przyczyn przedrzazniających, a wskutku tych i osłabienia zrządzających. iakotob: z nadużycia trunków



zbytecznie rozgrzewających, pomiędzy którymi wódka i inne tegoż rodzaju wysoki, są nayszkodliwsiemi, spowodu że otrętwiają drażliwość naturalną włókien mięsnych, czułość nerwów zatracają, spoinią niszczą w tym stopniu, że w końcu czynności ich słabiec muszą, cieki zaś mianowicie lipkie daleko gęstsze się stają, gdy te nie mogąc przekręcać przez subtelniejsze naczynia, doznać w nich wstrzymania, skąd powstają wzmiankowane zatkania wątroby, śledziony lub innych brzusznych organów. Mogą także nastąpić i opuchliny po nadużyciu ciągłym i innych napoiów, które lubo nie mając tak silnego jak powyższe poprzedrażnienia przymiotu, przecie rozwalniając włókna mięsne tracą swą sprężność i zwykłe kurczenie się, łatwo znowu cieki lipkie wodniste naczyni dla nich przeznaczonych po za granice swe występować, wylewać się muszą wróżne ciała wydrążenia, lub też i powszechnie pod całym podskórzu.

Dopuszczając się tych przedrażnień w wieku młodym, w kwiecie życia, przy dobrej żywności, która przecie przędzcy lub późnięj wstąpić musi: środków następujących w leczeniu opuchlin i obrzmień potrzebuje, któreby

mogły niciako ochłodzić owe krwi nadpotrzebne rozgrzewania, skutki przedrażniające naczyń usmierzyć, zapchania położonych w żywocie organów poruszać, rozwalniać, a wystąpione poza granicę naczyń swych cieki do nich odprowadzić, wzniecając ich nadwierzoną czynność, i dopiero z ciała przez drogi urynowe lub potu wyprowadzić. Środkami temi są: kremortartari od drachmy zacząwszy, 2, 3 razy na dzień zażywać w wodzie, po kilku dniowem użyciu powiększyć można dążę do dwóch drachmów, z dodatkiem do każdego proszku cukru 20 ziarek, na który napuścić olejku kopru włoskiego, lub anyszkowego, lub ialewcowego po iednę kropli razem zmieszawszy, co nie dopuszcza laxowania, ale raczej działa na drogi urynowe, z tem wszystkiem przystąpić może i laxowanie, jeżeli to nie jest osłabiającem, a stolce wodniste, przy użyciu ich pozostać, i tylko branie do dwóch razy na dzień przeznaczyć, iak ilość kremortartari zmniejszyć. W chorobie téj, iako i we wszystkich mianowicie chronicznych, używanie iednych leków zrządza oswaianie się zniemi natury, a zatym wolnieie ich skutkowanie. Na takowy znowu dość często zdarzający



się przypadek wypada do innych równie skutecznych udać się środków, i temi znowu są kwasy solne, kruszczowe, oba nie mają już przymiotu laxowan, iako raczćy działać na drogi moczowe. Z pierwszych jest sok kwasnicy, którego wodą rozcieńczony do kwasowości dobrćy, i taż miodem, cukrem, może być ułagodzoną. z napoju tego brać co 2. godzin po szklance, latem, kiedy dostać można szczawiu, sok z niego wycisnąć, zagotować, przeceździć i o tymże czasie co wyżćy po tyżek 2. dać 3. 4. naraż wypić, równie i octy mocne, iako to: winny, piwny, miodowy, z wodą mogą być użyte, gdzie nie ma soku kwasnicy. Z kruszczowych zaś kwasów saletrzany, i solny (*Acidum muriaticum*) daleko skuteczniejszemi się w moich doświadczeniach nad kwas siarczany okazały, iedynie że pierwsze dwa to jest saletrzanny i solny, nie działają tak na kanał kiszek iak na drogi urynowe, gdy ostatni sprawić może i wolne po razy kilka dniem stolce. Którego z tych dwóch kwasów użycie jest następujące. Wziąć półkwarty wody krynicznej lub i kwartę, dolewać tyle ziemnego lub drugiego kwasu, aby przybrała umiarkowaną kwasowość, a

kto chce, może ją i osłodzić, brać po tyżce od iedzenia, co 3. godziny popić wodą, aby ieszcze lepiej w żołądku rozcieńczonym został, aczkolwiek te kwasy przytym stanie ciała, którego do mocniejszych środków wskazaliśmy, są skutkującemi, przecie długie ich użycie iako wchorobieciągłćy studzi ciepłć żołądka i trawności uszkadza, temu więc zaradzić można w następujący sposób: wziąć albo korzenia biedrzyńca lub kalumusu łóów dwa, gotować w półtory kwarty wody, do zostania się kwarty albo nieco mniej, przeceździć, ostudzić, i którym z tych kwasów do miłćy kwasowości zaprawić. Użytek jest tenże sam co wyżćy, miasto korzeni, kto chce, zrobić można nalecie z wrząćy wody, np. półkwarty, i wsypać do niej piołunu 2 dobre szczypcie, moczyć do ostygnięcia, temiż kwasami zaprawić, i iak powyżćy używać. Przy tych środkach nie zapominać o nacieraniu dwa razy dniem całego ciała, do czego służą flanela, kuczбай, a nawet i chusty, te można z powiększonym skutkiem wprzód albo nad dymem ialowcu dobrze okadzić, lub kamforą dobrze natrzeć. Jeżeli żywot i nogi znajdują się w stanie opuchliny, po uczynionćm nacieraniu smarować,



pod Nr. 21. nabiegania zaś nóg znosić się mogą nacieraniem tymże, smarowaniem, miernem chodzeniem, a w końcu i opasowaniem szerokimi na palcy trzy bindkami. Dyetta powinna być zastosowaną do stanu chorego, natury choroby, tu mogą być używane wołowienietłustemięsiwa, gotowane z chrzaniem lub musztardą, pieczone zaś cebulą dobrze przyprawiać, z ogrodowin zaś: marchew, pasternak, pietruszka, selery na iarzyńę gotowane, aby nie z wieprzowiną, wielce pomagają do powiększeń pędzenia moczu. Wszelkie zaś ciasta, które żadnego kiszenia nie odbyły, témbardziej tłuste, nie powinny być używanemi, zwłaszcza gdy jest żywot opuchły. Z napoiów zaś służy, piwo lekkie, gorzkawe i dobrze wystawione, lub podług możności, woda z czwartą częścią win kwaśnych. Używane te być powinny w miarę i do istotnej zakrapiania się potrzeby, w czym dać przestrożę, aby chorych nie dręczyć, iak się dość często zdarza, że im picia wzbraniają dla zwiększenia opuchliny; uprzedzenie to jest szkodliwem, ponieważ wstrzymane w swém krążeniu ciekli lipkie i wodniste bardziej ostrzeżają i gęśnią, gdy dostateczne napoiów użycia raz służy za bodźce do działań

dróg urynowych, drugi, że rozrzedzają wstrzymane soki, ostrość ich ulagadza i do odpływu uryny się przyczyniają. Co się zuowu dotyczy przyczyn do opuchliny z lubieżnego życia, są nayszkodliwszymi zawczasie rozpoczęte, a do tego czyste, daleko zaś szkodliwszymi samogwałty, im dłużey i częściej takowych się dopuszczano. Ogłoczone ciało i jego cała budowa z sily żywotney, z dostateczney pożywności, nayszczęśliwsze i nayupartze w leczeniu choroby rządzą, do których i opuchliny należeć mogą: na takowe nie podaje się tu środków z przyczyny, iż takowe życia nayeściej prowadzić zwykła miast wielkich młodzież, gdzie nie zbywa im na doradcach i sposobach ratunku, lubo nader mylnego: przestrzegając zatym aby się kaili czytając to dziełko, lub słysząc przestrogi od czytających, na iakie się wystawiają cierpienia, skracając im w kwiecie młodości życie: że zaś wcale jest obcem takowego życia prowadzenie dla zwanych prastaczków, umocowanych wprawidłach religii, nie doznając z tey przyczyny opuchlin, niepotrzebują też i rady. Co do poprzedniczych chorób napadów rządzących opuchliny, te iako w skutku osłabienia bądź to micy-



scowego, bądź powszechnego, środków wzmacniających potrzebują, a niemi są. Nro. 3. 5. 9. 24. 31. same przez się lub z dodatkiem 4tęj części do nich Nr. 28. Przy tych użyciu czas nie mały pozostać, świeżego suchego powietrza, ciała poruszeń, iego nacierania nie zaniędbywać, przy dyecie żywności, łatwcy do strawienia: napoiach wzmacniających pomiernie użytych, aby służyły na pokrzepienie, podniesienie, i utrwalenie siły żywotney, nie zaś za środki z nadużycia szkodliwe. Powstałe znowu opuchliny z konstytucyi ciała miękkię, które przy różnych konstytucyach, pod literą b. z pomniejszeniem siły żywotney podaliśmy, tam powiedziano, że takowa ciała budowa ma zarody do opuchlin i obrznień: tam tedy podaliśmy dyettetyczne przepisy, któreby im zapobiegać mogły; stym wszystkiem lubo samo uchybienie takowych przepisów, lub w skutku teyże ciała budowy, prędzcy lub późnię przedstawiają się i obrzniecia, i same opuchliny, wzbudzaających drażniących wymagają środków, któreby były wstanie umniejszoną siłę żywotną daleko czynniejszą uczynić, a działania nerwów układowi naczyń wzniecić, i doprowadzić do stanu, aby mogły wydzie-

lone

lone soki wodniste lub lipkie w siebie wysysać, i z ciała przez powyżcy wznian-kowane drogi uprowadzać. Wieloliczne ku temu wskazują się środki, nayskuteczniejsze z nich umieścimy, gdzie przy opuchlinach nóg, iak się dość często zdarza, plamy sine lub sinoczarne, we, mniej lub więcý po nich szerokie się okazują, tam służy użycie kremortartary, o którém się wyżcy mówiło, lecz do niego domieszywać potrzeba środki, któreby siłę żywotną zmniejszoną podwyższały, można na ten zamiar zrobić mocny odwar z korzeni biedrzyńcu, tataraku, kozłku, wzięwszy któregokolwiek z nich np. łótów dwa, 3. gotując w kwarcie wody do zostania się półowy, przecedzić, i póki jeszcze gorącym jest odwar wsypać do niego łótów 2. kamienia winnego, czyli kremortartary, kto pragnie, dodać miodu prasnego czystego trochę, i zamieszawszy dobrze, co 2. 3. godziny brać po łyżce od iedzenia, popiając wodą lub gotowanym w wodzie ialowcem. Przeciwnie nie może być użytym tenże kamień przy osłabioney już znacznie sile żywotney, w takim znowu razie użyć można następującego środka. Wziąć potażu czystego łótów 2. gorczyzki, żółci ziemney (*gentiana cen-*

Część II.

36



*tarum*) albo goryczki łąkowej (*gentiana amarella*) lub polnej (*G. campestris*) albo goryczki krzyżownicy (*G. Cruciata*) łotów 4. okowitki i wody czystej równe części, np. po trzy kwaterki, moczyć to w cieple godzin 30. mocno wycisnąć, przepuścić przez bibulę, i z tego brać po łyżce stołowej 3, 4 razy na dzień. Można też i inne moczenie przygotować, a nawet i na odmianę używać, zwłaszcza gdy długie powyższego moczenia branie mniej zacznie skutkować, iak się to zdarzać zwykło przez oswoienie się z nim drżliwości układu. Do teyże samey ilości okowitki i wody wziąć goryczy całej i chrzanu pokraianego, każdego po łotów 2, moczyć i używać, iak się wyżej nadmienilo.

Innych znowu środków wymagają obrzmienia lub i same opuchliny pochodzące w następstwie innych chorób, te nam ieszcze przeysć krótko wypada wraz z udzieleniem leków, a tak ieżeli po zaziębieniach odry, służyć mogą leki Nr. 8. 9. proszki kamforowe Nr. 10, dawać pić kwiat bzy, w reszcie zachować to, co się przy odrze podalo.

Po przestálych zaś febrach potrzebne iest uzycie środków wzmacniających, podanych pod Nrem 3, 5, 9, 24.

przy użyciu należy pozostać czas długi, równie i tu nacierania suche, albo części obrzniętych, lub i całego ciała, czynić należy, iak się wyżej podalo. Zaziębień się wystrzegać: w czasy suche, pogodne, używać ciała poruszeń, wystrzegać się zaś wieczorów chłodnych i przed słońca zachodem w pomieszkaniu się znaydować, dyetty żywny, lekkiey do strawienia używać, iako to: rosółów wszelako nie tłustych, nie słonych, korzennych, gęste zawsze są daleko użyteczniejszye, iako to: zryżem, bulką białą, kaszami, niżli rzadkie, a do tego często przez dzień używane: takowe posilają w prawdzie ciało, wszelako osłabiają żołądek, i byłyby daleko użyteczniejszye na pokarm, gdyby ich wśród innego iedzenia stalszej natury lub na samym końcu używano. Życzyćby wypadało wprowadzić i upowszechnić ten zwyczaj, który mógłby ochronić od osłabień żołądka, i od wielu cierpień z tej przyczyny pochodzących, iesliby zaś to nie znalazło miejsca, przynajmniej wystrzegać się zawsze wypada pić rosoly gorące, które oprócz że rozwalniają błony żołądka, szkodzą ieszcze że rozwalniają dziąsła, i do łatwego odkrycia korzeni zębów przysposabiają, przez co się te i dość chwie-



iącemi a nawet łatwemi do wypadania staia. Do dyety, mimo tych pokarmów, służą (oprócz wieprzowin słonych, wędzonych mięs, gęsi, kaczek) drób wszelki, więcący pieczony niżeli gotowany, przytém zostawiać domięszyszywać szczupłą ilość ogrodowin, a z legumin tylko mające kley w sobie. — Co do napoiów rozgrzewających użytku miernego, iako siły żywotne podnoszące, wzbronionemi być nie mogą, przeciwnie używanie herbaty samey, i innych wodnistych, może się stać szkodliwem.

Też same środki i dyetę wskazuemy do obrzmień i opuchlin, pochodzących w następstwie po biegunkach, dysenterjach, częstém krwi upuszczaniu, lekarstwach laxujących, gorączkowych chorobach.

*Koniec Rozdziałku Drugiego.*

## ROZDZIAŁEK III.

### CZĄSTKA PIERWSZA.

*O Febrach przerywanych zimnych i innych gatunkach.*

Febrami powszechnie nazywamy choroby, które z drżeniem, poziewaniem, trzęsieniem całego ciała, lub łamaniem jego części, ziąbem, silném zimnem, gorączką, pragnieniem, utratą apetytu, osłabieniem, nudnościami, nie raz i wymiotami są połączone.

Pomiędzy temi znamionami są charakterystyczne zimno, od którego się rozpoczyna napad febryczny (*paroxysmus*), a to może być łagodniejsze, silniejsze, długo lub krótko trwające, po którym przystępuje gorączka. Przy zimie dostrzegamy otrętwień palców, siności warg i paznokci. Gorączka nie zawsze odpowiada stopniowi zimna, nie raz bywa dłuższą i silniejszą nad samo zimno. Po każdéj zaś gorączce im obfitszy pot następuje, tém łagodniejszy.



szy następny zimnicy napad się odbywa, przy niej i po niej zwykły pot następować wraz z snem siły pokrzepiającym.

Powszechny zimnic podział zaszła się na czasie, w którym odbywa się napad, ztąd są: *iedno-dniowe, codzienne, trzeciaczki i czwartaczki*. — *Jedno-dniowe*, że napad raz się tylko okazuje; po nim następuje pot, ten bez dalszego powrotu zimnicy całą chorobę zakończy. — *Codzienne* zaś, kiedy napad każdego się dnia odbywa. — *Trzeciaczki*, kiedy w dwóch dniach ieden napad przychodzi. — *Czwartaczka* znowu bierze swoje nazwisko, iż napad czwartego dnia się odbywa. — *Codzienne i trzeciaczki* bywają regularne i nieregularne, pierwsze napadają w iednejże godzinie, drugie niepewny czas utrzymują. Nieraz regularne przechodzą w nieregularne, a napady ich albo się pospieszają, albo się opóźniają.

Niektóre z zimnic poiedynczemi bywają, i podwóynemi (*duplicata*), to iest kiedy napad odbywają dwa razy w 24 godzinach, to się nazywa codzienną podwóyną. — *Trzeciaczka* zaś w czasie 24 godzin odprawia ieden napad.

Prócz tego podziału iest i następujący: iedne z nich nazywamy wiosno-

wemi, drugie iesiennemi. — Wiosnowe rozpoczynają się w Lutym, i trwają aż do sierpnia. Wszystkie przerywane zimnice przez te miesiące do rubryki wiosnowych należą, ale równie trwać mogą rozpoczynszy się w Lutym aż do Sierpnia; ieżeli dałemy sobie przyczynę do ich tak długiego trwania np. przez błędy w dyecie co bywa najpospolicię, że nawet i po ustaniu zupełnym na czas krótszy, dłuższy razy dwa powracać zwykły. Jesienne zaś febry zaczynają się od sierpnia, trwają do Lutego, i powszechnie napadają mieszkańców bagnistych położeń. — Dostrzegamy oprócz tych i innegatunki zimniców, tak zwanemi ukryte (*Febres larvatae*) np: głowy bóle, żołądka, kiszek, te powszechnie dni swoje i godziny iak inną febra przerywana utrzymują. Drugi gatunek feber tak zwany, ciągłych (*Continuae*), ten się znowu poznaie, kiedy ziąb, gorączka, pragnienie, trwają nie przerwanie, chociaż mogą być te nieco łagodnieysze iak drugie silnieysze, kiedy w tym gatunku chory silną gorączkę czuie, i aż do maiaceń postępuje gorączka, nazywają się febry zapalne. — Każdy znowu stan febryczny wyżej opisany, trwający przez tygodnie, miesiące it. d. chociażby przerwy napadów



były krótsze lub oddalsze, nazywają się febrami trawiącemi (*febres lentae*).

Febrom często następujące symptomata towarzyszą, iako to: silne głów bóle, ciężkość na piersiach, krwi z nosa plynienie, omdlenia, biegunki, żółtaczki, kłócia w bokach, małaczenia.— kiedy znowu więcey z tych symptomatów się łączy i zwiększają stan febryczny, i napady trwają dłużej iak zwykle, nazywają się *złemi* lub *niebezpiecznemi*.

Jeszcze się dość często zdarza, że trzeciaczka zmienia się w codzienną, a ta zwykła bywać daleko do przełamania upartszą iak trzeciaczka: czwartaczka z nich jest do uleczenia nayupartszą i nader rzadko przed 14 napadem ustaie, panować zwykłą podczas iesieni ulewnéy.— Wszystkie febry przerywane do wiosnowych należące, daleko są w leczeniu łatwiejszemi niż iesienne.

### *Zachowanie się przy nich.*

Przy następnych przestroгах wielce zależy, ażeby się chorzy w febrycznych napadach spokojnie i cierpliwie zachowywali. Jeżeli są dzieci 2. 3. letnie zaraz przy początku zimnicy w łóżko ie położyć, dać im letnio, nie zaś gorąco pić,

kwiat bżowy lub rumianek często a potrochu, dorośli i starzy ile możności chodźć, nie zaś leżeć powinni, wcale zimnych napoiów używać nie mają: dzieciom zaś starszym od lat 3, 4. i t. d. daleko szkodliwiey jest, kiedy się w czasie napadu zimnicy kładą, lub futrami i pościelą przykrywają. — Podczas znowu gorączek chłodzących napoiów używać, tu służy woda czysta, woda zimna, w której się niedługo grzanka zrumieniona gorąco włożona; moczy cienkie kleie z kasz: ięczmiennéy i owsianéy; napoje kwaśkowe, iako to: woda z octem, limoniada, orszada, odwar kwaśnicy, barszcz burakowy zacyniany, wprzód zagotowane i przestudzone, wiśnie suszone w wodzie gotowane i t. p. tych napoiów często a potrochu dawać, i nigdy nie dozwałać na raz obfitego ich picia, ieżeliby, iak się dosyć często zdarza, że bywa pragnienie mocne do nieugaszenia, ięzyk suchy twardy iak skóra, to daleko lepiej jest, często brać w usta wodę z octem, często odwilżać i wypłukać, aniżeli szklankami pić. Napoje takowe lubo uśmierzaia pragnienie, ale bardzo studzą ciepło żołądka, przeto osłabiaia iego napóźniéy moc trawienia.— Do tych przestróg wielce jest potrzebną, aby chorzy wystrzegali potów w niczem nie przery-



wać, dla tego nie mają w czasie ich na powietrze wychodzić, zimną wdziwać koszulę lub zimnych używać napoiów, wystrzegać się złości, gniewu i t. d. potraw do strawienia trudnych choć w czasie wolnym od napadów, a tém szkodziwić w ilości znaczney używanie tychże.

Scisłą z lekkich pokarmów składającą się dyettę słusznie liczyć można do srodków dzielnie służących na ich zatracenie, w przeciwném zachowaniu się mnięć ciało żywioném zostaje, iak nieomylnie trwanie febrы silniejsze: ięć napady a nawet i nader łatwe ięć powroty zapewnia. Jeżeli dzieci od febrы przerywanych są napastowane, nie dawać im nic do iedzenia przed ięć napadem, a dopiero lekkimi posilać pokarmami w godzin kilka po ustaniu zupełnem każdego napadu wraz zgorączką.

Taż samą ostrożność zachować powinni i starszego wieku, chociaż użyć mogą w czasie wyżey nadmienionym mięs, przecie nie wieprzowych; nie tłustych, twardych, lecz białego mięsa: równie nie mają używać potraw wiatry sprawujących i trudnych do strawienia.

Pozwalać w czasie pogody używać ciał poruszeń, aby tylko te nie były

do zmordowania, i zagrzaną się mocnego czynione, a nawet i iedzenia, przez te srodki przy zachowaniu dyetty nayupartsze febrы wolnieją, a w końcu i zupełnie giną. Jeżeli zaś położenie wilgotne, i takowe pomieszkanie jest przyczyną febrы, wypada takowe odmienić, chcąc uniknąć nastąpić mogących całego ciała obrzmień, a nawet i samych opuchlin.

Te są ledwie nie gatunkowo służące na zatracenia febrы srodki, iakoż liczne uczą doswiadczenia, że bez nich przy nayskuteczniejszych lekarstwach przeciez są upartemi w zatraceniu onych, iak nader łatwemi w swych powrotach.

### *Srodki Lekarskie.*

Po odbyciu kilku paroxyzmów zimnic zachowawszy się podług powyższych warunków, ieżeliby wymagała potrzeba, wzięść proszek na wymioty pod liczbą 2gą. Oprócz tego skutku na wyprowadzenie górą nieczystości bądźto flegmistycznych, żółciowych z żółćką, wzruszanie całego ciała, które towarzyszy przy wymiotach, zrządza wypróżnienia i przez inne drogi, iako to: stolec, pot, urynę, co się silnie do



zagubienia zimna przyczynia. Tegoż samego dnia po ustaniu wymiotów, w godzin 3. zaraz brać moczenia z ziół pod liczbą 3cią: agdyby toż nie miało skutkować, pod liczbą 4tą, przy braniu tych lekarstw, iako i po zatraceniu przez nie zimnie, iak nayscisłéy dochować dane przestrogi, co do diety zaziębienia lub zamaczania nóg, i to przez niedziel 2. 3. a nawet i dalej, gdyby paroxyzmy dłużéy trwały i były mocne.

Wskazane dotąd leki zatracać są wstanie codzienne i trzeciazki zimnice, czwartaczki zaś są nayupartsze iako dla nieustannych odmian powietrza temu gatunkowi febrzy nieprzyjaznych, na zatracenie zaś ich przepisuie pod liczbą 5.

#### *O Febrach reumatycznych.*

Powszechnie dawać zwykliśmy to nazwisko wielu chorobom, rozumiemy pod niem boleść iednomieyscową, lub przebiegającą z wyprężeniem i uszkodzonym ruchem części dolegającej połączonej, ból po stawach, członkach z obrzmieniem ich przy febrze, i gorączce, lub bez nich. Pierwsze nazywamy *zawalnemi Reomatyzmami* (*rheumati-*

*smus acutus*) i powszechnie młodych krwistych drażliwych czułych dobrze żywionych napada. Drugie bez febrzy a przynajmniej nie tak znaczney, ani też gorączki, przy nie wielkim obrzmieniu, lub i wcale bez febrzy i bez obrzmienia, różne części ciała napadają i trwają nieraz długo w iednéy części te nazywamy Reumatyzmem ciągłym (*Rheumatismus chronicus*) powszechnie zwykły towarzyszyć temperamentowi flegmatycznemu, wiekowi podeszlemu, rozwiązłé życie wczesnie rozpoczynającemu. Oba te gatunki zwykły obok tych przyczyn towarzyszyć, i szczególnym ciał dyspozycyom, a nadto utwarzać wciągły cierpień i ich częstych napadów artrytyczne i podagryczne choroby. Nieraz napada toz samo Reumatyczne cierpienie, całe pacierzy kolumnę, lędzwie, czyni kark nieporuszalnym, lub wobrzmiuiu mocno dokuczającym, ściśnienia piersi kadłuba, głowy bóle, szum w uszach i t. p. boleści te do rubryki Reumatyzmu policzonemi bywają: a lubo dość często od zaziębień pochodzić zwykły, przecie doświadczamy, że oprócz téy przyczyny, wsamém nawet cieie nieiakkowe do nich skłonności i usposobienia się znaydują, iakoż są do nich iedni daleko łatwiejszemi niżeli inni ludzie, zanie-



dbywanie dość często tych cierpień, osobliwie początkowych ile mało od wielu uważanych, miewać zwykło złe wypadki. Febra zaś, którę się napęknęło, że tym boleściom towarzyszy, przechodzi w zapalną chorobę, a części dotknięte przez silne boleści nieraz na zawsze do poruszeń niezdolnemi zostają, lub na czas nieiaki osłabionemi.

### Obeyście się.

Przy tych zaziębionych czyli Reumatycznych febrach równie zaziębienie i zaciepłe utrzymywanie się bywa niepomocnem, ponieważ i pierwsze i drugie pomnażają słabości: a przeto Reumatyczne cierpienia daleko upartszemi czyni: potrzeba zatem na takowe być baczny, aby pierwsze mocniejszych nie zrzędało boleści iak drugie ulgę im przynosiło. To utrzymywanie wspiera się na doswiadczeniach, że utrzymując części dolegające chłodnię niż ciepłę, znacznie się nie tylko do zmniejszenia, ale nadto i do skrócenia Paroxyzmów febrycznie Reumatycznych przyczynia, i tego mamy Dowody na Reumatycznych zapalnych (*Rheumatismus Acutus*) gdy znowu przy drugich a do tego długich cierpie-

niach, bywa szkodliwsze iak pomocne ciepłe utrzymywanie, nie tylko części dolegających ale nawet i całego ciała, wszelką zatem odzież, pościel, oprócz tęg różnicy i co do pór roku, odmiany, powietrza co do klimatów, pomieszkani stosować koniecznie wypada: chcąc się zrazu pozbyć tych boleści, aby w ciepłą zamieszkania nie obrały, albowi też przez zachłodne utrzymywanie iego, i części bólami zaiętych nie zrzędzić wstępu tęg materji do części wewnętrznych, iako to: głowy, piersi, żywota, kiszek, z kąd mogą nierównie pochodzić niebezpieczeństwem grożące życiu choroby, iako to: zapalenia mózgu, oczów, pleury, wymioty, biegunki, a nawet i dysenterye, to tedy iest pierwsze iak stanowcze obeyście w leczeniu się, a bez którego nic zgoła przez srodki Lekarskie dokazać nie potrafiemy. Poniżej takowe podać nie omieszka, gdy o drugim koniecznym zachowaniu przepisie teraz mówić będziemy, i tęg zawiera się w dochowie dogodny dyety, iakoż stanowi takowa dzielną pomoc, i samym nawet srodkiem lekarskim. Dyetę ściłą zachować potrzeba przy febrycznych zapalnych Rheumatyzmach, tu są naydogodniejsze napoje chłodzące, iako to: sztuczne mle-



ka znasion już wiele razy powtarzane, kwaskowéj natury napoje odwar z kwasnicy, woda z octem, limoniada, woda z grzanką, kleie z kaszów kleiowych. Za pokarmy zaś albo rosoly z drobiu lub cielęciny, ale te nie powinny być zbyt tęgic, nieluste, a nayszkodliwiej korzenne, można do nich domieszywać do połowy kleie, aby te nie były gęste, owszem rzadkie, owoce gotowane, iaja świeże są dostatecznymi pokarmami na utrzymanie sił. Wszelki mięs uzylek, a tem bardziej tłustych, kaczek, gęsi, gołębi, wieprzowin, wołowych nawet jest szkodliwym, i tym szkodliwszy przy trwającej ciągle febrze i silnej gorączce która zwykła towarzyszyć tym cierpieniom. Jeszcze raz powtarzam, że tylko te środki są nayskuteczniejszymi do pokonania, a nieraz i zapobiegania powrotom na zawsze dręczących boleści. Lepiej jest na czas nieiaki pozbawiać się potraw smakowitych, napoiów rozgrzewających, a używać miłego zdrowia, niżeli dogodzić gustowi, zwyczajowi, a nie raz i przyczynie zrzędzającej boleści, i pozostać od nich nadal zupełnie uwolnionym. Jak znowu wcale inną dyetę zachować należy przy drugim gatunku tych cierpień, to jest: gdzie nie ma tak zna-

znacznej febry, gorączki, obrzmienia, lub wcale żadno z nich nie łączy się, iak się dość często zdarza przy konstytucjach nieczułych i flegmistycznych, skrofulicznych, w wieku podeszłym, poprzedniczo przestanych chorobach, w których znacznie siły żywotne wyczerpanemi zostały. Przy konstytucjach skłonniejszych do tych cierpień pewnie z osłabionej czyli chorobnej drażliwości organu skóry, iako powszechnego całego ciała pokrycia, która oprócz ust, nosa, najwięcej na wszystkie wpływy szkodliwości zewnętrznych jest bezpośrednio wystawioną. Tu wyjąwszy twardę do strawienia pokarmów natury, iako to: Wieprzowych mięs, wędlin solonych i t. p. nie używać, ale świeże białe mięsa wołowe i rosoly zabronionemi być nie mogą, a nawet i wino, porter, piwo angielskie, dubeltowe, owszem i po trochu arak, wódka francuzka i kraiowa, używane w pomiernęj ilości, nie tylko nie szkodzą, ostatnie leki służą, wzmacniając siły fizyczne i wszystkie odbyty aż do samych potów znacznie pomagających, przynależnie utrzymują takowe.

Do powyższych środków należy i następujący, równie iak i powyższe ważny, dzielnie do uleczenia pomagający.



cy, ten zawiera w sobie rozmaite ciała poruszenia, tak ogólne, iako też części boleściami temi zajętych. Co do ogólnych: chodzenie wolne ale nie anordniące, jeżdżenie w pojazdach, na koniu; osobliwie w czasach ciepłych, pogodnych, bynajmniej wietrznych, a tém inniej wilgotnych. Co do części bolesnych, te lubo początkowo nie ma-ło zrzędzią przykrości, wszelako w prawiania do lekkich prac, iako to: tarcia piłką, grania w bilard, w kręgle, noszenia pomiernej ciężkości rzeczy, wyprężenia stopniowe rąk, krzyża, unoszenia w górę rąk, gdy te części są bolesne, schylania się coraz niżej, są nader pomagającemi dla przyczyn, że takowe wstrzymane miejscowo parowania uwalniające, i te części bardziej wzmacniają. Gdzie sposobność pozwala, kąpiele z czystej wody, lub i parowe, niedość zalecam, zwłaszcza łącząc ostatnie z poruszeniami części od tych boleści zajętych.

Temi to środkami udawało mi się uwalniać od Chronicznych cierpień, i dla tego użycie ich mocno zalecam.

Byłoby u nas użyteczną rzeczą, aby się zajęto przynajmniej w miastach urzędzeniem pomienionych kąpieligdzieby się znajdować powinny rozmaite

do poruszeń ciała i jego części machiny, parowne te kąpiele mogą być rozmaicie czynione z ziół wonniejących i t. p. wszakże oprócz ulżenia boleści, a nawet i ich zupełnego pozbawienia, wieleby się oszczędziło wywozu pieniędzy z kraju za granicę do wód kruszcowych. Toż samo się ma rozumieć i o utworzeniu samych kąpeli które sztucznie naśladowane z dobrym takż skutkiem zastąpić mogą kąpiele naturalne. Gdzie zbywa na możności lub sposobności czynienia kąpeli, i parowni, obmywania ciała ciepłą wodą, w której sól rozpuszczona być powinna np. do garca wody kwaterkę soli, a w dalszym czasie podwoić ilość soli aż do pomiernego skóry zaczerwienienia, w miejscu soli na ten użytek zastąpić może z równym skutkiem popiół czysty z twardego drzewa w wodzie zimnej w przód rozpuszczony i do połowy wyparowany, ale tak po kąpielach samych, parownych, iako i obmywaniach ciała które, z cierpliwością aż do otrzymania ulgi nieprzerwanie czynić wypada, wystrzegać się wszelkiego zaziębnienia. A że noszenia odzieży broniącej nasze ciała wprawdzie od silniejszego wpływu odmian powietrza, wilgoci jego i zimna, iako też i



przyczynienia do mniey potrzebnego i nieraz szkodzącego zagrzanja ciała przez takowe, wskazać więc stosowne potrzeba. Wiek młody, ciało dobrze żywione, pełne soków, dostatecznym, iest naturalnem ciepłem opatrzone, mniey zatem pomnażających ciepło okryciów, noszenia takowey odzieży i wyboru materyów do nich, potrzebuie, przez któreby bardziéy organ skóry czulszym drzazliwszym i osłabieńszym stać się mógł, a przeto nie tylko przykładac się do zatrzymania téy ostrości Rheumatycznéy, ale nawet i usposobieńszym do łatwego zaziębienia; a zatem i do nabycia téy choroby. Noszenia więc odzieży z materyów odpowiadających porom Roku, odmianom powietrza, a nawet dni czasem, tak być powinny dogodne, żeby noszących ie czyli to w samych cierpieniach, iako i po nich dla ochronienia się od nowych napastowań, żeby ani zbyt ogrzewały, ani dopuszczały uczuwania, mianowiciey wiatrów chłodnych, a tém bardziéy zimnych, które swą przenikłością łatwo wciskają się w szpary ubiorów, przez co szkodzić mogą otwarciem. Do wsparcia skutków ochronienia się przez wybór ubiorów od nowych téy choroby napadów, lub i wczasie sa-

mych boleści, dalekobym skuteczniéy radził noszenie bielizny, iako bezpośrednio ciała dotykaiący, i z którą zostaię wnieustannem prawie tarcie, wczasach, i porach chłodnych podwójne płócienné koszule, lub kogo stać perkalowe, a ostatnie nawet do pościeli używać, lub flanelowe i kuczbałowe, ile na doświadczeniach licznych wsparty zapewnić mogę, że noszenia takowey bielizny z moiey porady zawsze się daleko ochronnieyszemi i obronnieyszemi być okazywały, niż noszenia podwójnych sukien, albolitéz i futer: a to dla przyczyn wyżey nadmienionych, na ten to zamiar noszenia flanelkowych koszulek na gołym cieie, lub pokrycia z niéy zrobione, dogodne częsciom od bólu napastowanym, gdy te nie raz miejscowo iakoby sobie obieirały mieszkanie, akto z nich dzielnieyszego skutku dla swego przekonania chce doznać, takowe koszule flanelowe, kaftaniki takież, lub do innych okryciów miejscowych służące przechowywać należy w szprętach do tego służących, a dobrze zamykanych, wktórychby się znaydować powinny woreczki płócienné napchane pokraianiem ziołami pachnącemi, iako to: macierzanką naywięcéy, lewandą kwiatow,



melissą, miętkwią, lebiodką pospolitą (*origanum Vulgare*) korzeniem łata-  
ku<sup>a</sup> (*calamus aromaticus*) równych  
części lub do upodobania i woli. Za-  
pas tych ziół na ten zamiar radzę mieć,  
aby na nich nie zbywało, i po wypra-  
niu bielizny, znięty wywietrzana won-  
ność, 'nowe z nich robione woreczki  
ciągle utrzymywać, wonność tych ziół  
udzielona bieliznie nierównie więcej  
wczynności naczynia skórne przez u-  
miarkowane ich drażnienie utrzymuje,  
jak nerwy podskórne w związku z in-  
nemi będące wzmacnia.

Co się dotąd mówiło względem  
odzieży, pościeli, tak w samych cierpie-  
niach, iako i dla unikania tychże, dla  
przedłużenia i zwolnienia przy dyspo-  
zycjach szczególnych reumat: służy tyl-  
ko do stanu stenicznego czyli zamożnego  
wsily i dobre<sup>a</sup> żywionego ciała, wcale  
znowu inne zachowywanie się należy  
w temperamencie słabym, flegmatycz-  
nym, kachektycznym, wodnistym,  
Skrofulicznem dyspozycji, aktóre<sup>y</sup> się  
rys podał na początku części drugie<sup>y</sup>  
pisma tego w Rozdziałku pierwszym  
Częstce pierwszej iako i wieku szre-  
dniego, że w tych naprzeciwnych sta-  
nach są środki powierzchowne i ze-  
wnętrzne różne od powyższych, te

nam podać niżej wypada, ato, że iuż  
mięszanina cieków ludzkich mniej by-  
wa doskonałą istotę z powodu osła-  
bionych sprężności stałych ciała ludz-  
kiego części, zbywa więc z takowego  
ich działania i na doskonałę<sup>y</sup> strawno-  
ści, dobrem krwi przygotowaniu, iako  
też i wyprowadzeniu dostatecznej cie-  
płiki naturalnego ilości, i to nas prze-  
konać powinno, że takowych dyspo-  
zycyów Ludzie w wyższym nierównie  
stopniu chłodnego czują powietrza  
w. pływ, że nawet stan febryczny go-  
rączkowy nie dochodzi do tego natęże-  
nia, że napady febry, gorączki, a przy  
nich i stan niniejszych cierpień nie  
tak natarczywie, powolę<sup>y</sup>, dłużej u-  
parcię<sup>y</sup> trwać zwykły, iak przy powyż-  
szym mniej lub więcej zapalającem na-  
tury Reumatyzmie, w tym więc ga-  
tunku, iak nawet w samych cierpie-  
niach daleko żywniejsza służy dyetta,  
tu rosół tęższe wolowe, napoje rozgrze-  
wające winiery<sup>e</sup> ilości użyte, ciepły-  
sze daleko odzienia wielce dopomagają  
do skrócenia cierpień, iak ochronienia  
się od tychże, tu i kąpiele dobrze cie-  
płe lepiej służą, słowem to wszystko,  
co tylko trawność wzmacnia, co siły  
dźwiga i utrzymuje, co ogrzewa, należy  
do środków dzielnie pomagających.



Zwykła ta choroba i miejscowo się okazywać, iakoż zajmuje łopatki, krzyż, ręce, kolana, nogi stawy, a nawet i same palce nie bywają od niej wyłączonemi, zajmuje kark i głowę powierzchownie, miejsca takowe okładać materacykami z kwiatów bżowego i rumianku, lub z powyższych ziół robione, nacierania suche flanelą, lub w niemożności iey mienia czystą wełną, którą nawet i okładać można części od bólu zajęte, owies prażony octem skropiony: do picia ciepłych napoiów, iako to: herbaty bżowych ziół, octem winnym do miłej kwaskowatości, osłodzone cukrem służą, lecz zwykła znowu taż choroba zmieysc mnięj szlachetnych tu wymienionych przez zaziębienia, błędy w dyecie, wzruszenia gwałtowne, iako to: gniewy, przełknięcia i t. p, przechodzić do części szlachetniejszych takowonie bez niebezpieczeństwa mnięjszego, większego, napastować: iakoż przeniesiona do mózgu, zapalenia iego, głowy boleści: do płuc, kaszle, dychawice pleury: do żołądka i kiszek, oprócz zapaleń zastosowanych do powyższych stanów: to jest dobrze żywionego krwistego, wieku młodego, iako też do temperamentów i konstytucyi zwyz w spomnianych,

forsie, wymioty, biegunki, i dysenterye zrządza, a przy nich przyłącza się silna febra, gorączka, małaczenia, co się dziać zwykło przy dobrze żywionym, krwistym, używającym dyetly zbyt żyznęj, trunków rozgrzewających, iak pomnięjsze znamiona przy temperamencie słabym flegmatycznym wodnistym lub przy deppozycji skrofulicznej, wtakich zdarzeniach zanim niżej wskażemy środki do wewnętrznego użytku, co prędzęj przykładac na te lub owe miejsca, które są tknięte, i okazują swe znamiona nadmienione, synapizma które nawet i powtórzyć wypada, co prędzęj kąpiele ciepłe czynić raz lub dwa dniem, dawać napoje ciepłe, iako to: herbatę, kleie, bżowy kwiat, z dodatkiem małej ilości wina lub wódki, araku, aby co prędzęj przywrócić parowania skóry, równie i nacierania rąk, nóg, krzyżów, nie bez znacznego użytku czynionemi być powinny, a nawet i na nich naprzemian synapizma mocne z chrzanem przykładac.

Dotąd mówiło się o szrodkach powierzchniowych dyetetycznych, i ratunkowych, w przypadku przeyscia téj materyi z części mnięj szlachetnych do szlachetniejszych, podały się takowe wce-



lu zachowywania się przy samych cierpieniach, iako też ochronienia się od ich napadów, lub przynajmniej oddalenia, skrócenia, ułagodzenia, dodając i, tę przestrożę niemałej wagi, żeby nad potrzebę w mieszkaniach nie było gorąco, a nawet i nie zbliżać się z częściami dolegającemi do pieców, a tém mniej do kominków. Teraz podać musimy środki Lekarskie do wewnętrznego użycia służące.

#### *Leczenie.*

To dzielnie wspartem bywa przez ściśle dochowywania tego wszystkiego, co się powyżey podało, bez tego i najlepszego skutkowania leki nie wiele dopomagać są wstanie, na próżno więc chorzy dość często na usiłowania bezskuteczne lekarzów narzekają, kiedy się nie zachowują iak powinni.

#### *Co do stanu z pomnożoną siłą żywotną.*

Pokąd więc trwa silna febra, gorączka, obrzmienie części zajętych, dawać miksyrę Nr. 8vo. a gdyby ta mniej skutkować miała, lub laxowanie zrzadzać miała, N. guo. z tych dawać po-

dług informacyi tamże umieszczoney, i popić białym kwiatem. Po usmierzeniu febry i gorączki dawać na wzmocnienie pod N. 3 4. jeżeliby stolec był wstrzymanym, dawać enemę rozwalniającą, które się już w tylu miejscach podały, i te podług potrzeby co drugi dzień, aby tylko nie wczasie lekkich potów, dyetty wyżey podaną, okrycia, pościel kąpiele, mały być nieodstępnie dochowywane. Co się dotyczy krwi puszczania, to jest tu potrzebne zwielek względów, a mianowiciey na poskromienie febry i gorączki, lecz nieobficie czynić wypada, lepiej wezwać rady znawcy, aby ten ilość upuścić się mianey krwi wskazał.

#### *Co do stanu z pomniejszoną siłą żywotną.*

Tu ciepleysza odzież, pomieszkania, dyetty posilniejsze, mierne użycia trunków rozgrzewających nie mają być wzbronionemi, a co do leków Nr. 11. i 12. na oba testany branie, i odwaru z kory sliwy czeremchy zalecam.

Kto zatem już podlega tym cierpieniom, bądź to miejscowo lub całe ciało zajmującym, zachowywać się po-



winien w tych, które powyżey umieściłem, przepisach. Dość często zdarzać się zwykło, że to, co utrzymujemy za drobnostki np. lekkie ubiory lub zao-grzania głowy i ciała, przez sypiania około okien lub wilgotnéj sciance i. t. d. przyczynami stać się mogą tych cierpien, iakże nie mają tychże samych powiększyć i utrwalić.

### *Febra kataryczna łagodna.*

Pomierna opuszczająca febra, która się zwykła pod noc przez przechodzącą ciążę, dreszcz, przedstawiać, są iey znamionami nawet inne, iako to: zatkania wnosie, sapka, głowy ciężar, bóle iey, gardła, i piersi.

### *Charakter iey.*

Zięb upalcy, rąk i nóg, dreszcz przechodzący po krzyżu pacierzach, opuszcza w dzień a pod wieczór wzmagająca się febra, przytém sapka, wstrzymanie fleginy z nosa, albo gęstey odeyscie, lub zamiast téj płynienie z nosa, oczów, wodnistey ciektosci mocno zracęy nozdrze, głowy lub czoła ciężar, ból gardła lekki i piersi, pokaszliwania. To trwać zwykło dni kilka, a sa-

ma zaś febra i tu nadmienione znamiona przez krytyczne poty, odpływ uryny, dobrze gotowaney uryny mętney żółtawey z czerwonym piaskiem na dnie naczynia opadającym, łagodne flegmy z piersi wyrzucanie powolęj ustaje.

Rzadko wswęj pojedynczości i łagodności febra ta potrzebuie leków, ale zawsze wymaga utrzymania się w lekkiey dyecie i umiarkowaném ciążu, izby, ciepłe. Oprócz tego mieć wzgląd wypada na wszystkie ciała odbyty, aby te wstrzymanemi przy niey nie były, nadewszystko zaś na czynności skórne, przez które to organ usiłuje natura w téj tak lekkiey chorobie pozbyć się przez poty drażniących, chorobnych pierwiastków, dla wzniecenia miernych potów, lub przywrócenia wstrzymanych, służą nacierania suche nóg, ciała, nóg moczenie w letniey wodzie z dodatkiem soli, gorczycy całęy, picie bżowych kwiatów melissy, herbaty, a dla usmierzenia kaszlu, bólu gardła, kleie z kaszy ięczmienney. Wszelako ieszcze powtarzam, że szkodliwymi się stać mogą, zaciepłe izby, odzież, pościel, takoweż, przytém zapominać nie należy, aby i stolec nie był wstrzymanym, dla tego, służy mixtura z powideł



bzowych Nr. 8go. Nadto wystrzegać się trzeba tego wszystkiego, cokolwiek zrzadza rozwolnienie błony nosa i zawałków ust wydrążenia, że to wszystko zwykło przedłużać kataryczne symptomata, dla tego są szkodliwe nawet za ciepłe pokarmy i napoje, iakoż pierwsze być powinny tylko wolne, a drugie swój ziomb utracić tak dalece, że chociaż początkowe użycie zachłodnego napoju здаie się drzaźnić, wszelako w krótkim czasie dostrzegać się daie łatwiejsze polykanie, usmierzanie drzaźnień, iak wzmocnienie ślinnych wust wydrążeniach zawałków, Szkodzą więc użycia rozgrzewiający natury napoiów i takowych pokarmów, iakoto: wina, piwa mocnego i t. p. a z pokarmów bez wyjątku do trawienia trudne, tuż dodając, że częste chustek odmieniania są nader użyteczne. Na wstrzymanie zaś odpływów z nosa wodniistości ostrej nic pomocniejszego radzić nie mogą nad sarkanie wnoszącesto wody zimnej, i nią czoła obmycia, wreszcie kaszle tej febrzy znoszą kleie wyżej nadmienione. Jeżeliby się mocniejsza nieco gorączka przyłączyła, iak się nie raz zdarza, branie nakoniec może co parę godzin cremortartari w wodzie lub na mały koniec noża, a sale-

try czyszczonej do filiżanki wody cukrem osłodzonej, którą po trochu pić radzę, tu nawet służy sztuczne mleko z nasion bani, ogórkowego, migdałów, aby nie było gęsto robione. To, co się dotąd przeciw tej febrze i tej przypadłościom radziło, służy dla wieku młodego, dla krwistych, mocnych, tegich dobrze żywionych. Inaczej zaś postąpić wypada ze wszystkim przy słabych konstytucjach, przy flegmatycznych, tu już daleko cieplejsze ze wszystkim służy utrzymywanie się co do odzieży, pościeli, pończuszek, napoiów i pokarmów żywniejszych, mogą zatem być użytymi rosoly na wół z klejami oprócz mięs, picia ciepłych, kwiatu bzowego, melisy, herbaty, i daleko cieplejszych, samych lub z dodatkiem do filiżanki łyżeczkę wódki, czystej francuzkiej, araku, rumu. Aby tylko nie dla wieku zbyt młodego chorych, do wzniecenia zaś lekkich potów, gdyby picia nadmienione nie miały skutkować, radzę dawać proszku pod Nr. 10, osobliwie pod noc, przez dzień zaś miksaturę Nr. 9. lub 11. w końcu napastować zwykłą osoby drzażliwe, czułe, delikatne, do spazmodycznych cierpień skłonne, iakoż się przytrafi nieraz, że utychsze osób kaszle



towarzyszą suche, sciskania piersi, tu służą często picia kwiatu rumiankowego (na wpół z bżowym mieszane, z dodatkiem kawałka cynamonu lub skórki pomarańczowey, które w nich moczone) mi być małą, wniedostatku tego użycie tychże samych ziółek z dodatkiem do filiżanki łyżeczkę od kawy wódki czystey, araku, rómu, wódki francuzkię, aby tylko nie dla wieku młodego chorych, dla wzniecenia lekkich potów służą nadmienione napoje, a te gdyby nie skutkowały, dawać proszek pod noc z Nr. 10. przez dzień zaś moczzenie z Nr. 11.

*Febra kataryczna gorączkowey  
czyli zapalnéy natury.*

Różni się od powyższey przez silniejsze daleko charakteryczne znamiona, iakoż gorączka, rozpalenie skóry, ięy suchość, głowy i gardła bóle, kaszel, wszystkie te bywają daleko silniejsze, tem bardzięy w młodym wieku, u krwistego, wsiły zamożnego, dobrze żywionego, a że się już na swoim miejscu potrzebna dała przestroga iak niegdy, lekce ważyć katarycznych cierpień nie wypada, dla przyczyn, że te są zawsze zmniejszem lub większem  
zapa.

zapaleniem błony nosowey, wydrążenia ust, gruczołków w nich znajdujących się, gardła, płuc połączone, tem są silniejsze otwarsze przy zapalnéy katarycznéy febrze, towarzyszą więc ięy puls prętki, twardy, uryna bywa daleko Czerwieńszą, mętnieyszą, noc niespokoyne, maiačenja lękie, ięzyk suchy, pragnienie mocne. Jest przy téy febrze, nie maie niebezpieczeństwo iem bardzięy przez zaniedbanie początkowe lub przeciwnie zachowywanie się w odzieży, pościeli, pomieszkaniu, łatwo przez te przyczyny, miejscowe płuc zapalenie lub innych części szlachetnych powiększyć ię może, a nawet i w suchotną febrę. Pokąd tylko stan ten zapalny trwa, wszystkie rozgrzewające rzeczy mogą bydź szkodliwemi, posiłki zatem mają bydź oprócz chłodności iak najmniej rozgrzewające, maślanka, smietana kwaśna, kleie, owoce, chłodno izby utrzymywanie, nader lekkie okrycie, napoje iakoż chłodne, odwar kwaśnicy, Serwatka, mleka sztuczne z dodatkiem saletry czyszczoney np. do kwarty jednéy łyżeczkę od kawy sporą, albo Cremortartari w wodzie moczonego lub znią gotowanego, woda z grzanką octem winnym do pomiernéy kwaskowatości zapra-



wna, miodem czystym lub cukrem o-  
słodzone służyć mają za napój ordyna-  
ryjny, obmywania ciała zbyt letnią  
wodą, na w pół z octem winnym  
po raz dwa na dzień czynione, okła-  
dania głowy zimną wodą, do której do-  
daje potrzeba soli i półowe octu winne-  
go, na łytkach przykładania synapiz-  
mów iak najlepiej służą, i grożące nie-  
bezpieczeństwo wyżey wspomniane zu-  
pełnie usuwają. — Bydź może równie  
i potrzebne krwi puszczenie, zwłaszcza  
przy płuc, kaszlu suchym, głowy mo-  
cnych boleściach, silnéj gorączce, ta-  
kowie zaraz na początku około dnia 3.  
czynieć wypada pomiernie, do czego ie-  
dnak znawcy rada jest potrzebną. —  
Po ustaniu przez te środki zapalnego  
stanu, zachować się należy we wszyst-  
kiem co do dyety i leków, iak się wy-  
żey przy febrze katarycznój łagodnéj  
podało, a to aż do zupełnego ustania  
znamion znię towarzyszących. — By-  
wać nawet zwykła taż febra stosownie  
do konstytucyów ciałnych jako i po-  
wietrza połączona z żółciową febrą: zna-  
miona téj, do wyższych przyłączać się  
zwykły, smak gorszy w ustach udzie-  
lający się w braniu napoiów i pokar-  
mów, język żółtawy, uryna iak szafran,  
nudności, cikliwości żółtość w białku

oka, a nieraz i całej skóry. — W téj  
znowu pomięszanój febrze służą też sa-  
me pokarmy: które się wyżey umieścily,  
nadewszystko dawać w pierwszych  
dniach proszek z ipekakuany z nieco  
cremortartari np. każdego po ziarek 15  
rano nadczo, zachowując się przy dy-  
ecie wyżey wskazanój, iednak i wtym  
wezwać rady znawcy.

Równie się dość często przedsta-  
wiają biegunki, dyssenterye mogące się  
katarycznymi febrami nazywać, iakoż  
też same przyczyny do pojedynczój  
lub zapalnéj natury przykładając się,  
zrządzaia i to. Tu więc należy co prę-  
dzey przywrócić wstrzymane poty przez  
picie ciepłych napoiów, kleiów z kasz  
okładania żywota materacykami mięt-  
kwi, przykładania synapizmów na łyt-  
kach, dawaniem enem z krochmalu po-  
dług potrzeby, pić miętkiew ogrodową,  
lub łączną, melissę, a wystrzegać się  
napoiów kwaskowój natury, i tych  
wszystkich pokarmów, które się przy  
zapalnej febrze katarycznój podały,  
aby nie spóźniać powrotu potów, któ-  
re zwykły zatamowania biegunki i dys-  
senteryi uskutecznić.



## O Febrze żołądkowey

(gastrica.)

Ta pochodzi albo zaraz po użytku lub nadużytku potraw niestrawnych, przeciwny sobie natury, lub też i napoiów mieszanych. Pochodzi także zwykła daleko powoli z zanieczyszczeń flegmistycznych, kleiowych, które się z masy soków ludzkich wyłącza i osiada w drogach pierwszych, iako to: żołądka i kiszki, a to tem więcej, im trawność bywa niedoskonała, tych zaś części osłabienie, które pochodzi od zwolnienia włókien mięsnych żołądka i całego kiszek kanału, a te mogą być przyrodzone lub też i częścią przyspobięte przez nadużycia ciepłych, rozgrzewających, korzennych potraw i napoiów, przez poprzednicze rozmai tych chorób napady, a mierz i przez szczególną aniedościgłą powietrza własność. Charakter tej febrzy jest następujący: Odćcia żywota po jedzeniu, burgotania, utracenie appetytu, niesmak w potrawach, tkliwość, wymioty, nieprzyjemna, z ust wonia, obłożenie języka mułaste i flegmiste, nieregularne febrzy, gorączki, paroxyzmy, głowy bole, uczucia ociężałości w żywo-

cie około samego żołądka do tego przyłącza się i wstrzymywania stolca.

## Leczenie.

Stosować się zwykło do przyczyn, które takową zrzuciły febrę, a że już to wyżej położyliśmy, wypada więc postąpić sobie następnie, jeżeli zaraz na początku, lub nieco później po użytku lub nadużytku potraw i trunków wspomnianych przystępuje, pospieszyć z uprzątnieniem z żołądka tego wszystkiego, co się stało szkodliwszem i dać przoszek na wymioty z ipekakuany a to stosownie do wieku, iak się to w wielu miejscach pisma tego podało, zapatrujemy się nie raz że ten środek aczkolwiek sztuczny zapobiega częste niebezpiecznym wypadkom, a natura sama go dość często urządza. Tu tylko dać przestrożę, że jeżeli przy wskazaniu na wymioty miał chory rupturę, takową pierwę należy opatrzyć wypadła, aby ta przy wzruszeniach tak silnych przez wystąpienie się nie pogorszyła. — Po ustaniu wymiotów, które ułatwić można pić ciepłą wodę lub herbaty z rumianku, za każdym nudności uczuciem, posilać się wypada rosołem, aby nietłustym i niekorzen-



nym, a że ten sam przez się dość często dnia tego od wielu chorych znoszonym nie bywa, iak nie raz do obrzydzenia i samych wymiotów się przyczynia, na takowy więc, przypadek dodać można do rosółu nieco soku cytrynowego, lub wniedostatku iego, burakowych zaczynionych barszczów przegotowanych, z dodatkiem lub i bez do półowy kleiów z kaszów kleiowych, albo też i polewki zwody, wina, piwa żółtkiem świeżem aby nie gęsto. Na takię to ściśle dyecie dnia tego poprzestać wypada, i tylko przy lekkich pokarmach, nader łatwych do strawienia pozostać należy, za napój zaś woda z grzanką, ięczmień w wodzie gotowany, do której dodać można trochę wina kwaskowatę natury, iako to: Francuzkie, reńskie a nawet i Austryackie, piwo wystale dobre dla niebędących w stanie win kupienia, w takowę też dyecie do zupełnego febrysty ustania zachować się należy, wszelako i późnię do twardszych coraz potraw użytku zwolna postępować stale pragnąc, aby tę febrę uniknął, lub po ię ustaniu, kaźden zachowywać powinien w używaniu wszelkich potraw pewną wstrzemięzliwość, i oprócz że niepolubnych iak z doswiadczenia szko,

dliwych, których się zupełnie wystrzegać ina, a innych tylko do nie zupełney sytości używać tak, iżby się nieco chęci do dalszego iedzenia zostało.

Zdarza się, że i stolca wstrzymanie przy tę febrze zwiększa gorączkę, głowy bole, odbijania, i na to mieć baczność wypada, a uwolnić odtegoż przez danie enem podług potrzeb wypada. Jeżeli ta febra raz, drugi, a naywięc i trzeci raz napada, przez dyetę wyżę podaną bez użytku leków ustać może, ztem wszystkiem częste ię powroty, iuż pomocy środków wymagają lecz te niewiele pomagać będą bez zachowania porządku w pokarmach i napoiach srodki te ponizę podano przy zanieczyszczeniach żołądka i kiszek.

#### *Leczenie febrysty żołądkowey, z zanieczyszczeń dróg pierwszych.*

W tym febrysty gatunku potrzebne są wprawdzie na ię uleczenie, dróg pierwszych, z tych to zanieczyszczeń uwolnienie i po zagranice ciała wypróbowanie, ale zanim się do tego przystąpi nadewszystko uważać potrzeba, czyli te zanieczyszczenia, są tak usposobione, to jest i poruszone i rozrzedzone, że ich wyprowadzenie służy na ulecze-



nie febry, nie zaś na pogorszenie, co łatwo nastąpić może, dając przed wczesnie leki wyprowadzające, przez które soki tylko pożywne odciągnięte ciału zostaną, zanieczyszczone daleko gęstsze zniemalą stratą dla całej ekonomii ciała, w tych częściach pozostaną, a po zadość uczynieniu temu wskazaniu też drogi umacniać, aby się nowe zanieczyszczenia niezgromadzały i niezamnażały. Do dopełnienia zatem tych dwóch głównych wskazań, czyli raczey do pierwszych, to jest poruszenia i rozrządzenia służą następujące środki Nr. 14. Jeżeli przystępują chcenia do oddawania stolca, przy ich użytku pozostać wypada, pokąd smak naturalny w pokarmach i napoiach, a apetyt i sen nie powrócą, a febra, gorączka chorego nie opuszczą, język zaś coraz z zamuleniem czyszciejszy się okazuje: gdyby jednak przy użyciu tego środka zamiast chcenia do pozbycia stolców, i wolnego ich po razy kilka dniem oddawania, przedstawiły się elkiwości, nudności, krztuszenia, wstrzymać się zdalszemu użyciem tego wypadu, adać na wymioty proszek Nr. 2do. skutki dwojakie tu nadmienionych środków okazują usiłowania natury, że jednych zanieczyszczeń pragnie pozbyć górą, a

drugich dołem, i na te wleczeniu domowem nader baczny bydz wypadu, aby się zamiarom natury nie sprzeciwieć, stanu chorego nie pogorszyć. Po uzupełnionych wymiotach, języka czystość, powrót smaku, apetytu, ustanie czulości ciężaru okolo żołądka, zmniejszenie febry gorączki, równie iako i dołem wyprowadzone zamulenia, zaflegmienie same lub z żółciowemy, wymagają wzmacniających środków użycia, ato końcem, aby się nowe z soków ludzkich tamże nie zgromadzały, iak trawność doskonałą zrządziły. — Na ten znowu zamiar służą leki Nr. 3. i 4. i przytych zostawać czas nieiaki potrzeba, zachowując wszelako wstrzeżliwość w pokarmach iak się wyżej nadmienilo, też i w napoiach.

Nie raz zwykła natura w biegu téy choroby robić przesilenia przez poty i obfitszy urzyny odpływ, aby się daleko subtelniejszych pierwiastków szkodliwych równie przyczyniających się do biegu i trwania téy pozbyć, przeszkodzić nie wypada takowym zatem natury usiłowaniom ale ile możliwości pomnażać i utrzymować. — Na ten znowu zamiar załączam picie ciepłych napoiów, iako to: kwiatu bżowego, melissy: miętkwi, użycia po łyżce Nr. 8.



lub rozpuszczenie kamienia winnego antymonii, czyli emetyku pod tym Nr. umieszczonego, lub proszków Nr. 10. i te służą do wzniecania potów. — Na odpływ znowu uryny krytyczny służą odwar korzeni szałwu, dziewanny kwiatu, octem winnym i miodem zaprawne, a przytym i dawanie 3. lub 4. razy dniem po małej łyżeczce od kawy cremortartari w wodzie, a te umieszczonemi odwarami popijać.

Nadmienić tu na samym końcu leczenia muszę co do czystości języka, że lubo jego czystość ma okazywać uprzątnienie zanieczyszczeń żołądka i kiszek, wszelako przy użyciu leków Nr. 14. nie można długo pozostać. Mulastość jego dość często jest skutkiem osłabień pozostałych żołądka, gdzie się nowe nieczystości zgromadzają, czystość jego trwała powracać będzie przy użyciu lekarstwa Nr. 3. 24, o tem się doswiadczaający lepięj przekona.

### *O febrze Żółciowéj.*

Poznać się z następującego charakteru, umiarkowane ustające febrzy napady, a przy niéj powszechnie wydzielająca żółć wątroba, w powiększoną czynność wprawioną zostaje, przez

co też i obfitość żółci przyplywa do pęcherza żółciowego, z niego do żołądka i kiszek a pierwiastki żółci składające do krwi i lipkich cieków bywają wysysanemi, że nieraz przy téjże febrze i żółtaczką się przymieszuya, powszechnie zaś towarzyszą cikliwości, nudności, krztuszenia, same nawet wymioty, biegunki żółciowe. Prócz gniewu, nędzy, żalu, smutku, nayeściej się do niéj przyczynia osobliwie i między ludem wiejskim, wystawionym na skwary słoneczne, po zagrzaniu się picie wody zimnéj, a nieraz zrządza też febrę powietrze wilgotne, dżdżyste, mgliste, tęgic mrozy, przez które to przyczyny powszechnie panuje nie raz i Epidemicznie.

### *Leczenie*

Wymaga użycia srodków, przez któreby i powiększona wątroby czynność zmniejszoną bytż mogła, i obfitość wydzielonéj żółci z ciała pozagranice jego wyprowadzoną a nadto i utłagodzoną już była. Na dopełnienie tych wskazań służy cremortartari i w proszku na wpół z cukrem starty lub sam po łyżce od kawy zwodą co 3. lub 4. godziny, może też być i z wodą go-



towany, wzięwszy pół łyżki zagotować razy kilka z kwartą wody, poczem dać się ustać i pić po pół filiżanki, wtymże samym co powyższy czasie. — To czyniąc dni kilka wziąć proszek Nr. 2do. Ale i tu przestrzegam, aby orupiturze ieżeli ta się u chorego znajduje, nie zapominać i takową pierwej opatrzyć. Wrócić się znowu do picia cremortartari lub też i innę kwaskowatę natury napoiów, iakiemi są: Lemoniady odwar kwaśnicy, sok ieży do wody, lub powidla zniey robione po łyżce od kawy często przez dzień zażywać, barszcz burakowy zaczyniany, woda z dodatkiem trzeciéy części octu winnego, serwatka ieżeli nie sprawia odęcia żywota, burgotań, laxowań, a ieżeliby jeszcze trwać miała febra, ieżyk był żółtawo farbowany, nie powracał czystéy wbraniu pokarmów, i tenże był gorszkawy smak, można po dni 6. powtórzyć użycie proszku na wymioty, i na tym poprzestać, aby przez drażnienie żołądka i iego wsteczny ruch przy wymiotach, zwyczajny, na nowo niesplywała żółć w nadpotrzebnę doniego ilości, a przezco by się upartość febry zrobiła, po ustaniu charakterystycznych téy febry znamion wyż umieszczonych, potrzeba wskazać użycia

gorszkich rzeczy, służy zatem Nr. 3. dodatkiem 3. lub 4. części Nr. 23. Dyetta zawierać powinna użycie potraw lekkich do strawienia, nie tłustych ani korzennych, mianowicie służyć kwaskowatey natury, iako to: rosół choćby z mięs wołowych, aby były sokiem cytrynowym lub barszczem domowym zaprawne, kleie do nich dodawane, kasze gotowane, owoce iedynie na pokarm przeznaczonemi być powinny, pokąd tylko stan febryczny trwa, po którego ustaniu nie zaraz do twardszych użytku przystąpić, i to powoli, wszelako wieprzowych mięs, słoniny czas nieiaki, po niey używać nie wypada.

### O febrze zgnitéy.

Wstęp do niey czynią poprzedniczo osłabiające przyczyny, w skutku czego przystępie znaczna słabość we wszystkich ciała działaniach, przebieg zaś téy febry, dla ieży ile być może doskonałego poznania, z powodu że się nader łatwo nią zarażić można, iest następujący, odurzenie, ból głowy tępy, bezsenność ociążałość całego ciała, utrata wesolości, apetytu, do tego bardzo wiele przylączają się znamiona zo-



ładkowéj febry, która się wyżéy opisała. — W dalszym iéy biegu przystępują i same zimnicy napady, i te albo są ciągle trwające, lub i na czas krótki opuszczające. Przytym puls bywa bardzo prędki, mały a w nader rzadkich przypadkach wcale naturalny, pomnażający się coraz siłą opad, tępe, wszelako dokuczające bóle piersi, a nieraz téy lub owéy strony żywota, przystępują albo maiaczenia ciche lub przy nich zrywania się, głuchota i skłonności do snu, smutne wéczerzenia, oczy nieczyste ciekłością zalane, smutna twarz, czarno brunatne wydrążenia nosa, także ięzyka warg, pragnienie mocne lub niechęć do napoiów, cuchnące odychanie, i więcéy iak zwykle cuchnące stolce, a nieraz i potów, nryna wnet bywa żółtą wnet i brunatną, wnet i czarniawą gęstą z brunatném na spodzie osądem, przystępuje suchość skóry, iéy uczuwać się dające natężone rozpalenie. — I przytym wysypować się zwykły plamy okrągłe, podługowate koloru brunatnego, czerwonego żółtawego i czarnego. Do tych jeszcze nieraz przyłączają się fryzle, grzybki, obrzmienia gruczołków, drżenia członków, drgania stawów, skubania po sobie pościeli, iakoby much łapania. Da-

léy mimowolne stolców, uryny, oddania, mocno cuchnące stolce, takowóz biegunki — znacznie chorego z siłą pozbawiające, krwi rozrzedzoney z nosa płynienia, iéy przez płuca wyrzut, a nieraz przez stolce i drogi urynowe, daley przystępują zimne lipkie ciekące poty i mocne żywota odęcia.

Te zwyż nadmienione znamiona w biegu téy choroby powiększać się zwykły, i istotne peryody iéy wskazują, iak rzetelne poznanie wyczerpującéy coraz bardziey siły życia tak w ciekach ludzkich iako i stałych częściach. Do téy choroby przyczynia się to wszystko, cokolwiek siłę żywotną, siłę życia napastuje, nadweręża, lub przez przyięcie do ciała cuchnących zgnitych wyziewów. Do tego doliczyć można upały zbyteczne, szczególniéy zwilgotniami połączone, tęgie mrozy, natężenia wszelkie, osłabiające namięgłości, iako to: troski, żale, smutki, nędza, głód, niezdrowość pokarmów, wody cuchnące, brak świeżego powietrza, wsirzymanie szkodliwych ciału wypróżnień, iako to: potów, stolec uryny i t. p. Z osnowy téy choroby, z iéy znamion, zasadzać się powinno.



## Leczenie.

Na dwóch głównych wskazaniach, z tych jest:

*Pierwsze* ile możności starać się o utrzymanie siły żywotnćy, a to zaraz od samego tćy choroby początku, poznawszy ią z znamion, które podalem, spóźnienie tego wskazania lub osłabiające tćż siłę srodki, iako to: leki laxniące, często powtarzane zbytćzne drażniące, a nayszkodliwićy krwi upuszczania, czynić zwykły całć ratowania nadaremniemi, iak chorego na otwartć życia utratę wystawiaią.

*Drugie wskazanie* zawiera w sobie pospieszne uśmierzenie przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych, które nie tylko tćż chorobę zrządziły, ale ią przedłużać i upartszą wleczeniu, a do tego i niebezpieczną poczynić mogą:

*Dopełnienie tych wskazań przez srodki następujące.*

Wdniach pierwszych choroby dać proszek Nr. 2do, oprócz wymiotów przez tenżć zrządzaných, wzruszenia całćgo ciała przy nich towarzyszące do-  
wzbudzenia potów, tak wchorobie tćy użytecznych, i również uwolnienie stol-

ca

ca przystćpnie, ićżeliby pć nich nieczystość ićczyka miała pozostać a stan sił dostateczny dozwalał można użycie tego proszku co dni 3. lub 4. powtćrzyć: dodać ićszćce i tć nader potrzebną uwagę: że na przypadek spćźnionego wtćy chorobie ratunku, gdzie iak powszechnie bywa znaczne sił osłabienie, aby tego wskazania zupełnie zaniechać, i zaraz do drugiego niżćy polożonego przystać. Nieraz zwykćo być przytem stolca wstrzymanie. Jeżeli to dni kilka trwa, enemami z 3. czćści wody a 4. czćści octu winnego lub piwnego rhocnego uwolnienie ićgo zrządzić, a wmiarć potrzeby powtćrzyć enemę, gdyby pierwsza dostatecznie skutkować nie miała: enem y te iako i poniżćy umieszczone niemaią być dawane, kiedy się chorzy pocą, a do rumiankowćy enem y np. półkwatćrki, dodać pół łyżki od ićdzenia kwasu siarczanego rozcićczzonego, równię zwićlkin skutkiem wtćy chorobie służyć takowćż enem y z drożdży. Na ten zamiar wziąćć drożdży od piwa iakich dostać można np. kwartć, dodać do nich łyżek dwie sćladu mielnego przesianego, zmićszać i na ciepćm mieyscu postawić, aby za-



burzały, i z tego na każdą eneimę pół kwarty lub jeszcze mniej przeznaczyć.

Stosownie do wzmagania się téj choroby; którą powiększenie znamion, a ubytek z sił poznawać daie, nie dość zalecić mogę całego ciała dwa lub trzy razy dziem czynić obmywania, zmniejszawszy połowę wody zwolnionej z połową octu iaki się pod ręką znajduje, okładania takież ciągle czynić na żywot i nogi, dobrze chusty w tem zmniejszaniu obmaczawszy i wyzionawszy, lecz przestrzegam, aby często powtarzać, niedopuszczając, aby na tych częściach przyłożone nie zastygały, można takż z nierównie większym skutkiem na tenże sam użytek, to jest: obmywań lub okładań, wziąć tęgiego odwaru'rumianku kwiatu, ozanki czosnku (*eucium scordium*) korzenia dzięgla np. po garści do półtora garca wody, aby się garniec zostało, precedziwszy i ostudziwszy dolać wódki kamforowey kwaterkę lub i saméy okowity: zwykły także przyłączać się maczenia, bole głowy, okładania iey chustami w zimney wodzie maczanemi, bez uprzykrzenia czynić należy, albolitez gąbkę wniey umaczaną i wyzioniętą na tenże sam zamiar przykładać, sy-

napizma na karku a na przemian i łydkach: dawać często pić kwaskowey natury napoie, iako to: limonad., wodę z octem, lub miasto aurowy odwar ieczmienny, niekiedy po łyżce wina kwaskowatéy natury a z leków Nr. 9. 11. Naywiększą przytem czystość okolo chorego, izby iego zachować, skrapiać podłogę, pościel, octem kamforowym, za pokarm zaś nie służyć rosół same tylko na wpół z klejami z kaszów do tego barszczami domowemi, sokiem kwaśnicy, lub cytrynowym zaprawne, owoce gotowane są dostatecznemi iak odpowiadającemi naturze téj choroby zasilkami: przy zachowaniu tych przepisów, użyciu leków, zachowaniu diety wskazanéy, nieraz polepsza stan chorobliwego życia tak dalece, że w tymperyodzie choroby pomiędzy 8. aż do 14. dni przystępnie przesilenie przez poty i urynę, a przytém i sama choroba zupełnie lub po większey części tak daleko pokonaną zostanie, że pozostałe osłabienia za pomocą posilniejszey natury pokarmów, iako to: rosółów tęższych aby nietłustych, galaret zwierzęcych nawpół z roślinami np. z nówek ciętych, wisniowey, berberowey, i winrobioney dla możniejszych, gdy dla uboższey klasy można nóżki cięte go-



tować w wodzie iak rosół, dodawszy kwasnicy soku do miłey kwaskowatości i osłodziwszy cukrem wygotować do półowy, i ztego dawać często po łyżek parę, równie i wpomoc przybrać należy wzmacniające leki, ale się przy wyższym stopniu tēy choroby podadzą.

Obok tych wszystkich starań i zapobiegów zwykła ta nie małego niebezpieczeństwa choroba do wysokiego stopnia dochodzić, iakoż dać się tenże dość widocznie poznawać przez opad sił, mocniēsze a do tego ciągle, ciche, spokojne małaczenia, noży bez-enne, ięczyka, ust, wargów czarność, ich suchość aż do popadania, toż suchość skóry prawie rozpalnēy przy pulsie zaledwie pod palcami uczuwać się dającym, powstaia na skórze petocie czarnego koloru; nieraz uryńa z rozrzedzoną krwią odpływa, i ta mocno cuchnie, przystępią drgania stawów, czkawka, odętość żywota, słowem są to znaki największego życia niebezpieczeństwa, które nas niepowinny bynajmniēy od ratunku odstręczać, i owszem do niego przez wszystkie usiłowania zachęcać. Na ten zatem najwyższy tēy choroby periód podają się następujące srodki.

Aże już w tēy choroby zakresie wszystkie prawie chwile niepewnego życia ratunku są nader ważnemi, żadnēy więc opuścić nie można. — Ku temu służą obok leków kąpiele dwa razy dniem powtarzane, ieżeli ieszezo siły dozwolą, w przeciwnym razie obmywania ciała zwyż umieszczone, lub i samą wódką; a ieszcze lepiēy kamforową, iak nayoczęściēy czynić wypada; dawania wina słodkiey natury, a ubogim nawet po łyżek dwie co godzina okowitki nieco wodą rozcieńczonēy; zleków dla możniēszych odwary z chury Nr. 9. 11. dla uboższych odwar melu dachowego, którego przygotowanie pomiędzy przepisami położyłem i ztego co pół-godziny po parę łyżek na przemian z proszkiem kamforowym Nr. 10. z tą tylko odmianą, że do każdego proszku kamforę co do lat aż do 6. ziarek powiększyć należy; przykładac synapizma na rękach i karku. Na przypadek uryny że krwią rozrzedzonēy odpływn, tchnienia przytem cuchnącego; zalecam lekarstwa Nr. 9. na przemian z powyższemi lekarstwami, które pod liczbami 10. 15. i 24. umieściłem: przy użyciu tych środków do zwolnienia stanu niebezpieczeństwa i jego znaków wyżey podanych pozostać wypada, wien-



często dopiero z ich tak częstem braniem opóźniać się coraż należy, za napoie służą wszystkie kleiowe, do których i gotowany ryż w wodzie, słazu korzenie, kwasami roślinnymi wyżey nadmienionemi lub i kruszczowemi, iako to: siarczannym solnym do kwasowości zaprawnemi, wszelako służą ostatnich dodatek, gdzie czerwoność twarzy, mocne mialczenia, zrywania, puls zbyt prędki, są przytomnemi, ale nigdy nie mają być branemi przy znacznym sil opadzie, przyspokojnie leżącym, ani też używać przy cichych mialczeniach, przy deganiu stawów, gdzie roślinne tylko służą, które nietak silę nerwową osłabiają, nadto i potów nie wstrzymują, a co czynić zwykły kwasy kruszczowe wyżey nadmienione, których użytek dzielny się okazuje na wstrzymanie symptomatycznych, czyli wyniszczających potów lub krwiotoków, wtęy chorobie często przyłączających się, zwłaszcza gdzie się ieszcze siła żywotna dosć czynna przez zrywania się, przez czerwoność twarzy, przez puls prędki, okazuje; zwykli nadto chorzy odlegiwać się, to w każdej chorobie wiele cierpien dodaie chodzącym, a nieraz i małą febrę wznieca, zwłaszcza w czułych i drażliwych. Wtęy zaś

chorobie może nader łatwo miejsce odleżale przeysć w gangrenę. Dla uniknienia więc oprócz czystości, o której w każdej chorobie w żaden sposób zapomnieć nie można, tem bardzięy w niniejszey, na uniknienie zatem częste czynić odmiany z chorego położeniem, a nadto częste obmywania części odleżać się mogących, zmięszawszy wody kwartę z kwaterką okowitki tyleż octu naytęższego, a do czego dodać radzę octu z ołowiu (*acetum plumbi*) iędnę kwaterkę. — Jeżeliby przez zaniedbaną czystość już odleżale miejsce miało przeysć w gangrenę, rady znawcy wezwać potrzeba, gdy tem czasem odwar mchu samego np. łótów 2, 3. z kwartą wody gotować, do zostania się trzech kwaterek, wódki kamforowey dodać łyżek trzy, i wtem maczać chusty, wyżawszy dobrze, często na wierzech zagangrenowanego miejsca przykładac, lecz radzę, aby odmiemiane płatki zawsze w wodzie wypiókać i przesuszać, i jeżeli zawsze świeżych niedostaie, na same zaś miejsce fleytuszeki maścią gojącą a naymnięy drażniącą nasmarowane przykładac, maść ta nayduie się pod Nr. 19. i tę podług potrzeby raz lub dwa dniem opatrywać. bywa nadto ciężkie iak bolesne uryny,



oddawanie, na ulżenie tych cierpień, służy wzwyż nadmieniony odwar słażu korzenia, częste okładania około pęcherza z lnianego nasienia w mleku gotowanego, a nawet i picia wspomnianych tyle razy mleczyw sztucznych nasion bani i t. p, około zaś końca téj choroby przywężnią się niektóre symptomy, równie iak i przy innych chorobach, przy téj zaś szczególnie głuchota. — Do symptomów należą obrzmienia nóg, oczów czerwoność i zawroty głowy, osobliwie kiedy się chorzy do zdrowia przychodzący podnoszą, i pragną siedzieć, jeżeli zatem ta głuchota, która przy téj chorobie nie bywa zupełnie złym znakiem, iak nieraz należy do dobrych, bywa upartą, przyłożenie wizykatoryów za uszami przy utrzymywaniu ropienia przez dni kilka. Zapomocą pod Nr. 25. i zagaiać toż miéysce maścią Nr. 19. a na przypadek płynienia zuszów materyi czynić sprycowania, ciepłym mlekiem kilka razy na dzień w uszy, obrzmiewania zaś nóg rozcierać chustkami suchymi, lub takowe w przód kamforą natarłszy, lecz to czynić nie potrzeba z przyciskiem, i owszem iak najpowszeńsz. lub 3. razy na dzień, nieraz po chorobie robią się z chorobliwéj materyi osady

po za uszami, pod pachami, w pachwinach małe stwardnienia i obrzmienia, które nigdy rozpędzać nie radzę, i owszem do ropienia doprowadzać przez przykładania kataplasimów z lnianego nasienia w mleku gęsto gotowanego, a doprowadziwszy do ropienia nie czekając otworzyć wypada, aby płynienie ropy co prędzej ułatwić.

Przestrzegam, aby się nie dać namówić na rozpędzenie tych wrzodeczków, uczą liczne doswiadczenia, że takowe zrzędzają suchoty, dychawice i paraliże.

Po przestaniu téj choroby, w której biegu wskazałem dyettę, przychodzącym do zdrowia zwykły przystępować niedosytny apetyt: nader ostrożnie zbraniem przyzwoitych potraw do strawienia łatwych, postępować należy nawet i do ilości ich. — Jeżeli po każdym chorobie przetrwaniu, wstrzemięzliwość w ich używaniu nader jest potrzebą, — w téj zaś pierwsze prawie zająmie miejsce, łatwa bowiem nie strawność oduwolnionego przez czas choroby od zwykłych pokarmów żołądka, powiększyć może jego drażnienie, i zdziałać powrót choroby nierównie od pierwszej niebezpieczniejszój z powodu osłabionéj siły żywotnéj, którą



z wielką trudnością lub i niepodobieństwem powtórnie przez najsilniejsze środki wznieść można, dla uniknięcia więc zapewnienie życia utraty, pokarmy zwyż umieszczone służyć mogą, dodadwszy do nich tęższych rosółów użycie, a w postępie sił i mięs bardziey pieczonych niż gotowanych. Zawsze jednak z roślin dodatkiem, iako to: owoców, ryżu, perłowey kaszy, i to na obiad. a na wieczorne pokarmy mięsa wszelkiego gatunku nie używać, i przy lekkich pokarmach aż do zupełnego ozdrowienia pozostać.

#### *O febrze nerwowęy.*

Ta i powyższa w następstwie wojny Roku 1813. wielką równając się powietrznęy febrze, rodzajowi ludzkiemu zadały klęskę, poznaie się nade wszystko z sprzeczności wszystkich prawie znamion czyli symptomów iako pomiędzy niemi zachodzi, powszechnie zaś z następującemi przedstawieniami się rozpoczyna, początkowo ograszka wolna wcale nieulepszająca stanu choroby, poty, puls mały, słaby, nieco twardawy, wnet prędszy powolniejszy przytem ociężałość członków, smętność, ponurość, posępność, bóle po stawach,

w okolicach żołądka, bicie wskroniach, toż około pępka, głos wnet czysty głosny, wnet chrapliwy słaby, bez podpadający pod zmysły przyczyny, ięzyk biały, suchy, chrapowaty, drżący na pokazanie, często pienistey sliny wypłucia, ekliwości, a nawet i same wymioty zielone, uryna bywa cienka, czysta lub gęsta, a do tego suchnąca, oczy czerwone bystre, lub zanieczyszczone i powiekami przywarte, dzwięk w uszach, słuch tępy lub nie zwyczajnie mocny, trzęsienie członków i skłonności do omglen przy małych nawet ciała poruszeniach, stolec wnet bywa w trzymanym, wnet rozwolnionym, różnego koloru, już zboleściami żywota iuz bez żadnych przykrości. — Wszystkie tu nadmienione oznaki w postępie choroby, nie tylko co do ich liczby, ale nawet i szczególności zwiększają się, iakoż puls wnet bywa pełny, równy, wnet mały i nieregularny. Powstają wyrzuty rozmaite, iako to: potocie, fryzle, bombony, niebezpieczne krwiotoki, wyniszczające wypróżnienia, szybkie bładowe zapalenia, w kilka godzin wzmianę przechodzące gangrenę, pomiędzy zaś dniami 4. 7. postępuje do najwyższego stopnia siły żywotnięy wyczerpanie, a przy tęschnościach, omglen czę-



stych napadach, konwulsjach, niespodziewana śmierć zakończy całą tę chorobę scenę. Ztém wszystkiem jeżeli szczęśliwy następuje ięs period ozdrowienia, ten nader powoli przystępuje, zostawiwszy po sobie na czas niezakreślony ślady osłabień, przyczyny do tej choroby być mogą rozmaite, iako to nadewszystko co układ nerwów osłabia, i tenże czulszyin robi, tu więc należy wrodzona skłonność, mocne wypróżnienia, nad wszelkie zaś inne, natury, wszystkie osłabiające namiętności, iako to: nędza, troski, ubóstwo, poprzednicze choroby, natężenia umysłu, brak snu, zimne a do tego wilgotne powietrze, niezdrowe zepsute pokarmy żucanie się na układ nerwów chorobliwéj materyi, do tych przyczyn słusznie dodać można właściwą czyli gatunkową zarazę, bliższą zaś przyczyną spóczywa w niedość nassegnaczeniu zmian układu nerwów, przez co w swych dowolnych czynnościach, tenże przeszkody doznaje.

Do tego nader rzadko też febra przedstawia się, aby się zaraz lub w ięs dalszym przebiegu inne i wcale ważne nie miały dołączać symptomy, iako to: zapalenie nerwowe mózgu, wodowstręt dobrowolny, obfite poty i t. p.

Po opisaniu tej febrzy różniący się od poprzedniczej równie w r. 1813. razem panujących, wszelako z wielu stosunków ze zgniłą powinowactwo mających które lubo w napastowaniach epidemicznych na szczęście rodzaju ludzkiego, dać Boże bez powrotu, ustały, pochlębiać iednak nie można, aby obydwóch pojedyncze członki leczenia lub mniej nie miały być takż napastowanemi, ile zostawiwszy po sobie zarody a nawet i skłonności w naturze organicznej, aby tylko też przez wpływy przedrażniające, osłabiające pod rubryką przyczyn umieszczone napastowaną była. — Temi to uwagami powodowany poradnika wydawca, osmieszył się ważne choroby w swém dziełku umieścić, a na przypadek wszelki w względzie popularnym mieć do ięs leczenia dostateczne, ile być mogą udzielone zasady, wybór wskazanych środków, któremi by bezpieczniey bliżnich ratować można.

Główne zatém usiłowań naszych zasady wspierać się powinny na następujących lecz wielkiej uwagi wymagających postępowaniach, z tych iest.

*Pierwsze* żeby za śmiało nie czynić żadnych wypróżnień, iako to: laxowań, wymiotów, a nadewszystko



krwi upuszczania. — Przez te środki złe zastosowane przystępuje większe siły żywotniéj osłabienie, która i tak w swych czynnościach przez tę febrę szczególnie bywa napastowaną aż do wzruszeń widocznych, iako to: zrywania się chorych, maiaczeń głośnych drugi raz do zupełnéj niemocy.

Drugie zawiera wybór środków, a te zastosować wypada nie tylko do konstytucyów, których rys dla popularnego poznania na początku części drugiéj dziełka tego nie bez przyczyny umieściłem, ale nawet co do wieku, sposobu życia, przyzwyczajenia, płci różnicy i stanu w którym się znajduje np. paniński, zamężnym. wskazać co do biegu saméj choroby, i otych to przebiegach i znakach ich w przedmowie do części pierwszéj mówiłem z względu na powyższe zasady, w pierwszym i drugiem postępowaniu dworaki stan téj choroby mieć jeszcze na celu ratowania powinniśmy, a ten nam bliżéj poznać wypada, abyśmy wiedzieli iakich środków w tym lub owym stanie choroby i w których przebiegach w pomoc użyć należy.

Pierwszy stan ma podobieństwo przy zdrzaźnionéj nerwowéj słabości zapalnych gorączek. — Charakter iego

jest czerwoność twarzy, oczów bystrość, iako skutki zaiętego mózgu, krwi do niego napływu, maiačenja głośne, zrywania się, sny niespokojne lub zadne, rozpalenie skóry, iéy suchość, puls twardy i prędky, dość pełny, uryna czerwona, do tego przyłączać się zwykły bóle, kłócia, w tém lub owém boku, pokaszliwania suche mordniące z lżejszém lub cięższém flegmy wypłuciem, kłócia w prawéj żywota stronie, nieraz przyłącza się oczów i skóry żółtość, bóle żywota, odętość iego, za dotknięciem nieco znacznieszem dokucające.

Cierpienia te mieyscowe towarzyżące febrze nerwowéj okazują zaięcie mózgu, płuc, wątroby, kąduna, dość często przyłączać się zwykły w krwistych temperamentach, w wieku kwitnącym, a nawet i w tych, którzy używali trunków gorących, potraw żywniacych korzennych, a są skutkami zdrzaźnionego układu nerwów osłabienia, charakteryżują febrę nerwową. Pótąd jest opis stanu maiacego podobieństwo do zapalnych gorączek, teraz przystępujemy do leczenia iego.

W pierwszym téj febrzy zakresie na wyczyszczenie dróg pierwszych, zwłaszcza przy zanieczyszczonym i za-



mulonym języku, dać na wymioty proszek Nr. 2do. Srodek ten przy tych skutkach zrzadza i wolne poty wielce pomocne, o których mierném utrzymywanie starca się należy, do tego służą nam iako zmacniające lekarstwa Nr. 9. i 11. Napoie powinny być często a po trochu udzielane, służą też same które przy zgnięty febrze podałem, i te same pokarmy, obmywania ciała wodą z octem, kąpiele, nadewszystko wolne czyste powietrze, po łyżce wina kwasowatę natury, nieraz szczęśliwie dalszym biegiem tę choroby zapobiegają, co gdyby w opóźnieniu początkowego ratowania nastąpić nie mogło lub i przy niem wzmaganie się choroby przystępuje.

*Drugi zakres:* w nim okaznią się początki maiaczeń, czerwoność twarzy, oczów bystrość, przerywany sen, puls twardy, nieczekając przyłożyć za uszami kilka piławek, na łytkach synapizina, głowę zimną wodą iak nacyjęścię okładać, i kąpiele ciepłe po raz lub dwa dniem powtarzać, z leków powyższych tu umieszczone dalej zażywać, toż samo czynić z napoiami i posiłkami, które się podały przy pierwszym tę choroby zakresie.

W dalszym

W dalszych chorobach przedziałach wzmagania znamion dostrzegać się widocznie daią, powstają silniejsze maiażenia z pomnieyszoną siłą żywotną, tu można włosy ostrzyć, wodą zimną całą głowę często zlewać, przykładając plastry zmuch Hiszpańskich na rękach, nogach, dawać lekarstwa już wyżey zalecone, tych nieprzestawać, wyiąwszy gdyby potrzeba było, ilość brania podwoić, i dodać proszki kamforowe pod Nr. 10. pomiędzy gotowaniem, to jest raz ieden gotowania, drugi raz proszki. — Napoie, pokarmy też same. Dość często się zdarza, że bezsenne noc, głowy nieustające bóle, stawów drgania, silne serca bicie, zrywania się, chorego siły niszczą. W takim więc przypadku wystawić kamforowe proszki pod noc wraz z gotowaniem powyższem, a na ich miejsce wziąć makówek całych 6. te pogniótłszy nałać pół kwarty wody, i gotować do zostania się połowy, przecedzić, osłodzić i dodać likworu Anodyny kropel 40. zmieszać na dwie podzielić części, dać co godzina wypić iedną, osłodziwszy cukrem lub lukrecją. — Na tenże sam zamiar zrzadzenia snu wolnego i zaspokoienia wzruszonych przez osłabienie nerwów wraz z mózgiem, można wziąć macz-

*Część II.*

40



ku polnego kwiatu (*papaver erraticus*) lotów 3, 4. postąpić sobie z ich przyrządzeniem i dawaniem zupełnie jak z makówkami. Do tegoż samego zaspiania służy chmielem wypchana poduszka, którą choremu pod samą głowę podłożyć, jeżeliby ta doza nie miała dostatecznie skutkować, powtórzyć to gotowanie w téjże ilości, i w tymże samym sposobie podzielone dawać, co można i następnego wieczora mieć przypodobione, aby na przypadek braku snu choremu dawać. — Zaledwieby wierzyć można, niedoswiadczaając iaki ma potężny wpływ sen na zaspokojenie a nawet przytłumienie mialaceń, zrywania się, bicia serca, które zwykły w téj febrze chorego nieraz napastować.

Zinnieyszenie tych wszystkich znamion, powolne w przebiegu febry podanych, powracająca spokoynosc umysłu, przytomność, są oznakami do zdrowia powrotu, przy zostającej słabości, na której zwolnienie służą leki przy drugim stanie téjże febry niżej podane, w tym więc ozdrowienia periodzie, pomierne wino użycie rosółów, i inne posiłki aby tylko ciężkie, siły osłabione dzielnie wspierają.

Drugi stan téjże febry okazuje się wprawdzie ztemiż samemi znamionami, które powyższemu towarzyszą, lecz wcale winnych przedstawieniach, iakiemisa, puls zbyt mały, zapadła i blada twarz, czułość otrętwiona, technienie słabe, smutne weyrzenie, zupełna na wszystko obojętność, spiączka, nieustanne prawie drzemania, słuch tępy, nader ciche i spokojne mialaczenia. — Stan zatem ten jest w swych znamionach zupełnie powyższemu naprzeciwny, okazuje widocznie większe daleko siły żywotniéj drażnionéj osłabienie, leczenie zatem i użycie ku temu środków, napoiów, nierównie silniejszój natury i bardziéj wzmaniającej siły żywotne, koniecznie wymagają.

Na ten więc zamiar możniejszym dawać po parę łyżek na raz wina słodkiego często przez dzień, dla uboższych po łyżce wódki, in służą rosoly tęższe, nawet zwolowego mięsa, kleie z kaszów tenże wydających, do których dodawać można czwartą część wina francuzkiego, reńskiego dla możnych, wszystkie napoje, pokarmy kwaskowe zaprawne, które się przy pierwszym téj choroby stanie zalecały mogą być wprawdzie i tu użyte, prze-



cie daleko oszczędnięć, kiedy kwasy kruszcowe, iako to: saletrhany i siarczany wcale nie służą, równie obmywania ciała wódką, arakiem, winem; często przez dzień czynić należy, ziółków zaś podać nalanie Nr: gno. 11 pomiędzy nim dawać proszki kamforowe Nr: 10. z dodatkiem węglanu amonij zoleiem przepalonym (*amonium carbonicum pyrrro oleosum*) poziarek 2. 3. do iednego proszku, na przemian to jest raz proszek drugi raz nalania, a stosownie do zwiększonego siły żywotnięć osłabienia, mając wzgląd na wiek powiększać wypada, kamforę i węglanu amonij, do tego nalania dodać można z wielkim skutkiem kropli 40. do 50. mixtury oléyno balsamicznę lub gdyby ięć nie było, parę łyżek od iędzenia wódki kolońskiej, bez której wdomu nieradziłbym zostawać, przykładać plaster z mouch hiszpańskich na karku, rękach, tyłkach poiedynczo lub na obojgu razem, stosownie do stanu siły żywotnięć opadu i wieku.

Przy użyciu tak częstém tych srodków pozostać wypada póty póki malaczenia nie zwolnieją, twarz weselsza nie tak zapadła, żywsze oczy, podwyższonego pulsu, ustąpienia obojętności, otretwiałości, słowem wszystkich zna-

ków wzmagaiący się coraz siły żywotnięć skutków niedostrzeżemy, poczem coraz branie tych leków spóźnić, a wkońcu i zupełnie poprzestać należy, pozostawszy przy pokrzepiających siły napoiach i pokarmach, które się w tym stanie choroby podały.

Równie i tu czystość około chorego, izby, pościeli, odświeżanie powietrza, iak obmywania całego ciała zwolnioną okowitą, wódką kolońską, winem, choć parę razy na dzień przypomnieć w żaden sposób nie wypada.

Po szczęśliwém obu tych stanów febry nerwowęj przestaniu, nie raz ozdrowienie nader powolnie zwykło powracać, co szczególnie bywa przy drugim, iak pośpieszniejsze przy pierwszym stanie téj choroby, i w tém ozdrowienia peryodzie wzmagaiące coraz siły żywotnięć działania, użycie leków wzmacniających, żołądek, i trawność doskonalszą przysposabiających jest potrzebne; na uskutecznienie tego służy N. 3. 4. 24. biorąc go po razy naymnięć dwa na dzień, to jest na godzin 2. przed obiadem a w 3, lub 4. po obiedzie woznaczonej przy przepisach leków ilości popiwszy winem nie-starem. Dość jest wino lekkie, którego i większy nieco ilości i częściej przez



dzień użyć można, niż starych: wtym to ozdrowienia peryodzie niedosytny zwykł bywać apetyt, lecz nie dość przestrzegam aby w strzeżliwości się utrzymywać, chcąc uniknąć choroby nierównie od pierwszy niebezpieczniejszego powrotu, tu na ranny posiłek polewki z piwa dubeltowego dla niebędących w stanie robienia ich z porteru, wina: czekolada, szodon, dziwnie służą, rosół, i twardszy natuty, wszelako do strawienia łatwe, iako to: muszczki cielęce, białych mięs drób, osobliwie pieczone i to na obiad, kiedy wieczorne pokarmy i wcześniej użyte bydz mają, iako to: rosół z kaszami same kasze owsiana ięczmienna, orkiszowa, ryż, iaja miętko gotowane a później pozwala się i twardszych używać potraw, zawsze iednak nie do sytości, aby przez ich trawienie żołądek wzmacniać się mógł, używanie świeżego powietrza, wczasach pogodnych poruszeń ciała umiarkowanych, powolnych, bardziey wzmacniających, zalecam, wystrzegać się chociaż powolnych a dalekich wczasach upałów, co wszystko osłabienia stan przedłuża, równie iędzenia w poiazdach, używania kąpieli ciepłych po parę razy w tygodniu niedość zalecać powinienem.

### O zapaleniach w ogólności.

Za nim przystąpimy do szczególnego lebrów zapalnych poznania z ich charakterów, i różnicy, poprzedzić postanowiłem daniem oznaków zapaleń w ogólności, a to dla unikania mniej potrzebnych powtarzań przy każdej febrze zapalnej, które się w szczególności, a dość często zdarzające się, poniżej umieszczą.

Zapaleniem powszechnie nazywać zwykliśmy, kiedy albo ogół całego ciała, lub iego wewnętrznych poiedynczych części, przez wpływy powszechne iako to: upały, zbytne, lub po nich szybko przystępujące zimno, słoty, deszcze, lub zewnętrzne iako to: nadużycia trunków gorących, potraw zbyt żyźniących, korzennych mnię strawnych, ilości ich przechodzących wtrawieniu moc żołądka, tak bywają przedrażnione, że powstaie albo powszechnie dotycząca się ogólnie całego ciała, silna febra, szybko napastująca, przynię, od tychże samych, pośrednio lub bezpośrednio przyczyn, części uszkodzenie w ich czynności następują, ztąd różnice i nazwiska, zapalonych febrów.



*Charakter ogólny zapalny febrzy.*

Człowiek nagle od silnej febrzy napastowanym bywa, po paroxyzmie równie silna przystępuje gorączka, przystem przylączy się mocny ból głowy, szum, pisk w uszach, ból w pojedynczych częściach, jeżeli są te powierzchownie zajęte, dostrzegać się daie czerwoność, gorącość obrzmienie ię, które lubo w częściach wewnętrznych, iako charakterystyczne znamiona, są przytomnemi, ale przy tych nie odstępnie ból, iako trzecie znamie towarzyszy, ten może być ostrzejszy, tępszy, znosniejszy, lub w nader przykrym stopniu dokuczającym, a tem bardziej, im która z części szlachetniejszych od niego napastowana bywa. Po odbytych zapalnych febrach przebiegu powszechne jest następstwo ich, albo się rozęść, albo miejsce zapalone przechodzi w ropienie, lub twardnienie, a w końcu zmienia się w gangrenę.

Rozęście się najpowszechniej bywa febrach zapalnych wypadkiem iak być powinno, najpożądanym.

Ropienie zaś przy powierzchownych częściach ciała ludzkiego zapaleniach zwłaszcza nieznaczne, nie ma żadnej prawie obawy, przeciwnie zaś wewnę-

trznich części tem większe przylączy się niebezpieczeństwo, im jest znaczniejsze, a tem niebezpieczniejsze im nie odbicie do życia potrzebne organa zajmuie, zwłaszcza przy złym sokow zmięszaniu, dość często iedna śmierć takowe ukończa. — Pozostałe zaś stwardnienia w mnięj ważnych częściach, szczególnie w gruczołkach, może bez znacznego na zdrowiu uszczerbku pozostać przez całe życie, jeżeli zaś w szlachetnych, iako to: płucach, wątrobie lub i innych organach, staie się źródło do wielu chorób, które się znawcy do leczenia zostawiają, gangrena zaś lubo jest nayniebezpieczniejszym febrów zapalnych wychodem, jeżeli ta zajmuie części powierzchowne, które odjętemi bydz mogą, życie, przez ię od reszty ciała oddzielenie ocalić może takowe, wewnętrzną zaś śmierć tylko zakończy.

Przy zapaleniach mnięj się co do rzeczy zważa, czyli towarzysząca im febra jest następstwem zapaleń, lub zapalenia następstwem febrzy, nadewszystko zaś uważać należy na wiek, temperament, prowadzenie życia, czyli było rozwiązłe, trunków nadużyciu uległe, stan, w którym się znajduje płuć, konstytucya, powietrze, na bodziec i iego



różnicę, czyli ten był przedrażniający, lub mniej natury, np. upały, mrozy tęgie, nadużycie trunków rozgrzewających w czasie upału, lub po mocnem ciału zagrzaniu, zaziębieniu, stan ciała pod literami a.) b.) na wstępie téj części tym końcem umieszczone.

*Leczenia stanu pierwszego pod literą a.)*

Im tęższa jest febra, a po niéy i gorączka, w wieku zwłaszcza młodym, temperamencie krwistym, w konstytucyi mocnéy, przy symptomach mocno dokuczających, nieodbite jest krwi puszczenie, a to im prędzéy tém lepiej: ilość upuszczonéy krwi i iéy powtórzenie zależy wprawdzie od zdania znawcy, i tegobym wezwać radził, ale to prędko, aby spóźnienie nie przyprowadziło chorego o utratę życia, a przynajmniej o przejšcie zapalonéy części w ropienie i długą, nayczęściéy nieuleczoną chorobę, w którą przechodzi, tego mamy liczne przykłady w zapaleniach płuc. — Ztém wszystkiém i ilość upuszczonéy krwi, iéy powtórzenie zażyteczne, zrządziwszy mocne osłabienie powszechne, że iak organutego lub owego zapalenie rozeyść się nie może,

także o niebezpieczeństwo znaczne, a nawet i o utratę życia przyprowadzić może, i to bez najmniejszego powątpiewania, a czego także liczne zdarzają się przykłady. — Żeby więc uniknąć tak nieszczęśliwych przypadków, krwi upuszczenie nie powinno się stosować do z niesienia naglących symptomów, np. przy zapaleniu płuc, kółek, kluciów w boku tym lub owym, aby wolne tchnienie i odetchnienie choć w znaczney części powróciło a resztę i naturze i pomagającym środkom zostawić należy. — W pomniejszych zapaleniach można się bez krwi upuszczenia obeysć, przystawiania piławek, baniek stawianie tu i owdzie, po ciele lub na miejscach dokuczających, powtarzanie nawet, dość często przy użyciu leków, i dyetty, co do tego stanu naley piéy służących a tu poniżéy umieszczonych, ten więc jest pierwszy ratowania srodek.

Drugi srodek jest urządzenie nader ściśléy dyetty, przy którém chory pozostać iest winien aż do zupełnego ozdrowienia. — Tu niedość zalecić mogą za posiłek kleie z kaszów, iuż tyle razy powtarzanych aby nie gorących, tylko chłodnych, bez przymieszywania rosółu, albo przynajmniej w nader



małej ilości np- do trzech części kleju czwartą rosolu, i te nie powinny być wcale tłuste, a nader szkodliwie ko-rzenne: owoce gotowane, iako to: śli-wki, gruszki, jabłka, a z ostatnich i dzi-kie wniedostatku ogrodowych, z dobrym skutkiem na posilek mogą być uży-temi.

Posilki tu wskazane są dostatecz-nemi do utrzymania chorego przy si-łach takich, że zapalenia rozeyscie i iego zupełne usmierzenie, za wpływem tychże sił nastąpić powinno.

Trzeci srodek są napoje chłodzą-céy natury, tu służą serwatki lub mle-ko na wpół zgotowanym w wodzie ię-czmieniem, mleka sztuczne zbań, ko-nopnego, ogórkowych nasien, lub zmig-dalów słodkich, i maku, odwar kwa-snicy, woda czysta, octem do miłej kwaskowatości zaprawna, dla możnię-szych zaś syropy, z kwasnicy, wisnio-we, poziomkowe, galarety tychże, w wodzie rozpuszczone, lecz ostrzegam, aby nie iednego dnia pić, a przynaj-mnié w godzin dwie po picciu wody zięczmieniem w wodzie gotowanym i mlekiem, lub też i sztucznych mlek dawać do picia, kwaskowatéy natury napoje, a to dla uniknienia torsyi bole-ści, wiatrów, przez coby się stan fe-

bryczny mógł pogorszyć. — Naylepiéy się zatem uczyni, kiedy się tu wskaza-ne napoje daia choremu dzień przez dzień do picia.

Czwarty srodek: na miejsce doku-czające, iako prędczy skutkuiące niż plastry z much hiszpańskich, przykła-dania synapizmów, które nawet w po-trzebie powtórzyć można, przykłada-iać takowe oprócz miejsc dokuczających na łytkach, rękach, nie razem, lecz od-mieniaiać i też miejsca co drugi dzień, lub iak wymaga upartość choroby.

Piąty srodek użycie wolnych ką-pieli gdzie te być mogą bez trudności, czynione, nawet i po dwa razy na dzień, gdzieby niebyło sposobności nóg moczenie, obmywania ciała wodą letnią, samą lub na w pół z octami, iakie się pod ręką znajduia, a oprócz przy-kładań synapizmów na miejsca dolega-iać, przed ich użyciem z niemałym sku-tkiem czynić okładania umaczawszy w odwarze rumianku kwiātu, lub lnia-nego nasienia, do tego lub owego od-waru dodawszy połowę mleka, chusty we 4. złożone dobrze wyzionięte, i te często przykładać aby nie za gorąco, radzę. — Zrównymże skutkiem służą ciepłe mleka, lub i też same odwary, nalawszy je w pęcherz wołowy do pół-



łowy większy, mocno obwiązany na miejsca dolegające przykładac, nie tak one zwykły prędko stygnąć, iak powyższe okładania. Można takżo miejsca dolegające przed synapizmów przykładaniem smarować maścią co 3. godziny pod Nr. 21. a po smarowaniu albo okładania, lub i pęcherz nalany przykładac na nie, i oczekiwać iaki po nich skutek nastąpi, a dopiero do synapizmów lub i samych wizykatoryów przystąpić. — Powszechną prawie być powinno w postępowaniu tu nadmienionych środków zasadą, rozpocząć od łagodniejszych środków użycia a w niedostateczności ich skutkowaniu przystąpić do mocniejszych.

Szósty środek zawiera wewnętrzne lekarstwa tu służące Nr. 3. i 27. Przy tych środkach nie należy bynajmniej zapominać o wstrzymanym stolcu, ułatwiać tenże enemami, jeżeli ta febra wupały napastuie, przysposobić chłodne miejsce w sposób, iaki się tylko da uczynić, nawet wzbronieści rozgrzewający. I gdyby znówu wczas zimowy chorego napadła, umiarkowane tylko ciepło w izbie utrzymywać należy, i to samo się ma o pościeli i odzieży rozumieć.

## Leczenie zapalnej febry.

*w stanie z pomniejszoną siłą żywotną liter b.)*

Podawszy już znamiona przy poznaniu tych dwóch stanów, pozostaie tylko wskazać srodek, i dyette do niego zastosować.

W pierwszym zakresie na usmierzanie febry, gorączki, nie tak już iak przy powyższym stanie natężonych, przykładac synapizma, wizykatorye, na tyłkach i karku, lub miejscach bólem zajętych, zwłaszcza poprzedziwszy piawków stawianie, gdzie się bóle uczuwać daia. — Dyetta tu wcale posilniejsza służy, iakoz rosoly aby nie były tłuste, a do tego przestudzone, same lub na wpół z kleiami, często przez dzień po filizance dawać, nie wzbrań się nawet iaj świeżych miętko gotowanych używać. — Równie i tu lubo nie konieczne, mogą być kąpiele daleko cieplejsze, lub ciała takież odwarem rumianku po razy dwa na dzień czynione. — Po zmniejszeniu febry, gorączki, bólów tu i owdzie napastujących, udzielać po tyżce a nawet i dwie winą, miodu, razy kilka na dzień, piwie dubeltowego nie może by



wzbronionem, takóŜ pozwolić można używania drobiu, białego mięsa, cieleniny, więcéy pieczonych niż gotowanych na obiad, wstrzymać się zaś od nich na kolacyą, na którą kasze kleiowe na rosolach przeznaczają się. Ciepłesze utrzymywanie chorego, co do izby, pościeli, odzieży, jest potrzebne, i przy tych pozostać do zupełnego ozdowienia któremu wiele dopomaga lekarstwo Nr. 27.

Na przypadek, gdyby ten drugi stan zapalny febrzy miał wiek młody, chociaż przy słabowitey konstytucyi, silnych boleściach, napadać, uŜycie powyŜszych srodków, przy 1szym stanie podanych, słuŜyć moŜe, lecz iak tylko zwolnieję febra, gorączka, boleści, natychmiast wrócić się do wskazanych dla tego stanu srodków i diety.

Pozostawać zwykła nieco kródszy przy 1szym stanie po téy febrze słabość iak dłuŜey przy drugim. — Wszelako owzmaganiu się sił iako i ich utrzymywanie starać się potrzeba. Na ten znowu cel, oprócz posiłniejszych coraz pokarmów i napoiów, słuŜy lekarstwo Nr. 3. 31. aby trawność utrzymać.

Te są zasady do uŜycia srodków, postępowań wszelkich z choremi aż do diety a tak podane w następnych szczególnych zapaleniach zastosowane być powinny co do powyŜszych dwóch stanów, wyjąwszy dodatki, gdzie ich miejscowe uŜycia wymagać będzie potrzeba.

### *Zapalenie mózgu.*

Bywa na szczęście nader rzadkie, jest bardzo niebezpieczne, zdarzyć się moŜe u rolników w następstwie wystawienia głów na mocne słońca skwary, równie i to zapalenie bywa towarzyszącem znamieniem przy febrach nerwowych wyŜey opisanych, poznać się następujących znamion: Ból stały silny głowy, czerwona obrzmiała twarz, czerwoność, iaskrawość oczów, zbyteczna ich czułość na światło, łyzy lecące, słuch albo bywa tępy albo bystry, miaczenia zaś mniéy lub więcéy silne dochodzące prawie do szaleństwa, lub wcale odurzenie, i popęd mocny do snu, bicia mocne u szyi, skroni arteriów, rozszerzenie niezwyčajne źrenicy, a ledwie nie powszechnie towarzyszą wymioty, przez które oddawaną bywa ciekość do grynspanu podobna. — Przy pomniéyszym znowu zapalenia



stopniu bywać zwykło ciągle głowy bolenie, równie rozpoczyna się też mózgu zapalenie przez silną febrę, i takową gorączkę, a owa czerwoność twarzy, oczów bystrość i. t. d. są tylko skutkami napływu krwi do mózgu.

Prócz upałów skutkujących na głowę wszystkie przyczyny zrzadzające febry zapalne, a które już umieściliśmy, równie i do zapalenia mózgu wpływają.

### *Leczenie*

Wspiera się narozpędzeniu najspospieszniejszym zapalonego mózgu. — Tu szczerzyć nie można krwi upuszczenia, nadewszystko zwenów najbliższych głowy, osobliwie przy stanie pierwszym, temperamencie krwistym, w wieku młodym, oprócz tego upuszczania krwi można rozdrażnić rozczynaniem piórkiem wydrążenie nosa, ogólnie włosy, głowę zlewać wodą ile być może najzimniejszą, czynić okładania zmięszaniem Nr. 20. gdyby wypadła potrzeba, do powtórzenia krwi puszczenia przystąpić, przykładac synapizma na łytkach, a na karku i rękach wizykatorye, dawać enemy chłodzące z serwatki, nogi moczyć w letniéj wodzie, przystawiać piliawki na skroniach, za uszami, na szyi, karku,

stawiać bańki wmięscach tychże lub i odległych. — Ale ostatnich ratowania srodków użyć wypada przy pomniejszém mózgu zapaleniu, iakie się przy stanie drugim zdarzyć może. — Do podanych tu srodków służą napoje też same, dyetta któreśmy przy ogólném zapaleniu podali, równie i tu w żaden sposób przepomnieć nie powinniśmy, ażeby chory ile możności miał głowę położoną w górę, w chłodném miejscu leżeć spokojnie i lekko być okrytym, po usunięciu zapalenia i powrocie zdrowia, czas nie mały chronić się powinien od upałów, pokryciów głowy ciepłych, i równie od wszelkich trunków rozgrzewających używania.

### *O zapaleniach części w wydrążeniach ust znajdujących się.*

Nazwiska różne od części zapaleniem zajętych otrzymują, np. podniebienia, migdałków czyli zawałków, gardzieli, krtani, wszystko się tu ma czynić, co się już przy zasadach ogólnych podało, tu tylko dodać wypada, że są potrzebne miejscowe srodki, iako to: przykładania piliawek około szyi, synapizma, kataplazmy z mleka i lniane go nasienia, ale te powinny być chłodne, smarowania maścią szyi Nr. 21. płókania najmniey drażniące, odwar



kwiatu bzowego na wpół z makiem, przy mocnych zapaleniach, co prędzcy krwi upuścić, których znamiona wyżej podałem, a tu jeszcze powtarzam że ból, obrzmienie, czerwoność, są to znamiona charakteryzujące każde zapalenie, gdy przeciez czerwoność nie tak zbyt uczynna zwykła towarzyszyć stanowi drugiemu, przy nim więc równie środków lekko wzmacniających użyć wypada płókania więc z szalwii, kory wierzbowey odwarów z dodatkiem miodu, wreszcie przykładania synapizmów umiarkowanie nie zaniedbać, a nawet i piławek przystawienia, zwłaszcza w młodym wieku. — Dyetta i leki też same, które się podały przy stanie drugim.

*O zapaleniu pacierzy grzbietowych.*

Nie bez powodu gatunek ten zdający się być rzadkim umieściłem, dość często napada rolników, i ciężko pracujących, przez dzwigania ciężarów, leżenia na ziemi dla spoczynku po zmordowaniu się, zwłaszcza zapociwszy się. Poznać się to zapalenie przez mocną febrę, do tego silny miejscowy ból całej kolumny pacierzy grzbietowych. Oprócz środków wyżej podanych służą i miejscowe, iako to: piławki wzdłuż pacierzy grzbietowych, osobliwie zaś

nacierania (*scarificatio*) wizikatorye, enemów dawania. Chociaż to zapalenie nie ma iak mózgu i innych szlachetnych części zapalenie niebezpieczeństwa, wszelako niepoznanie iego lub zaniedbanie zostawia paraliż krzyża, nieraz skrzywienia kolumny pacierzowey, i wyniszczenie ciała. — Resztę postępowań przedsiębrać wypada podług stanów ciała, i stosownie do nich przedsiębrać środki.

*O zapaleniu płuc.*

To poznać się przez tępy cisnący ból w piersiach, a przytém tchnienie bywa krótkie uszkodzone, nieraz nawet dość głośnie, i przy niem przylęcza się boiazń, puls bywa nayeściej nie tak twardy iak przy innych zapaleniach, owszem miękki, chorzy lepię na stronie zapaleniem zaięty leżeć mogą iak na wolney od niego, zapaleniu temu towarzyszą kaszel suchy z odrzucaniem krwi żyłeczek, i ten zwiększać zwykły ból głowy, lub tenże zrzadzonym bywa przez wzruszenia kaszlowe zapaleniu temu przytomne. — Twarz, oczy, albo są zbyt czerwone lub smutne, do tego napadają chorych częste wzdychania, uryna biała a gęsta, przylęcają się poty kleiste, cikliwość, a przy nich dość często wymioty żółcio-



we: iak przy nich i tęskność, stolec albo bywa wstrzymanym, lub biegunka przystępuje, sama zaś febra powszechnie rozpoczyna się od silnego dreszczu szybko po ściele przebiegającego, po którym silna następuje gorączka wnocnych zwłaszcza napadach. — Choroba ta trwa naydłużey dni 14. i rozwalnia się albo przez przesilające poty, lub urynę, a rzadzięj krwi odpływy. Nie można iednak utrzymywać, aby przy tęży febrze wymienione tu znamiona wszystkie były przytomnemi, bywają ieszcze i inne, które wypływają z uszkodzonych płuc czynności, lub innych organów z niemi w współnictwie będących.

Też same przyczyny, o których przy powszechném zapaleniu się mówiło, zrzadzają i to płuc zapalenie, mimo iednak tych nagle zaziębień, natężenie płuc przez szybkie bieganie, tańce, bezrozumne krzyczenia, śpiewania, grania na dentych instrumentach, przez mocne wiatry, dymy ostre, peły, kurzawy, wstrzymanie odpływów krwi płcikobiecy, hemoroidyczne, złe katarów ciągłych leczenia, stwardnienia masy płuc przez szczególną konstytucyą, a do tego ieszcze wpływa miejscowa do zapaleń dyspozycya.

*Leczenie.*

Wspiera się na tychże, co powyżey zasada h, ulgę tu tylko w napadach kaszlu uczynić wypada, i na ten zamiar, służy odwar Nr. 27. Nadmienić tu muszę, że tak przytęm płuc iako i wszelkich innych części ciała szlachetnych, to iest nie odbyty wpływ na utrzymanie życia i zdrowia mających, zaraz przedsięwziąć srodki doradcze, aby przez zaniedbanie ich długich uniknąć cierpień. — Dodaie i tę potrzebną uwagę, aby po uleczeniu tego zapalenia czas niemaly tych wszystkich przyczyn, które zrzadziły zapalenie, unikać w celu ochronienia od się powtórnego napadu, i powolęj oswajać płuca z temiż przyczynami, iakoż same wolne chodzenia, umiarkowane grania, śpiewania, służyć mogą za srodki wzmacniające płuca po ich przez zapalenie osłabieniu.

*O kłóciach w boku.*

To uczucie bolesno dokuczające, należy do rubryki febrów zapalnych, iakoż febrze tego nazwiska towarzyszy, a przy nięj znamiona są następujące, Stale kłuiące przy tchnieniu, zwiększające się bóle w iednym lub wielu miejscach piersi, i zwykły się rozchodzić aż pod łopatki i grzbietu. — Tchnienie



bywa uszkodzone krótkie i nierówne, a puls wnet twardy pełny, wnet miękki mały słaby, kaszle zaś albo suche wilgotne, lub i krwią zafarbowane wyplucia. — Wszystkie przyczyny zrządzące zapalenia inne, z rządzą i niebiesze, aco się mówiło przy zasadach leczenia, i uważania dwóch stanów, środków do nich i dyettów wszystko tu służy, oprócz że to zapalenie nie tak wymaga ogólnego krwi puszczenia, daleko lepić służyć miejscowe, iako to: nasiekania, nacinania, (*scarificatio*) piławek przystawienia, a przytém smarowania, synapizina, a w końcu i wzykatorye, zdarza się dość często, że też klócia bywają i fałszywe, iakoż wyprowadza takowe reumatyczna, kataryczna materia, niema i tu miejsca ogólne krwi upuszczanie, lecz miejscowe środki, które się tu podały, zupełnie do skutku przyprowadzać.

#### *O zapaleniu żołądka.*

Przedstawiają się przy niem silny, stały, w okolicy znajdujacego się żołądka ból, a któren za każdym małym przyciskiem, za każdym wzięciem pokarmu, napoiów, technieniem nawet, zwykł się powiększać, przytém towarzyszą wymioty tęskności, uczucia około dolka serca takóž bolesna czkawka

zatwardnienia stolca, ziomb nóg, scieżniony, mały, nierówny, lub twardy prędkie i pełny puls.

Wszystkie te znamiona być mogą umiarkowanemi, a to co do stopnia zapalenia, co do zaięcia nim żołądka, a na ostatek i co do sposobu, iakim zrządzone zapalenie zostało. — Niekiedy zdarzać się zwykło, że niema tych znamion, aco się zwykło przytrafiać przy nader gwałtownych boleściach, a szybko nader po nich przechodzącego w gangrenę zapaleniu, nie raz rzetelne jego poznanie zbyt trudnem bywa, a to z powodu w bliskości położonych części, nadewszystko, że bardzo łatwo toż zapalenie porównywać można z zapaleniem wątroby i kurczowemi żołądka cierpieniami.

Obok powszechnych przyczyn do zapalenia wpływ mających, ieszcze się szczególni przykladaia: użycie korzennych przypraw, rozgrzewających napoiów, zimne picia po rozgrzaniu się ciała, robaki w żołądku, mocne leki, wymioty lub laxowania za zbytecznie sprawujące, za mocne żołądka przeładowania, użycie przypadkowe trucizn, odurzających roślin, szkodliwych grzybów, silne wglowę uderzenia, idy zranienia, a nawet i poblizszych organów zapalenia.



Z których kolwiek bądź przyczyn tu namienionych, tem bardziéj gwałtowniéj działających, zapalenie to iest nader niebezpieczne i prędko z życia pozbawia, tem więcéj kiedy otwory żołądka górny lub dolny bywaią od zapaleń zajętemi.

*Leczenie tego zapalenia.*

Wymaga koniecznego przyczyny usunięcia, osobliwie kiedy taż najszkodliwszý bywa natury, do którój należy użycie trucizn, i innych zdrowiu nieprzyjaznych rzeczy. Ze zas otém mówić się będzie przy materyi chorób nagłego ratowania wymagających, pominiem w tém miejscu podanie szrodków, zostaną tylko przy innych, a tak ieżeli z przeładowania pochodzi lub nadużycia trunków rozgrzewających, potraw zbyt korzennych, a boleści nie są ieszcze tak gwałtowne, równie iak febry i gorączki, przytomność, nie czekając na zwiększenia takowych symptomów, im prędzýj tem lepiej dać proszek Nr. 2do. na wymioty, ale późniéj, to iest, kiedy przystąpią bóle znaczne nie odważać się dawać, dnia zaś tego iedne kleie z kaszów służyć maią za posiłek, zapalenia zaś uśmierzanemi być maią, nie tylko co do stopnia, wiakim się znajduią, a co

się zgwałtowności bólu, silnéj febry i takoweyże gorączki poznać, ale nawet i co do owych dwóch stanów, których różnicę wyżej podałem, a puszczanie znaczne krwi wpierszym stanie a nawet i powtarzanie iest potrzebą; — Jak przy drugim stanie daleko skromniejsze lub na żywocie przykładac podostatkiem piławki, — W obu znowu stanach służyć przykładania na żywocie synapizmów wizykatoryów, ieżeli by okładania żywota gotowaniem w mleku lnianém nasieniem i rumiankiem, lub smarowania maścią Nr. 21. nie miały pomniejszać boleści, dawać enemy, często powtarzać, te maią bydz z mleka na w pół z oleiem lnianym zmieszane.

Podaliśmy przy innych zapaleniach środki do użycia wewnętrznego, ale wybor ich przy tém żołądka zapaleniu, gdzie bezpośrednio przyięte drażnienie iego zwiększaią, a dość często dla nieustannych wymiotów użycie ich staie się bezskuteczném a nie raz i szkodliwém, wyiawszy sztucznych mleków, kleiowych napoiów używać, innych nie radzę, co dopiero po wstrzymaniu się wymiotów, zmniejszeniu boleści, febry, gorączki, oprócz kąpeli poza pępek, ieżeli te czynić, a nawet i często dniem powtarzać, dozwoli miejscowa sposobność, użycie proszku Nr. 6.



Po każdym zapaleniu nader ważnem iest dla przychodzących do zdrowia warunkiem utrzymać się w przynależnéj dyecie, szczególniejszy mieć wzgląd na nią należy. Oprócz rosółów i ciękich kleiów z kasz kleiowych, mleczyw, nie radzę się na insze potrawy odważać, i to najmniej przez tydzień, aby po tym czasie nader powolęj z użytkiem innych twardszych do strawienia postępować wypada, chcąc się od powrotu zapalenia zabezpieczyć.

#### *O zapaleniach kiszek.*

Poznać się z następujących znamion, iako to: z silnéj palącej swidrującej iey w żywocie boleści, a która przy każdym ciała poruszeniu, lub żywota macaniu powiększać się zwykła. Towarzyszy ledwie nie powszechnie, wstrzymanie stolca, bolesne odbijania, zielonawe nienapomyślniejsze wymioty, niespokojność, tęsknota, burgotania po kiszkach, ziąb wniższych ciała częściach, częste na twarzy zmienienia, mały miękki prędkie puls.

Znamiona te zwykły bywać umiarkowane, stosownie do zapaleń, czyli to zaięło cienkie lub grube кишки. Licznie tę chorobę uznawać za zapalenia innych nawet trzewiów w żywota wydrążeniu położonych, nawet zbiegun-

kami, hemoroidami, kolkami, w końcu przytem zapaleniu przyłączać się mogą silne omdlenia, konwulsye, a na ostatek wymioty ze stolcem.

Te same przyczyny w żołądku zrządzą i to zapalenie, nadewszystko zaś uparte nader stolca wstrzymanie, ciężkie rodzenia kolki, biegunki, powikłania kiszek, mocno drżazniące enemy.

Równie i tu na dwa stany uważać należy, i tak sobie iak przy zapaleniach innych postąpić wypada, z dodatkiem przystawienia piławek do kiszeki stolcowej, naparzenia ciepłe z rumianku i mleka, przykładania na żywot lnianego nasienia, smarowania go maścią Nr. 21. półkąpiele, enemy dawać z mleka, odwaru lnianego nasienia, dzielnie służą, ale przestrzegam: ażeby żadnych drżazniących enemów np. z solą, senesem, nie dawać, równie iak lekarstw laxujących, chociażby te były mniej drżazniącey natury.

#### *O koltunie.*

Porządek materyów prospektem zaiętych doprowadza wydawca do koltunu, przypisuią Autorowie, że iest Polakom, Tatarom, Starożytnym właściwy, że nawet zwierzęta domowe od niego nie są uwolnionemi, a że się najprzód w Polsce zjawił, ztąd też i



kołtunem Polskim, lub Nadwiślańskim nazywamy, że ma być dwojaki, ieden prawdziwy, fałszywy drugi, że w następstwie choroby, kołtóniastą zwaney, przystępnią nieuleczone kalectwa, rany, wrzody, wzroku utrata, a nawet i znaczne odludnienie zrzędza, że iest zarażającym, oto iest krótki zbiór zdań o nim pisarzów.

A że nie iest zamiarem pracującego wdawać się w Historyczny iego wywód, iak wchodzić w rozwiązanie zagadki, iakiéyby miał być natury, czyli są tak okropne cierpienia, istotne charakteryzujące chorobę kołtunową, lub czyli toż ma z wielu chronicznemi styczność; ale raczéy chcąc przeysć przyczyny iey dotąd przyznawane, wchodzić w ich objaśnienia, podać środki skutkujące, uczynić wstęp do złamania przesądów odwiecznie wkorzenionych, iakoby nie mogła być uleczone, co wielu odstręcza od ratowania się, a zatem i ochronienia się od rozmaitych napadów. — Za nim przystąpię do podania sposobów postępowania przy téy chorobie, które i iako rodak, iako znawca w postępie lat 39. miałem z ręczność nader licznie, a przez te być może i zagubić te obrzydłe włosów zjawiska, iak zginął przez wzrastającą cywilizacją trąd, na którego leczenie,

sama Francya prócz innych Państw 15000. Szpitalów liczyła. — Przeydą się nayprzód przyczyny iemu przypisywane, a po załatwieniu ich krótkiém istotne umieszczę i zakończę dopełnieniem zamiaru, któremu całe dziełko przeznaczyłem.

Nayprzód będąc kraiową, a zatém i endemiczną chorobą, powinna mieć pomiędzy inne uboczne przyczyny, a nadewszystko powszechne, to iest wpływające z powietrza, położenia klimatu, wyziewów szkodliwych, wtrzymujących wolny powietrza przewiew, i t. p. Słowem to wszystko, co nas otacza, co nas żywi, z tych zatem przyczyn powszechnych uważaćby należało, że kray Polski posiada szczególną własność do udziałania włosów zlepiania, a przeto iest nieiako gniazdem kołtunowéy choroby, iaki mieć powinny własności swoich szkodenia, musiałby się przyczyniać do zamnożenia daleko liczniejszego kołtunowych, ato bez różnicy stanu, równie w miastach, w miasteczkach iako i po wsiach, a czego nie dostrzegamy. To okazuje, że klimat nasz iak iest umiarkowany zdrowy bynajmniéy się nie przyczynia do choroby kołtunowéy, a któreyby się stać musieli i obcy do kraiu przybyli uczestnikami, lecz i to się zlicznemi



doswiadczeniami nie zgadza, coby jednak nastąpić musiało z powodu następującego.

Powtóre że ma posiadać ucześniećstwo zarazy, to jest iasniey mówiąc wyprowadzać w processie chorobliwego życia pierwsiatki, które zarażać innych są w stanie, takż tworzyć chorobę, lubo być mogącą w swym charakterze łagodniejszą iak daleko sroższą. Bez żadney sprzeczki przypuściwszy zaraze, równie by się częstkowac mogła, i wtłaczać wrzeczy których koltuniaści używają, iako to: pościeli, odzieży i t. p. dodaymy do téż i obcowania z niemi, zamnażaćby się powinna daleko większa liczba koltunowych, tém pewniey, kiedy się koltun przypisuje za eudemiczną kraju Polskiego bez zarazy chorobę, musi mu więc sprzyjać natura powietrza, klimat, i te iak są nypowszechniejszemi i nynieuchronniejszemi dla każdego, co w nim żyje, wpływami, musiałyby nazywać się iako otwarte szkodliwości, od których tylko zamożny w dzielności sił odporu ocalić się jest w stanie, gdy przeciwnie zmniey dzielnemi, słabowitemi i dostrzeganiem w różnych wieku płci, temperamentach, życiu i nbieżnem, trónkom uległym i t. p. Jako łatwiejszym do ulegania tym nie uchronnym wpły-

wpływom, iak nader przysposobionym do wysysania, przyłącia z ciekami, przyswoienia samego iadu, czyli koltunowego pierwsiatku, chociażby i najmniejszą jego częstkę: wszelako i to jest w stanie częstkowac się, zamnażać, zanieczyszczać cieki ludzkie, i też same charakterystyczne produkta chorobliwe, wraz z przytomnemi znamionami wyprowadzać, ponieważ dobroczynney natury zamiary dążą do tego celu, aby się obcych nieprzyjaznych ekonomij ciała, zdrowia tego trwałości, i nienaruszalności, po za grzaniu ciała wrozmaity sposób, naturze pierwsiatków zarażających odpowiednie pozbyła, a to jest wszystkich bez wyjątku zarażających chorób przeznaczeniem, wypadaloby z osnowy powyższego objaśnienia koltunową chorobę za rażącą z dwoiakiego względu uznawac, raz że iako endemiczna, iuz tem samem musi mieć przyczyny powszechne, a o tém iuz wyżej mówiłem: drugi, że pierwsiatki iadu tego w processie samey choroby osobliwie tak zwanej prawdziwym koltunem wyprowadzone mi bywają. — Z tych dwóch względów znou nierównie daleko większa liczba koltuniastych musialaby się znaydywać, iak ciągle zamnażać, co więc.

Część II.



ksza z przyrodzoną do tego nad obcych skłonnością, lecz i tego bynajmniej nie dostrzegamy, przypuścimy że zdarzyć się mogą tu i owdzie podobne zarazy, że włosy zlepione, do innej przyłożone głowy zarażały, z tąd wnoszą że muszą posiadać iad właściwy. Nie będziemy uporczywie zaprzeczać takowych zdarzeń, które być mogły wypadkiem szczególny dyspozycji, wszakże równe są doświadczenia, że włosy z innych chorób na peruki obracane takż razily. — Lubo w tém dowodzie trudno byłoby Koltunowey w włosach ostrości zaprzeczyć przytomności iako i innych chorób, lecz dowodów takowych szczupłość nie dozwala zastoso- wywać do koniecznej zarazy uczestnictwa wypływającej z natury tych lub owych pierwiastków. — Wreszcie włosy należą do rubryki części organizmu, są one uczestnikami zmian zachodzących wekonomij ciała, i względnie tymże zmianom podlegają, iakoż doświadczamy dość często, po febrach, innych gorączkowych chorobach, po głowy bólach, po ciągłych zgryzotach i t. p. że ich wzrost wstrzymanym bywa, że wypadają, kolor swój zmieniają, kleją się włosy i nieiako sztuczną lepianką wciążem leżeniu wyprowadzają. —  
Co do niniejszých choroby czyli te udo-

wodnią konieczność zarazy: alboż to nasz organizm nie iest usposobionym do uczestnictwa różnych chorób? mamy tego przykłady, że febry przerywane (*febres intermittentes*) takż zarażały; podług tego mniemania, musiałaby takż pierwiastki zarażające wyprowadzać, dalej są podobneż zdarzenia, że osoby, które już odbyły ospy, odry, pilnując chorych, na też wyrzuty lubo powtórnego ich napadu nie doświadczaly, wszelako dostawali innego wcale bez charakteru wyrzutu, — Tę niezaprzeczone niczem dowody mogące być liczniejszemi wsparte przekonywać powinny o zdolności naszego organizmu, być rażonym, tem więcéy pod pewnymi względami, lecz to nie stanowi konieczności zarażenia, iaką przypisać należy pierwiastkom zarażającym, bo co zdarzyć się może wielką stanowi różnicę od tego, co musi z natury rzeczy wpływać.

Dodajmy do tych uwag i następującą iako na niezaprzeczonych doświadczeniach opartą, że wszystkich bez wyjątku zarażających chorób pierwiastki mają swoje dążenia ku przeznaczonym dla nich od natury organom, i te to słusznie uważać można, nieiako za przewodniki z udziałem przyciągu ku sobie tych lub owych ra-



zących pierwiastków, iakoż wiśniemy że odra, ospa, szkarlatyna swierzba itp. przeznaczony dla siebie mają organ skóry, że parchy, korzonki włosów, że iad weneryczny części rodne kości podniebieniowe, nosowe, łzowe, sitkowe, i organ skóry, tworząc na nim rozmaite brodawki, krosty, rany, niewylaczając samych kości zepsucia, a co się dotyczy ospy, odry, i t. p. te w chorobliwym procesie przez chemią zwierzęcą wyprowadzone uważać wypada za przesilenie (*crisis*) iakoż do tego zupełny tylko wyrzut za pomocą przy nich towarzyszących febry się nieukończy, trwać zwykła febra, gorączka, a z ich ustaniem i period wyrzutu.

Co do niniejszhey choroby włosy służące prócz ozdób powabów ciała, do zacieplenia téy części ciała tak wielkiey wagi, równie z swéy budowy uważane iako części organiczne, posiadające swe gatunkowe życie, wspierające się na odradzania processie, mocą którego wzrost swój, a po wypadnięciu i nowe wyrastanie otrzymują, równie iak wniedostatku, iego ogolocenie, z nich dostrzeganiem bywa równie iak przy zmianie tegoż odradzania się procesu częstokroć stosującego się do wieku, prac unysłowych, rozwiozłego yż-

cia, przedwześnie zmieniają swój kolor, gdy tenże naturalny różny pochodzi od oleju podług doswiadczeń Parmentieur i innych Chemików Francuzkich, że też włosy oprócz krótkiey o nich wiadomości są ciałami nieco elektrycznymi mogącemi przyciągać, bez ważkowe płyny ciała, iemu już mniej użyteczne, a być może że i w processie wyprowadzone, mogą i służyć do przyciągu koltunowéy materiy, iakoż przypisując im poniekąd tą własność, możnaby ią wywiesdz, że gdzie się po częściach ciała znajdują włosy, tam splątani koltunowych dostrzedz można, włosy zatem z zastosowanego do prawdy podobieństwa moc posiadania przyciągu koltunowéy materiy miechy powinny, a po uczynionéy lepiance iako przesileniu uwalnia znacznie, i przykłada się do ulgi cierpień, ieżeli nie zupełnego ich ustąpienia.

W téy uwadze dwoiakiby błąd przypisać wypadało, iszy. albo uznać za charakterystyczność, koltunowe włosów zjawiska, i różnią pomiędzy témże zjawiskiem, iakiéy dostrzegamy, a wtenczas moglibyśmy śmieley twierdzić, że jest chorobą swego charakteru, i że do niéy przyłączają się rozmaite cierpienia, kalectwa. — Lecz czyliż to niedostrzegamy tychże samych cierpień



kalectw oszpeceń, utraty wzroku, okropnego pò kościach darcia, zrośnienia stawów, gdzie ani przypuścić można, że tam przytomną lub potajemną być może koltunowa ostrość, iako się téż i koltun tak prawdziwy iako i fałszywy bynajmniéj nie okazuje, chociaż powyższe cierpienia chorých przez ciągłą dręczą, a bynajmniéj nie ustają. — 2gi. Ze być musi nieiako przesileniem, takowe włosów zjawisko, lubo wnader rzadkich zdarzeniach przy chorobach chronicznych, czyli długo trwałych, przesilenia przystępują, iak przy gorączkowych powszechniéj, a takowe zwykły choroby rozwolnienie stanowią, że takowe przesilenia bywają w systemie reprodukcji czułości, drażliwości, przypuścimy pierwsze w systemie reprodukcji, czyli iasniéj mówiąc w wyprowadzeniu ciał obcych do czułości organizmu bynajmniéj nie należących, lub ich przeistoczenia z większém lub mniejszém uczuciem iakowych cierpień, a te albo towarzyszą początkowo lub w następstwie, włosów więc zjawisko uważane za przesilenie uwalniaeby, a przynajmniéj łagodniejszymi towarzyszące w chorobie téj cierpienia uczynićby powinny. — Dostrzegamyż tych dobrodzieystw? lubo zdarzyć się niekiedy mogą, ale wta-

kim przypadku przesilenia zasadom przeciwné, do rubryki tych przesileni policzonemi być nie mogą z następujących uwag.

Pierwsze że ta włosów lepianka jest przytomną, wszelako cierpienia w swéj srogości nie ustają, ani téż kalectwa, oszpeceń, nie znosi. — Dodam do tego liczne własne doswiadczenia, że ogrom téj włosów lepianki, pokrywający ledwie nie całą głowę, pomnażały ciągle zawroty głowy, silne iéj bóle aż do wymiotów, i te oprócz innych cierpień nie przedéj ustawały, aż po odstaniu téż lepianki, od pokrycia głowy.

Powtóre że toż zjawisko pierwéj się i to na czas niezakreślony przedstawia, a późniéj dopiero przystępują łagodniejsze lub srozsze boleści. poprzedzać więc wżaden sposób przesilenie choroby nie może, bo co ma być przez proces chorobliwego życia działaniem, bez niego działaniem zostać nie może, więc albo jest chorobą właściwego gatunku a nie przesileniem, albo przesileniem bez choroby, wszystko tamujące porządek pracujący nie darmo w swém działaniu natury.

Po trzecie co do samego podziału tego włosów zjawiska, iaki onemu Autorowi przypisują, teraz w krótkości



pomówimy. Działo go a) na prawdziwy b) fałszywy, stósownięby wypadało dzielić na łagodny, to jest nie mający żadney względem odjęcia obawy, ani co do czasu, ani co do pomnażenia boleści, ani co do następstw, iakie sprawdza przedwczesne obcięcie prawdziwego, i to powiększēy części upłci kobiecey zamężney niż męzkiey, kobiecey z przyczyn wielu, mianowiciey rozgrzewających zbyt głowę czepków i obwiązań podobnych poszenia, tudzież zwiększēy nierównie drżliwości nerwów i t. p. przyczyn, gdy przeciwnie nader rzadko w panieńskim stanie daie się dostrzegać, iakoż zapatrujemy się na piękne włosów długich pletnie: u płci męzkiey przypisują głowy gołoniom, i że na częściach okrytych włosami daleko liczniēy toż włosów zjawisko dostrzeganem bywa, w dowód czego, przytaczam starozakonnych boczno zostawione włosy, niezapuszczając się w objaśnienie dosyć jest powiedzieć: że to co u płci kobiecey służy do zlepiania włosów, i to niepoślednich, tu znowu z powodu golenia uyma zacieplenia, i że materya przeziwna wstrzymana na miēyscu ogólnem w miēysca włosami okryte ulatuje, właśnie iakoby tu iēy ilość szczupła nie znalazła innego miēysca, iakim jest całe skórne

ciała naszego pokrycie. do swego poza granice wychodu. Dla tēy to przyczyny że inne narody nie golą głowy, mówi Szlegel nie znają tēż włosow skleienia. Jeżeliby tak być miało. nie byłoby łatwiejszego szrodka do zupełnego zatracenia, iak zaniechać zupełnie golenia, przecie nie dostrzegamy z tēy przyczyny pomnożonēy liczby kołuniaszych, przecie i to golenie coraz wzwyczajn ustatie, przecie utrzymanie czystość tēy części ciała, a wreszcie na eóż się przyda szereg szrodków naprzeciw kołunowēy chorobie, które podaje tenże Szlegel? (\*) Przeciwnie się dzieie z przedwczesnem kołona prawdziwego obcięciem, tu to dopiero pomnażać się mają owe kostne bóle, i inne cierpienia, nawet nieuleczona ślepotą, paraliż, appoplexia, i że pierwszych zwolnienie dopiero za nowem kołuna okazaniem się następuje. Przypisują

(\*) W ciagu swego zdania tenże Szlegel w dziele o kołunie na stronie 107. utrzymuje wywód prawdziwego kołona od wstąpienia na Tron Kazimierza Igo, około R. 1041. lub nieco późniēy, panując tenże do R. 1058. i że ten Monarcha z powodu otrzymaney dyspensy opuśczenia stanu duchownego przyrzekł wprowadzić u nas głów golenie, a nadto i płacić na opał lampy do kościoła S. Piotra w Rzymie.



prawdziwemu koltunowi prędkie wywiniecie się, grubość odstających od pokrycia czaszki włosów, cuchnięcie, zobcięcie wypocenia kleistej czerwonej ciekłości. Takowe dostrzeżenia, wcale z innego źródła, nie koniecznie z koltunowego naciągu wypływać mogą, iakoż nadmienione powyżej włosy są rurkowe, walcowej formy że napełnione są swemi sokami, że przy gwałtownych a do tego ciągłych bólach, iakie nie raz w artrytycznej, wenerycznej chorobie towarzyszyć zwykły takowe cierpienia nadgromadzać do głowy krew, mogą też i do niej pokrycia, a nawet i samych włosów korzonków, którym moc wciągania pożywności ich zaprzeczyć trudno, mogą więc i krew rozrzedzoną wciągać wsiebie, iak przypuszczają naczynia wodniste, po białku oka, licznie przeplatane krwi zbyt poczęstkowane kuleczki, od których wczasie zapalenia oka białko iego iak szkarłat wygląda, gdy też naczynia wodnistą ciekłość zwykły prowadzić, w ten czas kiedy nie doznają żadnego przedrżaznienia. — Zobiasnienia tego łatwo przekonać się można, że i znawcy, iako ludzie, nie są od uprzedzeń a nieraz i od błędów zupełnie wolnemi. — Grubość owa włosów dostrzegac się miana, gdyby była

udowodnioną, iaby jeszcze nie mogła należeć do znaków prawdziwego koltuna, raz, że już przedstawiłem iż włosy są rurkowe, moc wciągania na wzór naczyń włoskowych (*vasa capillaria*) mają i wysysają nadgromadzenie soków do części tej bólem silnym zajętej.

Co się dotyczy cuchnienia, iest tak naturalnym wypadkiem, że policzyć toż bez otwartego błędu do zjadliwości koltuna nie godzi się. W każdym miejscu utrzymane ciekłości przy zwiększonej ciepła temperaturze zmieniają się zwykły, a nawet i cuchnąc, tak łatwo, iak czysta woda od zwierzęcych pierwiastków zupełnie wolna, wystawiona na ciepło zacuchnia się iest wstanie, toż samo dziać się może na głowie, gdzie przez pokrycia włosów lepianki wstrzymane wilgotne parowania nieprzyjemny woni nabierają. — Do tych uwag dodamy i następną, żadnej wątpliwości nie podpadającą, że włosy, iako ciała fizyczne wnet zbliżania się ku sobie, wnet oddalenia, iako elektryczne odbierać są w stanie, rozmaity kierunek od płynu elektrycznego, co się też dzieje przy płynie elektrycznym zwierzęcym, którego bytność w każdej części ciała, tém bardziej głowie iako temi ciałami nayob



ficię opatrzonemi, odmówioną być nie może, temperatura ciepła, atmosfery, uczesnictwo płynu tego, pokrycia sztuczne téż głowy, podobnież ciętami te, i tym podobne wpływy, są w stanie i włosy powikłać stosownie do stopnia natężonego płynu, i tychże łatwiejszego przyciągu, ledwieby nie wypadło porównać to zjawisko włosów z proszkami fizycznymi różnych ciał, przedstawiających się przez działanie płynu elektrycznego. — Dotąd był wywód przekonać mogący, że koltun jest wypadkiem skutkujących wpływów, o których już tu mowa była, a które pośrednio lub bezpośrednio do zdziałania należą, w dalszym wywodzie bliższe się podadzą, tu tylko otwarcie wyznać muszę, że to włosów zjawisko obok szeregu ogłaszanych i utrzymywanych nieszczęść jest tylko chorobą przeistoczenia włosów. — Wciągu téj materji udowodnić przedsięwziętem, że owe cierpienia, o których na wstępie mówiłem, wcale są znanionami charakterycznymi innych chorób, a teraz przekonam, że odcięcie prawdziwego koltuna jeżeli być może szkodliwym, iak utrzymują pisarze, bynajmniej z téj przyczyny nie pochodzi. — Uspodobienie całego organizmu, iego części szczególnych posiadają wrodzoną własność,

że przywyknąć mogą do téj lub owej temperatury, ale przywyknawszy oswoiwszy się z niemi, każda przemiana, tem bardzięj pośpieszna, nieprzywykła do tego lub owego wpływu, nie może iak nieprzyjaźnie działać, i otwarcie szkodzić, a to tem natarczywiej, im są przytomnemi stopnie, zwiększonéj, zinniejszonéj, chorobliwéj czułości i drżliwości systemów. — Na téj zasadzie wspiera się szereg chorobliwych napadów, nieraz zagrażających niebezpieczeństwem życia, lub nagłą iego zagładą, mamy tego niezaprzeczone przykłady, że po zagrzaniu się zaziębienia sprowadzają Reumatyczne cierpienia, pleury, uparte biegunki a nieraz i paraliż. — Na téj to zasadzie wspiera się owo nadpotrzebne głowy ogrzewanie, ciągle, przywykle, przez przytomność obszerną koltuna, a im takowy jest iak naybliższy głowy pokrycia, im dłużej na nię spoczywa, tym więcéj ta część znajduje się w wyższym stopniu zacieplenia, którego zmiana szybka zrzadzić różne cierpienia miejscowe, gdy te przez związek części organicznych swe skutkowania i do całości organizmu przenieść mogą, a nawet i przenoszą, ten to niebezpieczny krok przez niedostatek potrzebnych zności i dostrzeżeń zamno-



żył, spłodził, uprzedzenia śmiechu godne, że jeszcze niedożył kołtun, wszakże tenże przez swój ciężar, a sprężność włosów, zwolna się opuszcza, i nader nieumiarkowanie, mieysca te zwolnym powietrza obwiewem się oswaia bynajmnię tych wszystkich Cierpień, nie doznał, robisz to kołtun? zaiste potrzeba byż mocno uprzedzonym, aby się z tego obiaśnienia nie przekonać a pocóż na wywód tyłu cierpień nadciągając przytomność kołtuna, niesąże to włosy od natury przeznaczone, aby służyły do zagrzanія tej części ciała, iak że u my tego zaogrzanія zastosowaney do indywidualności, równie dostrzegano licznie, że były nader szkodliwe: iakoż niedawnemi laty naśladowana w naszym kraju płoszków Sekwany do obcinania włosów moda, znaczne pleury, głowy bóle, Reumatyczne cierpienia zrządzała, a tego miałem przykłady, i że zupełnie ustały. Prócz tych zdarzeń równie u płeć męzkę takowych miałem przykłady, że po ogoleniu głowy z powołaniem klasztorów zwyczajnem prócz ię bólu, szumu w uszach, coraz mocniejszy wzroku osłabienie przystępowało. I że te cierpienia iako i u płeć żeńskich nie prędzē iak z odrostem włosów ustępowały. Owóż to

są dowody, że włosy taki mają wpływ na ochronę nie tylko tej części ciała od napadów rozmaitych dolegliwości, ale nawet do całego ciała, i że nadciągając i wywodząc z kołtunów szereg tyłu dokuczających chorobliwych jest tylko marzeniem, dowód i tego wypływa że Autorowie środków doradczych wnet przeciw Artrytycznym, reumatycznym, skrofalicznym, lub wenerycznym chorobom używają, tu znowu albo przyznać im bez ogródki wypada, że nie mogli dotąd wysledzić natury kołtunowey ostrości, albo że ią iako spólniczą z powyższymi chorobami poczytują, lecz i to nadciąganie można im nader słusznie zaprzeczyć na podstawie licznych doświadczeń, że też same choroby, w czysty charakterystyczności lub powikłanē, zwykły i w naszym klimacie i winnych przez lata dręczyć, a to bez żadnego wpływu, ostrości kołtunowey, iakoż ię skutki w wyprowadzeniu tego włosów zjawiska nie daią się dostrzegać.

Zniknęły wieki Starnigiego, pozostała zaś dotąd epoka rozstawiania, tak okropnē iaką być miała ówczasowo choroby, on to pierwszy opisem ię zatrudnił w Pawij całe grono Profesorów lekarskich, odtąd też w korzeniach się przesady, uprzedzenia, a nawet



i Kraiowych pisarzów zajmujące, być może, że częste w kray ten Chord Tatarskich napady, nie pochamowana chuć i inne postępowania rozsiały nasiona wenerycznego jadu, nie tak łatwo wykorzenie się iak przeniesć się do następnych pokoleń mogącego, być może że nie przebytość lasów, obfitość bagien, niedostatek, życie nędzne, i t. p. przyczyny, zrzędzać mogły nieiako łączność powyższych chorób dotąd trwających wraz z ich miejscowemi przyczynami, a wskutku tychto wpływów nieuchronnych być wypadkiem mniej lub więcej chorobliwe życie, iak i całe żywienie ciała, i soków ludzkich niedokonane mieszanie, bardziey się do utrwałeń chorób wzwyż nadmienionych przyczynały i przyczyniają, których albo zjawisko włosów być może przytomnym lub nie, a jeżeli zaś jest, mieć może oprócz powyższych powszechnych przyczyn miejscowe, ponieważ w takim razie działać zwykła natura podług swoich prawideł, urządzając nastroczając się iey chwilowe lub trwale arbitralne przyczyny, co bywają tém zwiększą łatwością uskutecznienia, im mniej gdzie przeszkód, a więcéy daleko przyczyn znajduje, iakoż tych wszystkich wywodów stwierdzeniem jest Polesie Litewskie, Pińsk nad wszelkie.

kie inne okolice, jest dotąd liczném kółtuniastych siedliskiem. — Lecz ieszcze raz powtarzam, że toż włosów zjawisko przy bytności lub nieprzytomności innych cierpień jest tylko wypadkiem zaszyłych kombinacyi, wpływów tak powszechnych iako i miescowych, i że jest tylko zmianą swego kształtu, bez uczęśnictwa zarazy, bez nadania mu nazwiska choroby kółtunowéy. Co się zaś dotyczy miejscowości przyczyn, równie iako i wynikających z chornbliwego życia skutków, co do niedostatecznego pożywienia i soków przynależnego zmieszania. Raz ze stanu istotnych chorób wyżéy wspomnionych. Drugi, iako produktów z nich wynikających, niżéy poznamy: równie iak, że usunięcie przyczyn, ściśleéy dyetty zachowanie, dostateczne i trwale processów odradzania się przywrócenie przez należne soków zwierzęcych zmieszanie, są i zostaną na zawsze dzielnemi srodkami naprzeciw tym wszystkim chorobom, którym i przytomności kółtuna przypisują, iak na znieszczenie iego zupełne. Pozostaie ieszcze obiasnienie niektórych znamion przypisywanych kółtunowéy ostrości, a zatem i chorobie tego nazwiska.



Pomiędzy innemi, oprócz ran nieuleczonych, różnych kalectw, nadrostków kościowych, skrzywień kości, zrosnień stawów, skurczeń mięsnych części i t. p. widzialnemi są paznokci chrapowatość nakrzywienia, nawet zmiana zwykłego ich koloru, zaprzeczanie przytomności tych znamion zaradzania więc i pomocy niepoślednich wymagających, byłoby dla znawcy niedo przebaczenia pomyłką, iak jest obowiązkiem wskazać istotne ich źródła, aby i tu znieść wcale uprzedzenia. Każda dostrzeżona części organicznych w ich tkaniu, teksturze, strukturze, przemiennym wzroście i t. p. zmiana, jeżeli do tego nie należało najmnieysze przypadkowe uszkodzenie, zachodzić może w cały tego lub owego ciała budowie, lub pojedynczych tylko częściach, wspiera się nade wszystko na niedostatecznym stałych części działaniu, gdy to nawet zayść może i w pojedynczych częściach, a bynajmniey ogółu nie zaymuje: skutek tego okazuje się, że i soków ludzkich nie może być przyzwoite zmięszanie, dawnemi czasy pod szeregiem ostrościów i wywodzie z nich wiele chorób zwanych, że nawet cały proces odradzania się; takowymże działaniem bądź to ogólnem bądź to pojedynczych czę-

ści ulega tak dalece, że pierwiastkom odżywnym zbywa na dostatecznych przymiotach, lub też nad potrzebę w takowe bywają zaopatrzone, iak częstokroć mylnie nie na swoje miejsca doprowadzone, obu tych wad przekonanie wspiera się nietylko na różnaitości ciał budowy, iakie dostrzegamy na temperamentach, na różnaitości płci, na wieku z którym zmienia się odradzanie, a przy nim wychudnienie ciała kolor także włosów zmienionym bywa, téżże zmiany dostrzegamy na roślin chorobliwym odradzania się processie, którego uszkodzenie oprócz krótszego życia, wyprowadza rozmaite oszpecenia. Spoczywając na takowych dowodach przekonać się możemy, że chorobliwe odradzenie jest wstanie liczne zrządzić cierpienia, a nawet i charakterystyczne choroby, im bywa niedostatetnieyszy, dochodzą iego skutki aż do nerwów układu, wten to już czas wszystkie działania coraż wątlejąc, pogorszaiają stan cierpień, znamiona chorób, wszystkich uszkodzeń, kalectw cowiększa wybór naprzeciw tymże naydzielnieyszych szkodków, dla niedostatecznego ich odczynu iak najmniey lub wcale zamiarowi nie odpowiadającym, a zatem nieużytecznym. Otoz to są krótkie wywody potężnego wpływu iaki



czyni chorobliwe odradzenie, w następstwie którego równie towarzyszy chorobliwe iak nader wątpliwe, życie. Można stale utrzymować że niedostateczne mniéy ekonomii ciała polubne odradzanie jest nayglównieyszą podstawą oprócz innych chorób artrytycznych, podagrycznych, a że równie to złe soków lipkich zmieszanie czyni widoczne włosów zjawisko wraz z przytomnemi chorob nadmienionych znamionami, o tém nas środków doradczych skutkowania przekonywają, jeżeli ich użycia w pomoc branemi były, a te poniżej umieszczę nie winnym zamiarze, iak żeby równie o nich przekonać się można. — Szrodki te zmierzają do utwierdzenia dobrej alimentacyi, przynależnego soków lipkich zmieszania, a nawet i utrzymowania ciągłego organu skóry działania, czyli iéy parowań i przeziwów, żeby ułotnieyszejszej natury chorobliwe pierwiastki po zagrzaniu ciała, z niemi uchodziły. — Na dopełnienie tych warunków, iak naydzielniey służy wybór pokarmów i napoiów, a te już przy rysach konstytucyi charakterystycznych, w stosowney do nich dyecie, wyborze leków Rozdziałku Igo. części IIgiéy. wcząstce zaś iego pierwszéy na niniejszy zamiar umieściłem. — Co więc tam podałem służyć

ma za podstawę leczenia, przez szrodki dyetetyczne, te lubo są dla ciągłego użytku przykreimi, przecie dla zdrowia muszą być nader milemi a tém więcéy, że i sposób leczenia wspierają, i pewnieyszym tenże czynią.

Szrodek lekarski umieszczony pod Nr. 24. z tego co do wieku po pół tyżki do całéy dawać przed obiadem, po obiedzie w 4. godzinę a raz 3ci. spać idąc, zmieszawszy z wodą i popić wodą, czas długi przy użyciu zostawać potrzeba nie przykrząc sobie, ponieważ dzieło doskonałego odradzania: nie może być w żaden sposób w krótkim czasie powróconym.

Drugi sposób zawiera w sobie używania częstych kąpiei, osobliwie parowych. — Nie małeby dobrodziejstwo dla ludku wiejskiego uczyniono, gdyby takowe po wsiach, a nawet i miasteczkach zakładano, można ie wystawić z małym kosztem, i zniewielkim utrzymywać, oznaczając dni pewne, aby się do nich udawano, jeżeliby codzienne, trudności zrzządzać miały.

Trzeci szrodek stanowi, skasować noszenie czapek futrem podszytych osobliwie w lato, i w czasy tak cieple jak i pod wiosnę, przeznaczyszy dla nich mrozy, bynajmniey zaś nie przyzwyczaić do ich noszenia wpo-



wyżey wyłączone czasy dzieci, naylepsze iest dla każdego głowy pokrycie, niewyłączając ani płci ani wieku, to które niedopuszcza uczuwać srogości mrozów, ani też pomnaża ogrzewania głowy.

*Czwarty szrodek* równie wpływ mający: starać się, aby chleby były dobrze wypieczone, wyrobione, osolone, zawsze są pytlowe zdrowszemi iak razowe, dziwić się potrzeba, iak naganiać, że rolnik nasz mając żyzną ziemię, karmiąc płodami swęj pracy obcych, sam przecie przytęm powszechnym pokarmie zostaje, któren nie mając tu podanych przymiotów, musi zamulać, zaflegmiać żołądek i kiszki, u dzieci zaś zbyt prętko zatykać zawałki brzuszne, do częstych wyniszczeń ciała, zaflegmien soków ludzkich nie wątpliwie się przyczynia, a co nawet i u starszych czyni cówiększa pokarmiujące swe dzieci, iuż same zaflegmione swe soki a z nich i pokarm iuż ten że udzielają swojemu dziecięciu, które nieużywając takowego chleba, przecie pierwiastki kleiowe w pokarmie przyjmuje, iakoż nieraz u dzieci przy piersiach koltunki się postrzegać daia, ztąd to pierwsze prawie powstają zarody do ziawisk włosów, do skrofulicznych, artrytycznych i innych cho-

rób i nierównieby większa rolników liczba tym wszystkim cierpieniom podlegała, gdyby świeże, czyste powietrze, praca, od nich nie ochraniały, wszę iako słabszey konstytucyi takowym ulegać muszą, a czego mamy liczne dowody: równie i tu należą używania kartosli niekraszonych, ani też dla drogości tak nieodbycie potrzebnego natury daru soli, bez której trudno się obeysć, i dla domowych zwierząt niedość osolonemi być mogące, aby były doskonałym strawionemi: i te się równie do zamulen tychże części, do zaflegmien krwi i innych cieków ludzkich, a zatem i dotychże samych chorób przyczyniają.

*Piąty szrodek* równie do dzielności trawienia przykładający się, iest napój piwo, ten żyznący trunek, siły pocrzepiający, iuż to dla pomnożenia intraty i propinacyi, iuż to dla dobra ludu, powinienby zachęcić dziedziców a nawet i ustawą rządu zniewolić, aby piwa były żyzne, dobrze wygotowane, wystate, szkodliwemi zdrowiu roślinami niezaprawne, mętne, ciężkie mało co wodą zmieniałe, niezmiernie żołądka ciepło studzą, przez co i trawienie uszkodzonym być musi, prócz tego do rozdymań, kolek, biegunek i t. p. się przyczyniają, szkodliwsze za sobą



pociąga skutki wódek picie, to zwielu względów scieśnićby wypadało, a na ich miéysce ulepszyć piw robienie.

Użycie szrodka lekarskiego rozporządzam, iak tylko dostrzegać się daie obwisłość twarzy, sił morduących, mglenia nóg, ich obrzmiewań, lub itwarzy, darcia po kościach. krzyżu, nogach i t. p. boleści, iako znamiona wstępnych chorób o których wyżey mówiłem, co się tycze szrodków podanych, te bliżey zmierzając i porównyując sciennych rolników wygodniejszy i zdrowsze prowadzących życie, ci są nader rzadko od tych chorób napastowanemi, iak wolnemi od włosów zjawisk bywają, uczynmyż tylko wstęp do użytkowania z tych szrodków, staraymy się o ciągły ich dochów, a przekonamy się o rzetelném włosów zjawisku, że tenże nie inną był chorobą iak zmiany włosów, i że toż zaginie w oczach następnych pokoleń, zostawiwszy tylko ślady w opowiadaniach lub pismach.

*Koniec Rozdziałku Trzeciego.*

## ROZDZIAŁEK IV.

*O chorobach połogowych po połogowych i karmiących.*

Udzielone zostały w części iszdy. dziełka tego Rozdziałku i Częstce pierwszy upominki dla ciężarnych, iżby rozporządzone w swym żywocie owoce zdrowo na świat wydać mogły, iak same się przy tymże stanie zachowały, w drugiey zaś częstce na uśmierzenie przypadłości, którym ulegają ciężarne. — Wzręciety wskazane zostały przestrogi dla rodzących, a w czwartey dla położnic i karmiących. To wszystko miało zamiar ile możności zapobiegać w tych stanach rozmaitym cierpieniom z nich wyniknąć mogącym, wypadkom dość często życiu zagrażającym, iak przeciw tymże skuteczne podać szrodki, tu więc onich powtórzyć nie znayduję przyczyny, odsyłając czytelników do tychże częstek, nadmienić tu muszę, że obok tych wszystkich rad i szrodków, przecie towa-



rzyszają te cierpienia, nadewszystko przygotowującemu przez naturę rodzeniu i mogą być ostrzejszemi, lub łagodniejszemi, co mimo innych przyczyn pochodzi od rozmaitego stopnia drżliwości, i czułości układu nerwów. — Cierpienia więc te przejdziemy następującym porządkiem.

*Porządek cierpień.*

*Boleściami posetkowemi* nazywamy te, które na dni kilkanaście lub kilka daia poznawać nastąpić miane rozwiązanie, takowe powinny dawać już przestrożę, aby się bliskie rodzenia wstrzymowały od użycia potraw niestrawnych, wiatry sprawujących, zwłaszcza które są skłonne do nich. Pozostać zatem wypada przy pokarmach żywnych, lekkich do strawienia, nie zapominać o wolnym stolcu, aby tenże po dług zwyczajnego biegu mógł być utrzymanym, w przypadku wstrzymania dopomagać jego odchodowi przez enemy, unikać okazyi gniewu, zaziębień, słowem zachowywać się w tych, które udzielone zostały na swém miejscu, przestrożach. Po tych następują.

*Boleści ostrzejsze*, i te napadać mogą częściej, rzadziej, krócej, dłużej trwające, te właśnie przygotowują otwór macicy, aby z swego czaso-

wym płód pomieszkania przepuścić, Boleści równie iako i następne mogą być, iak się wyżej nadmienilo, i łagodniejszemi i ostrzejszemi.

Gdzie dozwoli miejscowość brać półkąpiele ciepłe, po lub za pępek, które nawet i powtórzyć można razy dwa na dzień, siedząc w nich od pół godziny do trzech kwadransy, po wyściu z nich wystrzegać się trzeba zaziębień, boleści te nazwacby można przygotowawczemi sam akt rodzenia, iakoż zwolna przechodzą w następujące, czyli

*Boleści rodzenia* i te być mogą łagodniemi iak nader ostremi przy wzruszeniach napozór febrycznych rozmaitych części ciała, iako to: wargów, nóg, przy wymiatach i innych natury samowolnych odbytach. — Boleści takowe zrzadzane bywają przez właściwą macicy drżliwość, gdy ta nie mogąc już dłużej obiętości płodu, wód i miejsca iako i ciężaru ich dłużej w sobie zatrzymać, pozbyć się tych zwałtownością usiłuje, iakoż się tych wszystkich przy boleściach coraz silniejszych pozbywa, to jest pęka najprzód pęcherz, wypływają wody obficie lub szczupléy, w tym pęcheczcu wraz z płodem znajdujące się, dopiero wychodzi płód, wstrzymanie się tego, zaradzenia potrzebne, odsyła się do zna-



wcy sztuki położniczy, szrodki zaś doradcze wperyodzie tym są tylko, że gdyby boleści przyrodzeniu były za słabe, a zatem i sam akt wydania płodu przedłużające, wzniecać takowe można przez picie cynamonowego nalania, iak się czyni zher: połyżce wina dawać, przeciwnie wystrzegać się, przy ostrych, mocnych bólach tymbardzię, u młodych krwistych, aby przy, lub po porodzeniu krwi odpływu nie pomnaczać, nadto częste żywota czynić nacierania, a wsamém rodzeniu wystrzegać się krzyczenia mnię potrzebnego i owszem pozbycie się płodu wtrzymującego, miasto tego dąć albo wrękę scisnąć, lub tamując oddychania nadymając nim płuca, co ułatwia porodzenie, i te są szrodki dopomagające, a resztę natura skutecznia, którey nieraz znawcy sztuki położniczy dać pomoc winni. Po nastąpieniem rozwiązaniu iak się mają zachować położnice wcząstce trzecię części iszcy dane są upominki, równie iak w czwartę dla tychże iako i karmiących.

Są znowu boleści po urodzeniu dwoiaki, iedne z nich dążą do uwolnienia się wtenczas iako obcego dla macicy ciała, to jest mieyseca, i którego odęście pospieszniejsze lub późniejsze odpowiadać zwykło względnie co

do sprężności całego ciała budowy. Wpospieszniejszym zatem odeysciu sama natura działa, iak w późném ręczną pomoc jest potrzebną przy wspólném, przyczynieniu się rozwiązanej, do tego winna jest dać radę odbierającą dziecię osoba.

Prócz tych boleści, są ieszcze i położowe towarzyszące czyszczeniom, czyli iaśniey mówiąc odpływom krwistym, na których obfitość lub szczupłość mieć wypada baczność, aby pierwsze ile jest zaobfite z sił położnicę wstrzymać, iak znowu szczupło płynącym pomoc, na co się już dały pomagające szrodki w Cząstce trzecię Rozdziałku iszym. części iszcy. Płynienia takowe są następstwem zdrzaznionę macicy przez ię usiłowania wczasie pozbywania się płodu i mieysca, zawsze się te płynienia stosować powinny do wieku, temperamentu, częstości położów, prowadzonego życia, i od tych to okolicznosci zawisł nawet czas różny tychże czyszczeń, które po urodzeniu zwykły bywać krwiste, daley blednieć, krwiste uprowadzając z sobą zsiadłą krew przez dłuższy ię spoczynek zdziałaną, przyczem towarzyszyć zwykły boleści, a i te co do czułości i drażliwości stopni bywają mocniejsze lub słabsze, ustawać zwy-



kły po odéysciu zgęsnionéy krwi, do czego pomaga pić ciepłe kwiatu rumiankowego, ziela melissy. — Zdarzyć się jednak mogą choroby mniej lub więcej niebezpieczniejsze, którym podlegać zwykły położnice tem pewniéy, kiedy same się do nich przyczyniają, i o tych teraz mówić będziemy.

#### *O Febrze pokarmowéy.*

Wroździałku pierwszym częstce téżże części, lszéy. poradnika podane zostały przepisy do wczesnego piersi przygotowania, końcem uchronienia się od tylu dokuczających boleści, zapaleń ich i ropienia. — Tu znowu damy krótkie objaśnienie, że ta część ciała od natury na ten zamiar przeznaczona, aby wyciągniętą treść z pokarmów roślinnych zwierzęcych i napoiów powolę w sobie otrzymowała przysposobioną wtenczas nawet, kiedy jeszcze płód w swem pomieszkaniu bliskim jest toż opuścić, aby przyszedłszy na świat znalazł już dla siebie gotowy pokarm, ktoremu natura przeznaczyła na utrzymanie życia, dopóki rewolucye jego fizyczne nie wyprowadzą zębów, iakoż wtenczas daie poznać że odtąd już do twardszych posiłków żołądek dziecinny przyswajać należy. Przymioty téy cieczy, ile ta ma

być za zasadą zdrowia dziecięcia, wspieraia się prócz innych uwag, o których się wyżej mówiło, iedynie na pracujących natury usiłowaniach, żeby doskonałą trawność, przyswoienie w zwierzęcą ciekłość pokarmem zwałą działy, przyptyw zaś iéy, zrządzaia.

a.) Spólne skutkowanie maci y z piersiami za wpływem naczyń krwistych, i nerwów.

b.) Nadptływ krwi do piersi obliwający w pokarm.

c.) Mechaniczne iest drżaznienie brodawek przez ssanie dziecinne, powyższych dwóch spólnictw iest wypadkiem, że piersi w końcu brzmiennosci, lub też wkrótcekim zbyt czasie po rozwiązaniu, doznaia rozdętości, obrzmién, gdy te zwiększeni lub mnieyszymi przykrościami, a nieraz towarzyszą i przyptywaiącemu do piersi pokarmowi, że tenże zmusza piersiowe zawatki i naczynia pokarmowe do rozszerzenia się, z tąd też te cierpienia pochodzą, iakoż z téy to przyczyny powstaią cierpienia, wyprężenia i boleści rozchodzące się aż pod pachę, nieraz do piersi, z tąd nieraz przyłączaią się tęschności, gdy tem czasem powoli czyszczenia położowe ustaią, co tak i



w tęg. czynności potwierdza się owa zachodząca pomiędzy piersiami a macicą harmonia, tym czasem gdy dnia drugiego lub trzeciego wnet nader wolno, zaledwie przez przechodzący po ciele ziąbek, któren nawet przesypiają iedne, u innych drzeszcz a u innych znowu u nocne trzęsienia febryczne przy głowy bólu, kości, stawów, co oznacza napad febry pokarmową zwanę, iakoż od tąd nabiera pokarm swojego doskonałego zmięszania, przedtem bowiem był tylko ciekłością słodkawą, wodnistą, odosobnienie pokarmu w czasie tym, gdzie powyższa zmiana następuje, przekonać powinno iakiem iest ważnem tenże przeznaczeniem nie tylko dla nowo narodzonego, ale i dla samęj położnicy, co do ięg. ochrony się od innych cierpień, mianowicie zaś od tak niebezpiecznęg. febry popołogowęg, o któręj niżej mówić się będzie.

Febra ta pokarmowa żadnego leczenia nie potrzebuie, będąc dziełem usilniącey natury do wydzielenia i doskonalęgo pokarmu mięszania, należy iednak zachować się przy skromnęg. nierozgrzewaiącey zbytnie dyecie, iako

ko to: klęj zkas, z3cią lub 4. częsią lekkiego rosolu zmięszany, owoce gotowane są dostatecznem pokarmami, iak za napóy woda zogrzaną lub lekki rumianek, a nawet i nie obficie; aby pokarmu nie przybywało, tęg. więcej gdy tenże nie może być przez dziecię z potrzebowanym, ociągnięciem zaś tegoż dla drzazliwych brodawek dość często bywa bolesne.

Po ukończoném wydzielaniu w piersiach pokarmu, iako mięyscu dla niego przeznaczonym, aby tenże był zpotrzebowanym, iak niczem w swoim wydzieleniu nieuszkodzonym, odpowiada tenże wiadomemu powszechnie użytkowi, gdy przeciwnie matki niemogące z ważnych przyczyn karmić swe dzieci, iak i mniej ochlubny prawdziwęg. matki zaszczyt stojące, powinny wczesnie lekkie ich przyciśnienia czynić, przy szczuplęg. się zachować dyecie, a wystrzegać się zaziębnienia, aby nie mogacy być spotrzebowanym pokarm przez inne ziała drogi odpływał. Są przecie przyczyny, gdzie uszkodzone odosobnienie i wydzielenie pokarmu w piersiach może winnych częściach zrządzić choroby, a to tem niebezpieczniejsze im takowe w organach wewnętrznych zdarza się. — Nie będziemy się tu by-

Część II. 44



najmnięj wrozwiązanie sporu wdawać, czyli to być, lub jakim się to sposobem dźiać może, dosyć jest o tē m wiedzieć, że liczne doświadczenia nieraz i nader smutne o tē m nas przekonywają: przejdziemy zatem to wszystko, co w tēj mierze wiedzieć i iak sobie postąpić wypada, a tak.

Nayprzód że być może, iż wydzielanie pokarmu lubo się w stosunku do sił karmiącēy swemi piersiami matki, tenże za obfity, przez co matka wystawioną być może na utratę sił, wychudnienie ciała: przyczynami do tego być mogą, zaobfite w piersiach pokarmu wydzielanie, zbyt uczyna tychże piersi drzazliwość przez ssanie dziecięcia, zwiększona iak często powtarzana ich obwisłość, słabość, a do tego używanie pokarmów i napoiów, których natura żyźniąca zwykła pokarm pomnażać. Szrodki ku temu doradcze poniżey umieszczonemi będą.

Powtore: równie być może wada czyli niezdrowy pokarmu przymiot, to jest: albo ostrym kwaśnym, za żyźniącym, jeżeli te są tylko przypadkowemi, iak pochodzić mogącemi przez częste kwasnych, słonych, potraw używania, lub też i przez częste gniewy i t. p. skłonności, tē m szkodliwēy nałogi: pokarm takowy poprawionym być

może przez zupełną dyetty odmianę, to jest, gdzie są skłonności do gniewu, inniēy mięsney iak daleko więccy roślinnēy używać, zagęsty znowu pokarm obfitem pićiem rozrzedzać, i unikać mącznych wszelkiēy natury potraw, a co do gniewu lub innych namiętliwości i nalogów, pokarm takowy albo może być poprawionym przez unikanie ich, lub jeżeli to być nie może, wcale odstawić dziecię wypada, niżeli żeby miało znaleźć w pokarmie rozpoczętego życia koniec. — Jeżeli zaś pokarm bywa z ostrości matki cieków, i jakim być może skrofaliczna skorbutyczna i t. p. Takowe matki mocno grzeszą, karmiąc swe dziecię, o czē m się już w Iszēy częścī mówiło.

Szrodki ku temu tak są różnemi, iak są do tego przyczyny, potrzeba więc do nich, takowych używać, np. Jeżeli od obcisku piersi, takowego co prędczy zaniechać, iak na zaziębione piersi przykładac materacyki z kwiatu białego i rumiankowego drobno pokraianego, serwety często ogrzane, zachowywać piersi do powtór nego równie i nóg zaziębienia, gdy tē m czasem powściągnąć się od używania pokarmów żyźniących i napoiów rozgrzewających, przykładac bańki skłanne wprzód dobrze nad parą wody ogrzane



alboli też i ciepłą wodą zagrzane, na same brodawki, i to często dniem powtarzać należy, jeżeli znowu od nóg zamoczenia, takowe rozcierać chustą, przykładac bańki, a nóg moczenia zaniechać, równie iako i lekarstw laxujących nie używać, biegunki zaś przyłączające się wstrzymać przez szrodki, które się przy téj chorobie podały.

Co do szrodków dotyczących się pierwszych przyczyn, to jest, gdzie matka zaobfity ma pokarm, jeżeli to pochodzi przy dostatecznych siłach, że bynajmniej karmiącą matkę nie osłabia, może przy karmieniu pozostać: lubo i wtóm mieć trzeba wzgląd czyli dalej karmiąc tychże nie nadweręża: w takim razie dobrze się uczyni, gdy przy piersiach innemi posiłkami pokarmiać będzie, pokarmów takowych umieszczenie znajduje się wcząstce drugiey rozdziałku drugim części Iszély tego pisma. i to samo uczyni, jeżeli ta pokarmu nadobfitość od drzazliwości piersi pochodzi, i w tym przypadku dziecie do piersi nie tak często przystawiać, a samo pokarmiać, piersi zaś po karmieniu lekko obwiać, iako też i wstrzymać się od obfitego pokarmów używania, iako to: mięsnych, mącznych, tłustych, a przy roślinnych pozostać z dodatkiem trochę mięsa.

Jeżeli znowu taż obfitość pokarmu pochodzi za obwisłości piersi, wzmocniających miejscowo szrodków wymaga: tu służą materacyki z ziół pachniących, iako tb: melissy, miętkwi, lawendy kwiatu, macierzanki, rumianku, włoskiego kopru, które się z tych ziół znajdują, wzięwszy równe z nich części, pokrajać drobno, zmieszać i przykładac na piersi, a pod niemi nosić chuściczki w wałek uwite, do tego piersi zawsze wolno obcisnięte trzymać, parę razy na dzień wódkami, iako to: lewandową, kolońską, węgierską, lub i samą okowitą smarować: — Gdyby iednak wypadało z powodu wczasie słabości matki dziecie po krótkim pokarmieniu czasie od piersi odstawić, ostrzegam, aby z obcisnieniem piersi nader stopniowo postępować, i nie zarazem takowe uczynić, aby ta pokarmu obfitość nie osiadała na innych częściach tém szkodliwiej na wewnętrznych, iako to: płucach, z kąd łatwo kaszel suchy, ciągły, a w końcu i suchoty nastąpić mogą, równie się i w tenczas od pokarmów wstrzymać wypada, gdyby zaś ów pokarm miał zaiąć części powierzchowne, zrzadzić tychże zapalenie i ropienie, do opatrywania wezwać lekarza.



*O nadpływach czyli zbytecznych  
pologowych czyszczeniach.*

*(Fluxus lochiorum nimius)*

Nie mówi się tu o zwycajnym odpływie, któren być powinien zaraz po rozwiązaniu i odejściu miejsca, iak trwać zwolniejszym coraz od dnia 9. do 20. powszechniey, pochodząc z otwartych naczyń krwistych macicy: przeciw temu, ile jest umiarkowany iak pomagającym do ozdrowienia nie ma potrzeby używać szrodków na ich w trzymanie które mogłoby się stać nadarem dla położnicy niebezpiecznemi, iakoż dla téy to obawy ieszcze raz powtarzam przestrogę, aby ich w niczem nie uszkodzić, co się stać łatwo może przez zaziębienie, gniewy.

Jest tu tylko mowa o zbytecznych, dość często zdarzających się, a wyjąwszy przypadki, których są następstwem, iako to: zagwałtowne dziecięcia odebranie, za prędkie miejsca dobycie, powszechniejszemi zaś przyczynami bywają słabości i wolna i miękka częśći tych budowa, a przytem nędzne żywienie, lub też inużywanie pokarmów zbyt żywniących, napoiów rozgrzewających, zwłaszcza przy młodych, kwistych, drzazliwych. — Nieraz towarzyszą o-

mglenia, drgania stawów, sił opadzią ciała, błądźć prawie trupianna, a nawet i śmierć.

*Leczenie.*

Znaydnie się umieszczone przy febrze popologowey.

Szrodki tak lekarskie iako i dyetyczne przeciw zbytecznym płynieniom wniczem się nie różnią od podanych przeciw zbytecznym czyszczeniom miesięcznym, ale są umieszczone pomiędzy chorobami trefunkowemi, dokąd się odwołuję.

*O febrze popologowey,*

*(febris puerperarum.)*

Po rozwiązaniu, napada od dni 2, 3. aż do 12 14. w początku poczuwać się daie ziąb, drzescz; ból głowy, ckwłości, wymioty, osłabienie, poczem przystępuje gorączka, mały twardy i szybki puls, boleści żywota z obrzmieniem iego, pokarm i czyszczenia popologowe płyną nieuszkodzenie i zwykle, wnet bez porządku, wnet ustają, wnet powrócą. — Toż samo się okazuje zięzykiem, któren albo bywa zamulonym albo czystym, wnet suchym, wnet wilgotnym, toż samo się z drogami wyprowadzającemi dzieie, albo bywają u-



ryna i stolec wstrzymane, albolitéż zwykle po zagrancie ciała odchodzą, toż samo się ma i z febrы napadami, przyczynami téy febrы być mogą.

a.) Sam cięży stan, przy którym zwolna wprowadzie w swym początku ciśniony bywa żołądek, a co się w późniejszy cięży coraz bardziéy pomnaża, że trawienie pokarmów, tém bardziéy gdy takowe twardszёy są natury, być musi mniéy lub więcéy uszkodzone, z tąd się mnożą zamulenia w drogach pierwszych, to jest żołądku i kiszkaх, a nawet i odbyty stolcowe wstrzymanemi bywają: dodaemy do tego, że przez toż ciśnienie powolniéy daleko w całym żywocie krwi krążenie się odbywa, gęśnie, iak w naczyaniach swych wstrzymaną bywa, a z tąd iuż, iako i przez ciepło naturalne miejscowe, przybierać może do nabycia ostrości po rozwiązaniu szkodzić mogącéy.

b.) Używania trunków gorących, potraw korzennych u młodych, krwistych, drzazliwych, delikatnych.

c.) Zaniedbany ruch ciała.

d.) Nałogi i namiętności.

Znadmienionych tu przyczyn okazuje się, że za przygotowawczą do téy febrы uznać można, brzemienność i period rozwiązania, które robią tak znaczną w całym ciele odmianę, a przy tych nadewszystko wystawionemi są układ nerwowy, trzewia znajdujące się w wydrażeniu żywota, na wyprężaniu, drzaznieniu, przycisku, scisnieniu, a razem wszystko się rozszerza, od przycisku uwalnia, i wolne krwi krążenie w żywocie powraca, nieraz za nagle, gdy tych wypadkami są: odosobnienie pokarmu w przeznaczonych częściach, czyszczenia po rozwiązaniu, Przystawienia téy febrы popołogowёy, obojętne iéy wychody przekonać oraz i nauczyć powinny pleć kobiecą, iak wczesnie téyże febrы uniknąć jest wstanie, pełniąc przepisy które się nie winnym iak w tym zaniarze w rozdziałku i części Iszёy pisma tego w cząstce czwartёy dla nich podały.

Nadmienione wyżёy przyczyny w stanie brzemienności, a tém bardziéy sam rozwiązania peryod, stanowią owe chwile oczekujące tylko dość często i mniéy szkodliwego bodźca, a tém bardziéy mocniéjszego, np. gdzież użytemi bywają przy młodych, krwistych, drzazliwych, delikatnych, żółciowych położnicach tak zwane polewki poło-



źnic, lepięć byle zabóyczemi nazwać wypadło, lub i u tych, które powściągną się iak nie nasycić nie mogą od powróconego appetytu gdy tenże u wielu utraconym bywa w czasie brzemienności, przy której takż często wymioty towarzyszą, u niektórych znówu, które od samęj polraw woni iuż wymiotów doznają, lub téż ułatwych zbyt do gniewu, albo téż i z zaziębień, przez które to nader łatwo w tę febrę popaść mogą. Położnice oto macie obraz waszego położenia, od was to często zależy uniknąć niebezpieczeństwa, lub niebachne otwarcie się wczesnie: wystawić, macie ieszcze i tu nader ważne dla waszego własnego dobra przestrogi, mieycie takowena nieodstępny pamięci, abyście podobnego unikali losu, iaki niejednę spotkał, choć rodzenie pomyślnie się odbyło.

Febra w mowie będąca, daleko częściej pochodzi z zanieczyszczeń dróg pierwszych, rzadziej zapalny bywa natury, lubo być może z obojga złożoną, iak stać się może zgniłą w swym przebiegu, a lubo poznanie tych febrów połączeń nie iest tak łatwe przez cō się pomylić można, przynaymbyć główniejsze ich cechy dla zaradzenia umieszczę. — Nayprzód przy zanieczyszczeniu dróg pierw-

szych okazuje się zaflagmiony zamulony ięzyk, nudności, wstręt do pokarmów, niesmak ich i t. p. np. rosół, świeży kwaśny choć bez soli lub z ięć odrobina wszelako za słony, — przy tych iednak oznakach nie dać się uwieść, — że boleść żywota pomnażająca się mocno, za lekkie się iego dotykaniem, iakoby stan zapalający miał być przytomnym, kiedy pare enem nie raz takowe przypadłości szczęśliwie i pospiesznie znoszą, i całą obawę niszczą. — Inaczej się rzecz ma z oznakami przytomnego zapalenia, tam iusz bywa ból miejscowy, zakreślony, mocnym, pomnażającym się, równie iak i powyższy za przyciskiem chociaż i wolnym, lecz sam ten bywać zwykł w całym żywocie lubo nie wszędzie równym, gdy ten, iak się wymieniło, znayduie się w iednym tylko miejscu zakreślonym, do téj charakterystycznę póniekąd przypadłości łączą się nadto i następujące, iako to: puls albo bywa mocny, iakoby natężony, lub téż mały, tęschości, wielka niespokojność, bolesne tchnienie, odetchnienie, niezwyuczayny bystry wzrok albolitęz i słaby.

Do tych okoliczności i następujące są godne uwagi, iako to: uważać na stan ciała, czyli tenże iest z powiększo-



na, lub zmniejszoną siłą żywotną, na pory roku, na panujące choroby, na dyetę, na utrzymanie się przynależne lub zaniedbanie, w czem więc takowe zachodziło, na wstrzymanie stolca, odpływów pógowych, pokarmu odosobnienia, na biegunki, czyli te zmniejszając boleści lub pozbawiając z sił położnicę, na pościel, czyli ta jest porom roku dogodną, to jest latem nie okrywać pieczyzami, tylko miernie, aby położnica nie czuła zimna, ani też pomnożonego ciepła, na czystość, na umiarkowane ciepło nie zaś zagorące, na odświeżane lub nie powietrze w izbie położnic.

Po przedstawieniu téj choroby, ile się tylko dało uczynić w piśmie popularnym, przystępujemy do zaradzenia.

#### *Leczenie.*

Wspiera się na usunięciu przyczyn które wpływają do działania téj febrzy, przędziemy takowe wraz z podaniem pomagających środków.

Jeżeli pochodzi od wstrzymanych czyszczeń, użyć potrzeba rozmiękczaćcych enemów, z rumianku, słażu, oleju lnianego, masła, podług potrzeby, raz lub dwa dniem czynić sprycowania w pochwę maciczną z rumianku, słażu

na w pół z mlekiem, okładania żywota z tychże kwiatów i lnianego nasienia odwaru, maczając we czworo złożone chusty dobrze wyzionięte przed okładaniem, smarować maścią pod Nr. 21. co 3: godziny, nogi mocząc w wodzie ciepłej, do której można wsypać soli, brać pół kąpiele, to jest poza pępek, i to stosownie do przytomności boleści, żywota rozdęcia, iego wyprężałości, na które nader uważać należy, z powodu że przyczyny téj febrzy powiększają części w wydrążeniu żywota są zawartemi, powtarzać więc takowe półkąpiele raz dwa na dzień radzę, siedząc w nich od pół do 3. kwadransy, oprócz okładania żywota można czynić i na części rodne, pić rumianek, melisę, po filiżance iak herbatę lub i za napój, aby tylko nie za zimno, lecz dobrze zwolnione. — Do tych środków przydać się Nr. 30. a ile się mogłem o iego skuteczności przekonać, bądź to przy podwyższonych lub zmniejszonych siłach żywotnych, aby tylko nie zapóźno był użytym, nader rzadko mnie wskutekności zawadził, łagodne iego drażnienie przy rządzącym umiarkowanym chłodzić, przy opierającym się naprzeciw zgniliznie naturze, przy działaniu na naczynia krwiste: i inne ku temu potrzebne przymioty czynią piszą-



cego zniewolonym do iego w tym przypadku nader bezpiecznym użytku: jeżeli się przy téjże febrze przyłączało wstrzymanie stolca dodawałem do nięj mały kalabryny wybrany unców 2. 5. kazawszy ją na wolnym ogniu rozpuścić, przecedzić, i tymże sposobem używać dla pospieszniejszego skutku uwolnienia wstrzymanego stolca, w pomoc enęmy otwierające, przybierać zalecałem, i w tym przypadku skuteczność swą potwierdził.

Jeżeli znowu pochodzi od wstrzymanego do piersi pokarmu wydzielania, wypada często brodawki piersiowe drżać przykładaniem na nie bańek szklanych, naparzania całych piersi nad parą wolną odwaru z kwiatu rumiankowego, często dzieci do piersi przystawiać, okładać piersi maczanemi we czworo złożonemi chustami wodwazre powyższem a to wyzioniętmi i dobrze, końcem aby wstrzymany w swym do piersi pokarm przypływie, iako obca dla innych miéysc i części ciecz nie powiększała febry, gorączki a przytém i drżać takowe nieprzykladała się do ich zapalenia i ropienia, gdy te zawsze bywają niebezpieczne, im szlachetniejsze zajmuje organa np. płuca. — Gdyby znowu było zamiarem chorey już daléj z pamięci nie pokar

miać, nie spuszczać im prętszego tém pewniejszego poza granice ciała przez inne drogi pokarmu pozbycia się.

Na dopełnienie tego wskazania dwie tylko są drogi, stolec i organ skóry, przez pierwsze uwalniamy wstrzymane kiszek nieczystości, chociażby i te niebyły zadawnione, twarde, zawsze to czyniąc sprawujemy zarazem drżanie i wcześniach rodzeniu przeznaczonych, przez co dopomagamy, że i przez te części znaczną pokarmu cząstkę wraz z czyszczeniami, które coraz blednieć zwykły, uprowadzamy, ku temu szczególnie zalecam pomiędzy inne szrodki sól Glaubera na proszek tartą, co parę godzin od pół do całej drachmy, w dwóch łyżkach wody rozpysciwszy, wypić, i popić rumiankową herbatą, można też i na miéysce téj soli użyć tak zwanego (arcanum duplicatum) w téjże saméj ilości i czasie. Na ułatwienie znowu potów tak położnicom skutecznym służą częste picia kwiatu bżowego osłodzonego miodkiem, a gdyby ten szrodek miał za słabo na potów zrzadzanie skutkować, można użyć Nr. 8vo. lecz wtenczas wypuścić należy wchodzącą do iego mieszankę saletrę. Nic się tu obawiać nie potrzeba, gdyby tenże miał zarazem i wolne stolców odeyscie spro



wadzać, aby się tylko w biegunkę nie zamieniły, a ta słaby się mogła osłabiającą siłę, zwłaszcza u słabowitych położyć. Na przypadek gdyby te środki powolne nie miały dostatecznie skutkować, końcem wzmaganie potów, przystąpić radzę do użycia Nr. 10. co osobliwie służy przy konstytucjach słabych, wodnistych, flegmistycznych. — W użyciu tego środka co do jego brania i powiększania doży zachować wypada ostrożności.

1sza. Aby nie było gorąco w izbie, gdzie leży położnica.

2ga. Nieokrywać ię pierzynami.

3cia. Aby branie tego proszku miarkować nie tylko co do czasu, ale nawet i co do ilości jego tak oznaczonę, iako i powiększonę, aby przy użyciu tych środków nie wymuszać obfitych potów, a tem bardzięj ciągle ich wzbudzać, przez co pogorszyć można stan choroby, iako to: zrządzić zapalenie w częściach przez pológ zdrażnionych, a nad to i chorą z sił pozbawić, ponieważ z potami tak obfitymi zwykły uchodzić pierwiastki pożywne, tem więcéj, że w tym choroby stanie i tak szczupłe, lubo pożywne użytemi być posil.

posiłki mają, dosyć tu jest zrządzić poty umiarkowane, a i te aby były po całym ciele i jego częściach wszędzie równomi. Dodaję tu uwagę, którą powtarzam, aby w żaden sposób chorą na zaziębienie nie wystawiać. — zaledwieby wierzyć można bez doswiadczenia iak nagle zaziębienie przyczynić się może do zagłady życia położnicy. — Zprzestaniem tych potów nie można innę dać instrukcyi nad tą, aby uważać na stan symptomów, to jest na febrę, gorączkę, cierpien zwolnienia, wilgotność ięzyka, jego czystość, powrót do sił.

Jeżeli znowu do tęj febry przywiezuie się stołca wstrzymanie, postąpić wypada iak się wyżej nadmienilo, a na przypadek biegunki te znowu wstrzymać umiarkowanie nie nagle, wtenczas uważać potrzebą na stan sił, a do tego są już wskazane środki przy biegunkach umieszczone, i do tych cytelnika odsyłam. — Jeżeli znowu przytomnemi są zanieczyszczenia dróg pierwszych, oczyszczenie tychże nader bywa pomagającem, tu znowu służą, sól Glaubera (areanum duplicat.) iako wyżej i brać takowe aż do osiągnięcia istotnej potrzeby, to jest, aby, jeżeli są przytomnemi nudność, cikliwość, utra-



cenie appetytu, wstręt do iedzenia, nie-smak w pokarmach i napoiach, a do tego mulastość, flegmistość ięzyka, skoro się zmiana w tych wszystkich znamionach wcześci przedstawia, nie czekając ich zupełnego ustania poprzestac, resztę natury usłowaniu zostawic. Nadmienilem wyżey, że się lubo rzadzię przyłącza zapalenie organów w wydrążeniu żywota, tem bardzię wspolnictwem blizkiem z częściami do zapłodzenia przeznaczonemi, lub też i tychże samych, podalem<sup>o</sup> nieco wyżey istotliwszē iego cechy. — W tym znowu przypadku dwoiaki stan ciała mieć potrzeba na uwadze, z tych iest pierwszy z podwyższeniem siły żywotniēy, iakoż towarzyszyć on<sup>o</sup> powiększēy części zwykł osobom młodym, krwistym, do brze żywionym, używającym potraw korzennych, mięsnych, napoiów rozgrzewających. W tym to stanie okazują się boleści bardzię dokuczające, bystrość wzroku, ostrzēysza febra, gorączka, ciało<sup>o</sup> suche, puls silniēyszy, pełny, twardy, pospieszny, bardzię unoszący się pod palcami.

#### Utrzymanie się.

W tym stanie potrzebnemi są chłodzące pokarmy, leki, iako to: sztucz: mleka, woda z grzanką osłodzona miodkiem o-

etowym, odwar kwaśnicy, sok ięzy zwodą za napóy tēyże natury i posiłki, iako to: owoce gotowane, kleie z kasz, same lub z  $\frac{1}{4}$  częścią rosółu z drożdzu, użyć także rozpuszczenia żółta, tu wyżey nadmienionego, bez dodatku mанны lub też i z dodatkiem, gdyby wypadała potrzeba, przy użyciu tych szrodków i wolne zrzadzić stolce, tem bezpieczniey, kiedy się okaże przytomność zanieczyszczeń dróg pierwszych, a tych cechy powyżey unieszczonemi zostały, i tu z niemalym skutkiem służą półkąpiele wolne, 2. 3. razy na dzień od pół do 3. kwadransy; nie można także przepomniec o smarowaniu miēysca dolegającego Nr. 21. a gdyby przecie boleści w ustępie swym upartemi być się okazały, na to miejsce przyłożyć ciasto Nr. 18.

Drugi stan z pomnięszoną siłą żywotną: ten się z charakterystycznych znaków poznać, ile te wpisanie takowym położonemi być mogą, iako to: puls mały, szczupły, przy twardości iego, powiększający się sił opad, małaczenia ciche, wzroku słabość, żywota odętość znaczniēysza, w postępie tēy choroby przywięzują się mimowolne stolce i uryny odchody, dość często prędzę w piersiach ginie pokarm niż w po-



wyższym stanie, toż samo się dzieje i zczyszczeniami popołogowemi.

#### Szrodki lekarskie.

Z leków tu służą wzmacniające siły żywotnie, iako to: Nr. 9. który można brać razy dwa, zwłaszcza gdzie czyszczenia są wstrzymane, smarowania żywota, do czego służy maść Nr. 1, okładania żywota zziół, iako to: ozanki, czosnaku, mięty, melissy, kwiatu chmielu, macierzanki, lawendy, które się z nich pod ręką znajdują, przykładac można też na żywot ciasto Nr. 18. pokarmu w tym stanie powinny być daleko silniysze, rozgrzewające, tu więc rosół, aby nie były tłuste, korzenne, mięsa wołowego, polewki z wina zpotową, wody gdzie znaczniejszy sił opad, gdzie tego niema przypadku, ztrzęcią częścią wina, samo nawet wino, osobliwie kwaskowe, po lyżce 3. 4. razy na dzień dawać, za napój woda z grzanką z 3. lub 4. częścią wina, a gdzie nie stać na wino, lyżkę wódki, okowitki, dobieranki, miodu pitego po lyżce, jeżeli biegunki nie zrzadza. Jeżeliby stolec był wstrzymany, dąć enemy, wszelako uważać, aby enemy niedawać w czasie potów, ani drżających, a to dla nieurządzenia kilku stolców, przez co by się słabość pomnożyła, dosyć na

nie przeznaczyć odwar z kaszy ięczmienney, otrąb żytnich, nieco soli, albo masła słonego, albo i olej lniały.

Pod opisaniu wszystkich szczegółów, które tylko mogły być w poradniku na domowy użytek umieszczonemi, równie iak i opis różnicy stosownych leków, diety i innych ostrożności, pominiam wiele szrodków, których użycie mogłoby być szkodliwem, iak wrękach znawców pomocne, miałem sobie za obowiązek podać leki pojedyncze, a których skutki mogą być użytecznemi.

Przy ukończeniu tej febry ieszcze raz powtarzam upominki dla zbliżających się ku rozwiązaniu, końcem uniknięcia iey, żeby się nadewszystko w ostatnich dniach wystrzegać wszelkich gniewów i t. p. i to też zachowywały nader ściśle w czasie rozwiązania i po nim ieszcze, równie żeby potraw twardszych do strawienia używać się strzegły, żeby na uwolnienie się od stolców brały enemy i kąpiele, słowem żeby tych wszystkich przyczyn które, się do téjże febry wzniecenia przyłożyć mogą, unikały.

Trafiają się i inne powierzchowne choroby popołogowe np. zatrzymanie pokarmu przy czém następuje obrzmienie zawłków piersiowych, zapalenia



tychże, lecz że o tych już się i w pierwszej i drugiej części przy materii chorób położowych i popołożowych dość obszernie mówiło, powtarzanie nie jest potrzebnem.

### [1] *Koniec Roździałku Czwartego.*

## ROZDZIAŁEK V.

*O chorobach nagłego ratunku potrzebujących, narzędziach wraz z ich użyciami do niego służącemi.*

**C**horoby, którym Roździałek ten jest przeznaczony, być mogą wypadkami następujących przyczyn, z tych porządku są.

*Pierwsze:* temperament Hypokondryczny, Melancholichny dalej to wszystko, co uchodzi z granic rozsądku, tu należą, kochania przetężone, strata majątku, niedopięta duma, zbiorów niedosyt, uległość trunkóm, troski, żale, smutki, nędze i t. p.

*Drugie przyczyny* nazwać można Mechanicznemi, a temi są uderzenia silne w miejsca szlachetne, iakiemi są głowa, piersi, żywot, części do zapłodzeń przeznaczonych, naruszenia ich w iakikolwiek sposób, aby tylko były gwałtownemi.

*Trzecie i czwarte przyczyny* chemiczno fizyczne, do nich należą wy-



ziewy odurzające, np. piwnice, gdzie robią piwa, wonność, więzienia, głębokości podziemne, zagorzenia, utonięcia, powieszzenia, od piorunów uderzenia.

Chemiczne zaś podzielić można na opalające, przedrżazniające i gryzące. Do pierwszych należą rośliny zjadliwe, chociaż ich niemity odor i wcale się od ogrodowych, sianych, różniący poznawać daie, i te, których owoce czynią ponętę do użycia nieszczęśliwego, lepićby jednak było dać ich poznanie charakterystyczne, lecz na to myśl już nieco wyżej podalem, a tu ją powtarzam: żeby było arcy zbawienną rzeczą, aby się z ich poznawaniem Systematycznym trudnili parafialni nauczyciele, iakoż wymaga tego potrzeba gdzieś dzieci chodzące po polach, lasach, borach częścię daleko temu nieszczęściu podlegając, iak po miastach, lub i po ogrodach znajdujące się takowey natury rośliny, krzewy, nie zupełnie ich od tychże zdarzeń ocalaia. — Tu także należą trucizny, iako to: arsenik, biały i żółty, kobold a najczęściej naczynia miedziane kuchenne nie po bielane, lub też i gliniane polewane, byłoby arcy zbawienną ustawą zupełnie znieść użytek takowych polewań, głębokości podziemne, do których olów lub cyna wchodzi, te przeciw w potra-

wach kwaśney natury lub i tych, które latem przez trzymanie ich w takowych naczyniach mogą być w części rozpuszczone, co nieraz doysdź trudno przy czyny tylu wychudnień ciała, boleści żołądka ciągłych i t. p. chorób, polewę takową dla trwałości naczyń, iak zabezpieczenia zdrowia, zastąpić mogą piasek miałki dobrze opłókaný, wysuszony, z dodatkiem równey części potażu czyszczonego, i z tą mięszaniną tak sobie postąpić iak czynić zwykli używaną dotąd polewą garniarze.

Przedstawwszy porządek tych przyczyn, które za naypospoliczszé osądziłem, postępuję do głównych zasad zastosowanych do tychże, końcem ratunku nieszczęśliwych, którzy się stali tych przyczyn ofiarą.

#### *Zasady ogólniejsze do ratowania nieszczęśliwych są następujące.*

*Pierwsza* ażeby z użyciem szkodliwych nie być za prędkim ani też nieostrożnym, nie poddawać się zaleknienu, przerażeniu, co nieraz opóźnić może przyzwoity ratunek, iak uczynić tenże szkodliwym, nie dać się zatem uwodzić zwyczajom dotąd nagany godnym, iako to: stawiania na głowy nieszczęśliwych, ciągnięcia za członki, wstrząsania ich ciałami, taczania na beczkach,



*Druga:* nieraz wypada wczasie ratowania ciągłego dać ciału wypocząć, a przynajmniej użyć szrodków mocniejszych zamienić na słabsze, i na powrót pierwszych użyć.

*Trzecia:* nadpotrzebny liczby do ratowania ludzi nie cierpieć, ci więcej przeszkadza jak pomaga. Szczęściem jest podostatkiem, aby ci tylko dopilnować umieli, co im się rozkazuje:

*Czwarta:* nie trzeba się odstręczać od kilku a nawet i kilkunastu godzinnego bezskutecznego ratunku, były przykłady że na końcu tego czasu się okazywały znaki lubo słabe powracającego życia.

*Piąta:* mieć pod ręką szrodki lekarskie, narzędzia ratunkowe i te porządkiem utrzymywać, aby ich użyć można, gdzie i iaka ich potrzeba zachodzi.

*Szosta:* niedopuszczać, aby miéysce, gdzie się ratuje nieszczęśliwego, nie było ludźmi napelnione, a to dla nieczyszczenia powietrza przez wyiewy płuc, skórne parowania, prócz innych odchodów, owszem te miéysca być powinny ile tylko można czyste, dość zatem będzie dostateczna liczba osób pod zasadą 3. umieszczona, zaledwieby uwierzyć można, że się nieraz bez dostrzeżenia przytrafia, iż wielość

ludzi wniwecz ohraca najdzielniejsze szrodki. Toż się ma rozumieć o miéyscu ratunkowym, aby nie było przewiewu powietrza, ani też gorąco, nagła przemiana nadpotrzebnego ciepła stać się może nader szkodliwą.

### *O znakach prawdziwej śmierci.*

Jedne tylko znaki rozpoczynające się zgnilizny ią zapewniają, iakoż przy niej, dostrzeganemi bywają rozkładność żywota tu i owdzie, sino niebieskawe, zielonawe, plamy, mięsne części zdaiać się być obwisłe, z nosa, z ust wydobywa się materya cuchnąca, trupianina, iabłko oka scisnione, zostawiające po sobie dółkowatość: oznaki te upewniające śmierć prawdziwą mogą przędzć późniéj następować, nie raz dopiero po 4. aż do 6go dnia się okazują. Następujące znowu, iako to: zupełne pulsów ustania, wrękach, nogach, czołach, ziąb równający się kruszczom, głazom, stężalość członków, zupełne tchu ustanie, obwisłość szczęki, skłaniane niby oczy, niebieskawe po ciele plamy, nieczułość członków, obwisnienie miękkich części, otwartość stolcowej kiszki, wszystkie te i t. p. oznaki, mogą być wpozorny tylko śmierci, a zatem i przerwą działań żywotnych oznakami, a o ukryciu ich, powolnym po-



wrócie, następujące doskonalej nas przekonać powinny.

*Oznaki utraconego czyli zatrzymanego i powracającego życia*

Są następujące, iako to:

- a.) Kiedy się choć najmniejszy ruch w częściach muszkularnych okazuje np. wzruszenie nia którejkolwiek części twarzy.
- b.) Kiedy się tęcza oka na przybliżenie światła sciska.
- c.) Kiedy ciepło około serca niewolnie.
- d.) Trzymając świecę lub pierze przed ustami, też się poruszają, lub postawiwszy szklankę z wodą na piersiach, gdy ta ruch chociażby i mały okazuje, można zatem być pewnym, że chociaż iskierka życia przecie jeszcze jest przytomne.
- e.) Kiedy się nader pomalu ta lub owa powieka unosi, a lice po téj lub owéj stronie chociaż na bardzo krótką chwilę się zarumieniają, lub z otwartéj żyły krew zaczyna płynąć.
- f.) Krzycząc w ucho nieszczęśliwemu, kiedy tenże w twarzy lub innych członkach iakowé poruszenie okazuje,

- g.) Kiedy cisnąć oczy palcami, lubo zostawiają takowe posobie ciśnienie dolkowatości, wszelako też na nowo się wypełniają.

*Powszechnieratowania szkodki.*

- 1<sup>mo</sup> Nacierać ciało sukrem lub innemi bawełniastemi płótnami, trzeczszcotkami, a naostatek konopiami, słomą startą, siano lub i samą ręką, którekolwiek z położonych tu rzeczy wprzód ogrzać potrzeba, lub i nad dymem ziałowcu przekadzać, co iednak wżbie, gdzie złożone ciało, nie czynić — Tarcie to początkowo wolno czynić i wprawdzie od nóg aż do kaptuba, coraz mocniéj, pokąd ciepło ciała nie nastąpi, wezasie nacierania nie przepominać także czynić lekkich biciów pogrzbicie, iako i na przemian rozcierać ręce, nogi, uda, żywot, piersi, a nawet i grzbiet, podpiętki.
- 2<sup>do</sup> Do nacierania powyżéj nadmienione rzeczy można także skrapiać wódką, octem kamforowym, spirytusem, wódkami pachnącemi, co się z nich pod ręką znajduje, lecz nie bardzo wilgotne.
- 3<sup>to</sup> Po nacieraniu przez czas nieiaki położone ciało pół dłoni grubo cie-



pływ piaskiem, popiołem, solą,  
 opsytać, a naostatek w ciepły gnój  
 prócz głowy włożyć. Gdzie jest  
 sposobność włożyć całe ciało do  
 wanny lub koryta, wdobrze ogrza-  
 ną wodę, i w tychże kąpielach mo-  
 że godzin kilka leżeć ciało, mieć  
 jednak wzgląd, aby niezastrygało,  
 co dostrzeżesz, natychmiast o no-  
 we ogrzanie starać się należy, że-  
 by te były pod ręką. Lecz kładąc cia-  
 ło do kąpieli, najprzód nogi, pó-  
 źnię ciało aż do szyi, a wtenczas i  
 uszy wolnemi od wody pozostać  
 muszą, w wannie téy nie przepo-  
 mnieć o rozcieraniu ciała. Na ten  
 kąpiel zamiar, gdzie troskliwie u-  
 rządzenia ratowania nieszczęśli-  
 wych wprowadzone, i utrzymanie  
 są wanny kosztowne w pra-  
 wdzie, — lecz rząd czuły ożycie  
 podległych sobie mnię stoi o na-  
 kład, narzędzie to jest iak skrzy-  
 nia, czyli ogrzewająca wszędzie ca-  
 łe ciało wanna, dwie strony wy-  
 sokie a trzecia podłoga z blachy  
 miedziannę, jest na dwóch nóż-  
 kach drewniannych, w których wy-  
 cięcie na téż skrzynię znajdować  
 się ma, aby się nie mogła usunąć, iak  
 może być i zmięysca ruszoną za  
 pomocą przymocowanych uszek,

w wannie téy, czyli do ogrzewania  
 ciała służący skrzyni, znajdzie się  
 druga na pół cala: do koła węż-  
 sza iak pierwszą, dno zaś téż  
 może spoczywać na podstawkach  
 na pół cala wyższych od dna pier-  
 wszej wanny, przestrzeń ta po-  
 między wanną i wanienką służy  
 do napełnienia wodą dobrze za-  
 grzaną, i od spodu i od wszystkich  
 boków ma być niższą na cali dwa  
 od pierwszej, opatrzona ze wszyst-  
 kich stron brzegami blachy, aby  
 się do nię woda nie mogła dostać,  
 gdyby ię wiele nalano, a czego  
 bynaimnię niepotrzeba, ponie-  
 waż para wody dobrze grzanej  
 jest wstanie ze wszystkich stron  
 drugą wannę wraz z znajdującym  
 się na ię dnie siennikiem, i cia-  
 ło na nim spoczywające, zagrząć,  
 nie potrzeba zatem i tyle grzać  
 wody, dość jest garcy 2. lub 3.  
 do napełnienia téy przestrzeni po-  
 między dwoma temi wannami  
 znajdujący się, co zwykło się czy-  
 nić przez dwa lęki, do pierwszej  
 wanny tak przymocowanych, aby  
 woda spływać mogła, dwa jest  
 tych lęków, ieden w głowach,  
 w nogach drugi, żeby zaś nie ula-  
 tywała para wody przy każdym



z tych lęków znajduie się ma-  
leńki czop do zatkania, w nogach  
zaś jest rurka z kurkiem, tak dla  
zupełnego wody ostygłej wypusz-  
czenia, lub też i na przypadek, gdy-  
by potrzeba wypadła powiercić  
wodę ostygłą wypuścić. Nad-  
to wanna ta pierwsza służyć może,  
gdyby ciało przeznaczone było do  
kąpieli wodnój, ale w ten czas glo-  
wę całą położyć wypada, na wy-  
sokim stoleczku, aby woda do u-  
szów i ust niedoszła. Ten jest o-  
pis wanny zastępującej ogrzanie  
ciała przez ciepły piasek i inne  
szrodki na wstępie tego numeru  
umieszczone, aby z tego lub owe-  
go szrodka można w przypadku  
korzystać.

4<sup>o</sup> Na dół serca ogrzane płaty su-  
kna, flanelę, kuczbaie przyłożyć,  
toż samo uczynić i pod pięty, a o-  
grzane welniane rzeczy, takż od-  
mieniałe często, pod pachy; na ser-  
ce, pochwiny, części wstydlive  
przykładać, wszelako o ich ogrza-  
nie starać się należy.

5<sup>o</sup> Krwi upuszczenie także jest dziel-  
nym szrodkiem ratowania nies-  
częśliwych, bez znawcy jednak,  
którenby, nawet do okoliczności  
nie tylko zwyczajnych miejsc ale

na

nawet i szyi mógł tę operacyą  
przedsięwziąć i ilość upuścić mia-  
nej krwi oznaczyć, czynić nie ra-  
dę, miejsca te do krwi puszcza-  
nia wprzód dobrze nacierać lub na  
nie wdobrze ciepłej wodzie nama-  
czane chusty przykładac, otwar-  
cie samo powinno być szerokie, a  
na przypadek, gdyby krew płynąć  
nie miała, wszelako należy przecięte  
miejsce zwyczajnie obwiązać a to  
dla uniknienia krwi płynienia zby-  
tecznego, i znówu gdyby płynęła,  
zawiele iey zarazem nie upusz-  
czać dla nieuzasadnienia osłabień  
szkodliwych.

6<sup>o</sup> Obok różności zdania z których  
jedne są za użytecznością, drugie  
za uszkodzeniem dmuchania po-  
wietrza wusta, iestem za użyt-  
kiem iego, zachowując przytem  
następujące warunki.

Niedopuszczac, aby toż powietrze  
miało być czynioném przez usta ratują-  
cego, powietrze takowe z płuc, gdyby  
też i od zupełnie zdrowego człowieka,  
jest inż przez się zepsutém, tém go-  
rzej od niezdrowego daleko więcéy  
ma mocy uduszaiącej, otwarcie wię-  
cey szkodzić niż pomoc może, chociaż  
też powietrze w tém ratowaniu uwa-

Część II.

46



zać należy za właściwy dla płuc i dla wzbudzenia ich czynności bodziec, do tego zarapłowne wpuszczanie z ust powietrza nie zrządzi, pomysłnego skutku, działając za nagle, bardziej się przy czynić może do przywrócić się mogącego płuc działania przez wpuszczanie powietrza sposobem niżey tu podanyin, wczym się bezpieczniey postąpi używając mieszka Ta: 4. fig: 10. opis tego przy Rycinach się poda, tu tylko o niego użyciu jest mowa, że równie potrzebna jest ostrożność, aby i tym narzędziem powolęy wpuszczać powietrze chociaż czyste, lecz gdyby też i na przypadek mieć go na pręde nie można, równie pomocniejszy jest do tego zamiaru atmosferyczne powietrze, niż z ust choć najzdrowszego człowieka wpuszczane, mieszka użycie jest odpowiadające iak najsukuteczney przeznaczeniu, to jest: wyciąga on zepsute, iakie przez przypadek zatonięcia uduszenia wstrzymuje się w płucach powietrze, gdy za mechanizmem drugiey tegoż samego mieszka części dostać się być to atmosferyczne powietrze bądź też gdzie być może i kwasoród, którym wprzód ową mieszka połowę wcale do wyciągnięcia wstrzymanego w płucach powietrza, nie należąca, nadąć z pęcherza do niego przy-

mocowanego należy, lepięcy się to poznać przy opisie tego mieszka.

Wpuszczanie to powietrza beżpieczniey się uczyni wprzód przez nos następującym sposobem, wsadziwszy pierwey rurkę od mieszka wieden otwór nosa, potrzeba aby się osoba do ratowania użyta przy głowie znaydowała, obowiązkiem iey być powinno wsadzić w którenkolwiek otwór nosa nakrzywioną rogową rurkę palcem wskazującym iedney ręki, takową mocno przyciskać a zarazem, drugi otwór, nosa wraz z ustami tak środkowym palcem iako i innemi téż samę ręką a to końcem żeby prócz powietrza w miechu inne nie wpływało. Drugą znowu ręką powolęy cisnie się iabłko Adama w górze powietrznego kanału znaydującego się, tak pospolicie ugryzkiem Adamowym zwane, a to żeby powietrze nie mogło do żołądka dochodzić. Drugiego pomocnika obowiązkiem być powinno, żeby za pomocą tegoż mieszka zwolna powietrze z niego do rurki, zniey do ust gdyż i te otworzyć wypada aby powietrze będące w płucach pozostałe, z nich ustąpiło. Jeżeli się zaś znaydzie mieszek zwyczajny, i znim toż samo uczynić wypada, a gdzieby podwóyny wszystko to wykonać należy, co się tu względem palcy i rąk mówiło, oprócz



że ust otwierać nie potrzeba, ponieważ iak się wyżej podało, a przy opisie tegoż mieszka doskonały się jego mechanizm wraz zużytkiem pozna, pozna się też zarazem i przedział tego podwójnego mieszka, nie mając żadnego pomiędzy sobą związku, iednakowo przedział wyciąga zepsute w płucach powietrze, gdy za tymże samym mechanizmem część druga mieszka wydęta atmosferyczném lub też gazem kwasorodnem toż powietrze lub nadmieniony gaz wciska w płuca jego mechaniczne, i wtenczas zniemałym skutkiem zwolna część przednią piersi cisnąć można, ażeby i przez ten szrodek dzielnięć czynność płuc wzbudzić można. Teraz idę do dalszych ratowania szrodków powszechnych.

<sup>7<sup>mo</sup></sup> Do powszechnych ratowania szrodków należy i dawanie enem dymnych z tytoniu, jeżeli niema, iak być powinno stosownie do umieszczoney w téj materji tu myśli, takowego narzędzia, które się znajduje w rycinach na tablicy 4tęj figurze 11. i téj się opis ile być może przy objaśnieniu poda, wmieyscu ięć można użyć albo rurki drewnianej, rogowej, którą przed wsadzeniem w stolcową kieszkę, oliwą, olejem, lub inną ia-

ka się pod ręką znajduie tłustością nasmarować. Na drugim téjże rurki końcu znajdować się ma przymocowana lulka zapalonym tytoniem napełniona, która się już od wierzchu znacznie wytliła dla przykrycia otworu lulki płatuszkiem, aby przez niego silnięć dym z lulki do kiszki stolcowej dąć można, atoli i przy téj czynności, przerwy zpaddingiem tłącego się tytoniu dymem i jego wkiszki dęciem, czynić potrzeba, iakoteż i zbaczności nie spuszczać, aby dym niebył gorącym lub też i iskra do stolcowej kiszki nie dostała się, lecz wczasie tym nacierać cały żywot wypada, iako i powolęć przy nacieraniu cisnąć tenże. Na przypadek zaś niemożności dania enem dymowej z tytoniu, zwykłą do tego seręgą takowe uskutecznić z odgotowania tytoniu np. łyżkę pełną na półkwary wody przecedzonego, gdzieby niebyło tytoniu na takowe enem, można przeznaczyć po dostatkiem soli kuchennej, w wodzie ciepłej dobrze rozpuszczonej np. łyżkę iedną na kwaterek wody a w końcu i samę wódkę.



8<sup>o</sup> Takż z wielkim skutkiem należą i szrodki wzbudzające wymioty, jeżeli ratunku tego potrzebujący nie jest w stanie nic z ciekących polykać rzeczy, wtenczas czynić wypadła lechtania wgardzieli za pomocą piórka, palca, wprzód woleiu, oliwie umaczanych, w tenże sam czas małe uderzenia w okolice dołka sercowego, grzbietu czynić należy, takż wnieść ciało wgórę z zwieszoną naprzód głową, lub też i na bok całe ciało przewrócić. Gdyby jednak mógł jeszcze nieco polykać, można mocne rozpuszczenie kamienia winnego, antymonowego (*tartarus emeticus* v *stibiatus*) po łyżce dawać, np. wziąć tego ziarek pieprzu 3. do 10. na półkwaterek wody, na ten sam zamiar lub i inne potrzeby umieszczonym będzie w apteczce domowey, lubo się już na doży podzieloney wraz z octem winnym, winem słodkim, rozciekiem ammonij wodnym, wyskokiem siarczanno eterycznym, tytuniem, szczotkami, olejem lniałym, lub oliwą, narzędziami do krwi puszczenia, sypialną suknią z kuczbai wraz z innemi narzędziami w rycinach umieszczonemi w skrzyni ratunkowey znajdować

się powinny. Za nim do szczególnych chorób nagłego ratowania przystąpić, unieścić tu przestrożę muszę, że jeżeli nieszczęśliwy nie mógłby wcale polykać żadney ciekłości, w usta wlewać się nie powinno, a to dla uniknienia przyczynić się mogącego duszenia.

9<sup>o</sup> Można takż i użyć szrodków ratowniczych przez kichanie, a to zrządnąć się dać przez lechtanie piórkami w wydrążeniach nosowych, lub też namoczonym wrocieku ammonii wodnym lub trzymanie przed nosem solanu ammonii ulotney (*sal amoni volatile*), octu winnego mocnego, rożerznietey cebuli, tegiego chrzanu, tłuczoney świeżo gorczycy, tabaki, pieprzu, imbieru, korzenia ciemierzycy lub też i zrządnąć lechtania w wydrążeniach nosowych rozdartem piórem. Tu tylko przy użytku ulotnych rzeczy, bądź to do umaczania w nich piór, bądź do trzymania ich pod nosem, dać tę potrzebną przestrożę, aby gdy twarz jest siłą, obrzmiałą, co oznacza popęd krwi do głowy wstrzymaney, takowych nigdy nie używać, iak dobrze służą, gdzie jest przytomną bladeść twarzy, użyć daleko sku-



teczeńny można przy pierwszym przypadku, to jest, gdzie jest twarz sina obrziniąta, octu winnego, nie czynić zaś wzbudzania przez powyższe, ulotne, drżazniące szrodki, a przynajmniej przy okazywanych się życia oznakach natychmiast poprzestać, i wtenczas ocet winny stać się nader pomagającym szrodkiem.

10<sup>mo</sup> Do szrodków ratowniczych i narzędzi do tego wnowych czasach dądać i umieścić starano się galwaniczny lub elektryczny aparat, ile tylko zdanie moje otworzyć onim winien iestem, a to bez żadnego zaprzeczenia tak dzielnego skutkowania z zbyteczności względu upatruję. Raz że toż zupełnie może zastąpić zimna woda zdoswiadczeń własnych i obcych, gdzie tylko życie jeszcze przywróconem być może, miejsce aparatów budwóch zastąpić iest w stanie, o użyciu zaś tego szrodka mówić się będzie pod tąż liczbą. Powtóre, że iey wszędzie dostać można, a to bez żadnego ambarasu, w każdéj porze Roku, chociażby i w najgorętsze upały, dodawszy do zacieplonéj wody przez samo stanie w czasie iey używania, soli, saletry, a gdzie

być jeszcze może i salmoniaku przez te rzeczy doprowadzić iey ziąb do stopnia zamrożonéj przez uymę od niéy znacznego stopnia ciepłiku można, dodamy do téj uwagi że do użycia tego aparatu mieć potrzeba znającego się, októrego iest trudno, nadto drogosc wrabywaniu, ciężaru pomnożenie wprzeniesieniu na miejsce potrzeby skrzynki ratunkowéy. Użycie zaś wody iest takowe, że gdzie niema umyślnego do tego narzędzia, aby tylko kroplami spadać mogła ze stopniowéy wysokości, miejsce tego zastąpić może rurka od dzbanuszka, lub też i leiek, októren w domu żadnym nietrudno.

Dla urządzenia spadku kroplami wody z tych domowych narzędzi postąpi się następującym sposobem. Rurki otwory że są zawsze obszerniejsze, przez któreby spadek kropli wody utrudniało trzymającą oneż osobę, można słomą, bawełną, sukniem, sianem, lnem, konopiami przytkać, i zwięzać ie nader łatwo, przez też rzeczy kroplami większemi, lub mniejszemi sącząc się, spadać będzie woda nalana wto lub owo narzędzie, tak urządzone narzędzie wodą do półowy nalane, aby przez ciężar trzymającego ręce nie tak łatwo



omdlewały. Nayprzód spuszczać też wodę z wysokości łokci dwóch od ciała, a puściwszy kropli kilkadziesiąt zaraz spadającą wodę dłońmi rozcierać, a nawet i osuszać ciepłymi chustami, po każdym puszczeniu przerwę czynić wypada, rozpocząć też wody kroplami puszczenie na dołek sercowy, co wszystko w opisanym tu sposobie bez uprzykrzenia czynić wypada, powiększając wysokość iaką tylko nieyscowość dozwala, włączając na stolki, stoliki, w tedy jest tego szrodku użycie, a te się zawsze skuteczniejszém okazało niż skrapianie wodą ciała.

11<sup>mo</sup> Na wszelki przypadek do szrodków ratowczych użytymi być powinny i następujące, iako to wporze odpowiednię bicia ciała pokrzywami, pręcikami cienkimi, różgami, spinek podpięty, za paznokcie ukłuwanie, bańki suche, lub nacinane, tarcia wolne flanelą, kuczbaią, bielizną części wstydlwych, puszczenia oleiu gorącego na nogi, ręce, udę, nakoniec palenia rozpaloném drótem, przykładania masy z gorczycy lub domowego zmuch hiszpańskich plastru, na rękach, udach, łytkach, na przemian.

12<sup>mo</sup> Po nastąpieniem szczęśliwie do życia przywrócenia nader ostrożnie z ożywionym postąpić należy, usunąć to wszystko, co tylko iego powrócone aczkolwiek szczupłe siły osłabiać może, aby ich strata na zawsze nieprzystąpiła, poznawszy zaś oznaki powracającego życia, które się wyżej umieścily, potrzeba udzielić ostrożności a temi są:

a.) Posiłki ciekącey natury iako to: rosół ciepły, wina, miód, piwa wystać; zwolnione, wódki po łyżce od kawy kropli 15. do 20. wyskoku siarczanno eterycznego w łyżce wody, co się z nich wdomu znayduie, zakrapiać naparzeniem mięty, melissy, herbatą. Co się zaś dotyczy zasilań tu nadmienionych postąpić nader ostrożnie wypada zniemi, aby nie w ilości ich, a tem bardzię mieszaniiny nie czynić, naylepię i naybezpieczniey się uczyni, kiedy łyżek parę rosółu da się wypić, a po przerwie pół godziny albo danie rosółu powtórzyć, lub i którego zwijn po łyżce, co się może i z miodem uczynić, iak z innemi mocnemi wyskokami w malę nader ilości, a gdzie ieszcze jest przytomną siność twarzy,



obrzymiałość, wcale nie dawać, iak udzielonemi bezpiecznicy daleko być mogą wilości umiarkowaney, gdzie siły są za szczupłe, gdzie bladeść twarzy, wzrok słaby, postępując więc z temi środkami w miarę sił, które tylko dorozumieniu bardziy przytomnym zostawia się, niżeli opisem zajęte być, przystępujemy dalej.

b.) Niedopuszczać rozmawiania żadnego z przyprowadzonym do życia, nie dawać mu oznaków o niebezpieczeństwie, w którym się znajdował, nie opowiadać nic zdomowych okoliczności, interesów, nie okazywać zadumienia i t. p. Stać się, ile tylko być może, utrzymać w izbie czystego powietrza, a przytym przewiew po nię. iego bynajmnię osłabionemu wniczem szkodzić nie mógł, niedozwalać odwiedzeń tem bardziy licznych, płochych, zaś lekkomyślnych i wesolych od trunków, wcale nie wpuszczać.

d.) Umiarkowane ciepło w izbie być powinno, toż samo się ma rozumieć i o pościeli.

e.) Niedozwalać, aby przywrócony do życia unosił się o swoich siłach, i owszem strzedz, aby się spokoj-

nie zachował, wznak leżał z uniesioną na poduszkach głową, co nade wszystko zachować należy, im twarz bywa zarumienioną, odętą, głowa ieszcze zajęta, te ostrożności naykródczy do 24. godzin nie dość ściśle zachować radzę. Przystępniemy teraz od ogólnych środków ratowania do szczególnych, które do zasłych przyczyn outratę życia przyprowadzających, zastosować wypada, ale że od tych przypadków nie są wolnemi nawet nowo narodzone lub i nieco starsze dzieci, należałoby i te nie-szczęsne zdarzenia umieścić, żeśmy zaś dali dostateczną instrukcyą przy dzieciach w Części Iszey tego pisma tam więc czytelników się odsyła, a tu przechodzić będziemy porządkiem następującym takowe zdarzenia a przy nich, co się tylko ściąga do przydania oddzielnego środków takowe przy każdym z nich przepomnianemi nie zostaną.



*Na zdarzenia utraty lub niebezpieczeństwa życia z przyczyn spadnięcia z wysokości lub silnego uderzenia w głowę albo też i miejsca szlachetne.*

Znajduje się ratunek przy chorobach trefunkowych, dzieci zaś przynięcionę lub i te, które bez życia wstanie tylko pozornę śmierci na świat przychodzą, jakim sposobem ratowanymi być mają, znajduje się umieszczono w Rozdziałku drugim Części Iszcy poradnika domowego, gdzie się te materje odsyłają.

*Ratunek powieszonych lub uduszonych.*

Jeżeli jeszcze wiszą, ile możliwości co prędziej uwolnić ich ciało należy rzeczyć, na których się powiesili, ale w tym czasie nie należy spuścić z pamięci, żeby ciało na ziemię, lub gdzie się znajdują kamienie nie spadało, przez co by uszkodzenia nastąpić mogły, usiłowania zaś ratunku zupełnie daremnemi, po uwolnieniu szyi należy także uwolnić wszystkie oberiskające jego ciało, i jego części, iako to: spodnie, szelki podwiązki, upleci kobiecej spódnice, podwiązki, sznurówki, brykle, poczem

przystąpić do skrapiania twarzy zimną wodą, do upuszczania krwi, a to tem więcéj im twarz bywa sinawą, obrzmiałą a oczyń się obszerniey mówiło pod liczbą 5. przy powszechnych szrodkach ratowczych. Trzeba nadto trzymać go na świeżem i umiarkowanym powietrzu, i w tem położeniu, aby głowa, piersi, wyżéj nad resztą ciała spoczywały, jeżeliby zaraz po otwarciu naczyń krwistych nie płynęła krew, wtenczas przystąpić wypada do nadcięcia (scarifatio) na karku, po zauszami, na skroniach przystawiać piławki, lub suche bańki wokolicach piersi na żywocie, a do tego czynić piersi zaogrzewanie przez nacierania chustami, i w tym szrodku ratowania niemożna zapomnieć o w puszczenie w płuca powietrza, a o tem się dokładnie pod Nr. 6. przy powszechnych ratowania szrodkach mówiło, do tego jeszcze przydać nóg wcieplęj wodzie moczenie co 2. i 3. godziny powtarzać, dawać różniękczające enemy, które już podanemi zostały, do tego jeszcze różniękczające zlnu nasienia, mleka, około szyi czynić często okładania, aby te na miescu nie ostygaly, na co być baczny potrzebą, rozcierać uda, podeszwy, płatami, szczotkami, a gdyby te szrodki niedostatecznymi się okazały, przystą-



pić należy wtenczas do enemów dynamicznych Nr. 7. przy powszechnych szrodkach ratunku, drzaznić nos, wydrążyć nie ust, gardziel przez szrodki wtymże Rozdziałku podane, niezapomnieć o użytku kąpieł umieszczonych pod liczbą 3. a w końcu przedsięwziąć puszczenie kroplami wody zimnej Nr. 10. a gdy się okażą powrotu życia oznaki nadmienione wyżej, jeszcze kiedy nie kiedy skrapiać zimną wodą lub octem winnym twarz, stósownie do okazywania się tych znaków, a ile miejscowości dozwoli starać się o umiarkowane powietrza do miejsca, w którym się ratuje, wpuszczanie, a nadto gdy powróci do powolnego polykania, postąpić sobie należy podług Nr. 12.

*Sposób ratowania z obawy uduszenia przez połknięcia rzeczy toż uduszenie sprawujących.*

Takowe rzeczy są dwoiakięj natury, ciekące, gazy saletrorodne, gazu węglowego i inne moc duszenia posiadające, ratunek jest, aby co prędkiej, jeżeli jeszcze są w stanie wciągania mleka parę lub naparzań rozmiękczaiących np. rumianku, odwaru lnianego polykać, lub też różne kleykowatej natury ciepłości, często po trochu brać, tu  
słu.

służą kleie skasz, ięczmiennę, owsianę, a nawet i tłuste na w pół z słodkimi, po pół lub cały łyżę dawać np. olej lniany świeży, olejek migdałowy zmieszawszy te ze świeżem żółtkiem lub na w pół z miodem praśnym czystym lub syropem czarnym i ulepkami, lub też w końcu i bez tych dodatków same tłustości, do których dodać można słodką smietankę. Drugiej natury rzeczy są stałsze, iakoto: okruszyny chleba i t. p. kiedy te wpadają w otwór kanału powietrznego i takowe wymagają śliskich tłustych rzeczy, a tu wszystkie umieszczone powyżej w pomoc przybrać należy, lekkie uderzenia ręką w kark czynić, dawać polykać parę octu winnego dla wzbudzenia kaszlu, lub na tenże koniec lechtanie w wydrążeniu ust umaczanym wiakięj tłustej ciepłości piórem, a nakoniec dać wnoś sarkac tabakę, dla niezwykłych ięj zażywania, a dla przywykłych proszek z korzenia ciemierzycy, lub ziela macierzanki, sól kuchenną miałko utartą, i te rzeczy albo pojedyncze albo zmieszane dawać, są nadto twardszej natury rzeczy i koniecznej figury, a te są nader niebezpiecznymi, wtym więc przypadku potrzeba wielką zachować spokojność, wstrzymać się od kaszłania, kichania, ponieważ wzię-



te rzeczy wielkie klócia zboleściami w miejscu obrażoném do przytomnych przyczyniają, i w tym przypadku służą oléyne, kleiste, do polykania rzeczy, a te już są powyżéy podane. Nie są i powierzchowne szrodki bez wielkiego użytku, tu służą okładania szyi znasionia lnianego, bułki, mąki z mlekiem nieco ztlustością robione, i te niepowinny być gorące, aby bardziéy rozgrzewając nie przyczyniały się do zapaleń miejscowych, iak znowu często takowe odmieniac, aby nie zastygały, coby znowu powiększyć mogły kurczowe miejsca drżaznionego cierpienia: gdzie mieć można do tych okładań dodać swiężego lub suchego stosownie do por roku szalein pokraianego drobno, garści kilka, małe czynić, i powtarzać nawet krwi upuszczenie dla zmniejszenia iako i zapobiegania miejscowego zapalenia, któreby mogło przejść w ropienie nienaypomyślniejsze na przyszłość, a w wielkim uduszenia niebezpieczeństwie przyzwać dośkonalego znawcę sztuki chirurgicznéy aby tenże otworzył kanał powietrzny, i kolące ciało wyjął. Na przypadek znowu gdyby w gardzieli z rzeczy większych, grubszych, a zdrowiu nieszkodliwych uwieznąć miało np. co z potraw lub mięs, takowe popchnąć do żo-

ładka wypada, ale i tu dawać potrochu polykać w przód z nadmienionych powyżéy kleistych, tłustych rzeczy, a dopiero wystarać się, jeżeli pod ręką niema, o stoczek lub drót żelazny, róg wielorybi, na końcu tych rzeczy przy-mocować kawałek gabki, lub téż w wosku umaczanę, lub téż i kawałek płatka cienkiego zwiniętego okrągło, a tę pierw dobrze w tłustych ciekościach umaczać lub wmaśle rozgrzanem, aby tylką niestonem, powoli wkanał pokarmowy czyli gardziel wkładać, iżby uwieczła w nim rzecz z miejsca poruszać, i mogła być do żoładka doprowadzoną, przy tych to przypadkach zwykły się drżaznienia powiększać obrażonych miejsc, przy tym i ich zapalenia, i tu znowu okładania powierzchowne są potrzebne, z tą iaka się już wyżej dała ostrożnością, równie i na potrzebę ratunku nagłego krwi upuszczania nie zapomnieć. Zdarzać się iednak zwykło, że ciała obce albo z powodu swojej wielkości lub téż i gryzącéy natury rzeczy, iakiemi być mogło szkło, kamyki, picuładze, drobne kości rybne, i t. p. i te starać się coprędzéy wyjąć, jeżeli uwieczły na początku kanału pokarmowego, czyli gardzieli, można za pomocą cążków nakrzywionych słusztwami rzeczami nasmarowanych, iakoż



by było rzeczą bardzo potrzebną, aby przy apparacie ratunkowym mogły się takżo znajdować, ile że nad Żit. kilka kosztować nie mogą, a w przypadku ich niemienia, i palcami utłuszczonego wydobyć. Na przypadek znowu, gdyby się która z tych rzeczy głębiej wtynże kanale znajdowała, lub też i powyższe szrodki nie miały skutkować, natenczas użyć drótu grubego miernie z żelaza, a nagiąwszy tenże na końcu, z którego ma być wpuszczonym, z drugiey znowu strony należy go podwoynie nagiąć, aby służył za rękoisć, którąby do ręki przywiązać można, przymocowawszy na koniec gdzie ma być wpuszczonym kawałek gąbki i wyprasowaney, tak dalece z ostrożnością wszelką zmieysca za pomocą ręki popychać aż do uwięźniętęy rzeczy, lub też można i gąbki zaokrąglonę przy tymże drócie przymocowanę kilka minut tamże potrzymać, aby mogła, napęcznić, przez co rozszerzać można miejsce dla łatwiejszego uwięźlęy rzeczy do żołądka wpadnienia, i co można z pauzami znacznemi powtarzać, to napęcznienie przyspieszyć można przez wlewanie w gardziel mleka lub oleju, oliwy, i w tem tak sobie tylko postąpić wypada, gdyby ich inż niemożna przez podane tu szrodki wyjąć. Na przypa-

dek gdyby inż tych rzeczy wcale ani uiąć ani wydobyć ani też głębiej popchnąć, wypada slizkość kanału pokarmowego uczynić, i tu służyć szrodki na wstępie tęy materyi umieszczone, okładania, a nawet małe krwi upuszczenia, i t. p. do tego należy chorego poza plecy dłonią ręki powoli uderzać, mocno całym ciałem trząść, dać przyczynę do śmiechu lub kichania, a gdy jest inż obawa uduszenia, należy takżo otwierać kanał powietrzny, zdarzyć się iednak może, że polknięte ciała spiczące, ostre, ruszywszy się zmieysca, w którémś tkwiały, spuszczaią się do żołądka, i w nim zwykły boleści zrzadzać. Na ten znowu przypadek, końcem ulżenia mieysca drażnionego przez pobyt tychże, dawać słodkawę olejną ciekłości często połykać, iak się to inż wyżey nadmienilo, do picia mleka sztuczne z nasion bani, ogórków, migdałów, a na usmierzenie boleści w żołądku z tęy przyczyny pochodzących, z wielkim skutkiem doswiadczałem, iść kaszę ięczyenną, owsianną, gęstawą słusto podostatkiem, aby napelniony niemi żołądek przez swój właściwy ruch mógł wtłoczyć ciało koleczyste i daley z niego do kanału kiszek, z niego zaś poza granicę ciała wyprowadzonym, lub też dla przyspieszenia tego wypro-



wadzenia dać enemę w godzin szesć po iedzeniu, któraby mogła kilka stolców sprowadzić, na to służy serwatka, nalania zrumianku, soli kuchenney, oleju lnianego, oliwy, co się z nich pod ręką znajduie.

### *Ratowanie utonionych.*

Naypierwszem powinno być staraniem pospieszne zwody dobycie, to nie małą trudność czyni, a nieraz i niebezpieczeństwem życia ratującego połączone, iakoteż i wczasie zimny, gdzie zdarza nie raz załamać się na lodzie stałym i utonąć, oprócz tego ieszcze i narzędzia szukania i wydobywania zwody utonionego ciała, powszechnie dotąd u nas praktykowane, tak ciała części nieraz obrażają, że chociaż i dość prędko z wody być może wydobyte, iako i skuteczne do życia przywrócenie, przez obrażenie narzędziami ciała wszystkie środki stają się nadaremne. Dla uniknienia więc tak nieszczęśliwych wypadków podane są wrycinach cęgi otwarte, i złożone za pomocą których bez najmniejszego ciała uszkodzenia zwody wydobytem być może, zawiesiwszy opis tych i innych do tego narzędzi, iako i użytek tychżesam się łatwo dorożumiewać daie, przystępuie do samego ratowania.

Im się prędzcy ciało zwody wydobydzie, a to bez uszkodzenia, tem pewnieyszem stać się może ratowanie, niespuszczając się bynajmniey na szczególiwe zdarzenia, gdzie utonionych w godzin, co większa dni kilka, przecie do życia przywracano, starać się zatém wypada, zaniin te narzędzia troskliwością rządu wprowadzonomi zostaną, aby zwyczajnemi dotąd ciało nieobrażając tak zwody dobyć, ale zaraz i tu należy mieć baczość, ażeby niebyło na głowę upuszczonem, iakoteż iak się dotąd działo tu i owdzie taczac, i owszem aby w naywiększey spokojności leżało, a co prędzcy uniosłszy głowę w górę do naybliższego ile być może schronienia zanieść, i wkóremby niebyło gorąco lecz tylko pomierne ciepło; iakoteż aby przewiewu powietrza bronić, uniosłszy głowę w górę położyć, ciało na prawę stronę, uwolnić ze wszystkiego, co tylko na nim mokrego się znajduie, co prędzcy go osuszyć obwinąwszy płótnem, nieco ogrzanem, gdyby zaś miało opodal od wynalezionego miejsca zostać przeniesione, lub przewiezione ile możności starać się o zachowanie ciała spokojne, bez stukania, trząsania i t. p. i zaraz pod okryciem temże rozpocząć ciało nader zwolna a długo nacierać ogrzewancami



wprzód płatami, kuczbaią, flanelą, sukniem, pode-zwy zaś szczotkami roz-cierać, do tego oczyszczenia potrzeba wydrą-żenie nosa, ust, z flegmy, mulu. wo-dy, piasku, co czynić za pomocą zwi-niętego płatuszka, wpuszczając w usta w nos powietrze podług Nr. 6. powsze-chnych środków ratowniczych; dawać enemę zwolnionę wódki na wół zmlekiem, można też nader skutecznie sprycować powoli, i zagrzaną wódką np. kwaterkę do gardzieli z kądem spłynię do żołądka, jeżeliby się przy użyciu tych środków nie dostrzegały powraca-jącego życia oznaki, użyć potrzeba bar-dziej wzmacniających, drżających rzeczy, tu więc służy Nr. 3. powsze-chnych ratowania środków, iakoż nie-rzad były przykłady, że samo tylko sto-pniowe ciała ogrzewanie do życia przy-wróciło, należy więc do środków sil-nie pomagających, opóźniać się zatem z nim wżaden sposób nie można, owszem im prędzey tym skutecznię rozpocząć wypada, a gdyby się jeszcze znaki ży-cia nie okazały użyć środków zpod Nr. 10. i 11. wszelako nie dopuszczać, aby przy puszczeniu kroplami zimnę wody nie ziębło i miejsce, które też osuszać i ogrzewać należy, aby stoso-wnie do umieszczonych pod temi liczbami ostrożności, skoroby się okaza-

ły, by też znaczniejsze lub i naymnię-sze znaki życia, nie trzeba ratowań tych poprzestać, ale z nich używać da-lęj nayskuteczniejszych, a do tego gdy już nieco polyka, postąpić podług Nr. 12. potrzeba, a skoro do sił rozpocznie powracać, gdyby wypadała potrzeba z obrzmiałości twarzy, ię siności, nieco krwi upuścić, i co też nawet przy rato-waniu znajdując ten stan twarzy czy-nić należy; nie można też i zdawaniem enem być choynym ale tych użyć pod czas wstrzymanego przez dni kilka stolca, do tego jeszcze dodać należy że utoniętego w zimie uważać można za zmarzniętego, iak się to okazuje z tęża-łości członków, twardości ciała. Nieszczęśliwi powinni być początkowo rato-wanemi, iak zmarzli, o których zaraz się mówić będzie.

#### *Ratowanie zmarzłych.*

Przywrócenie do życia zmarznię-tych dość szczęśliwie się udaje nawet w dni kilka po nastąpionym przypadku: do ratowania środków, aby te nie zo-stały bezskutecznemi, nade wszystko nie-dopuszczać: aby ciała takowe zaraz do ciepłych izb a tembardziej gorących przynosić, przez co tem pewnię na za-wsze utraci się życie, trzeba więc ciało naprzód zanieść do zimnē izby, gdzie



ie z odzieży uwolnić, uniosłszy głowę w górę całe ciało prócz głowy posypać śniegiem grubo na dwie piędzy, w tém położeniu zostać ma ciało dopóki łatwość wzięciu członków, a przy nim i wolność ciała, się nieprzedstawią, gdyby nie było śniegu, do nacierania ciała i lodu, włożyć ie do wanny w zimną wodę, co gdyby trudność znaydowało raz wrzć obwilać ciało maczanemi w zimnćy wodzie chustami, gdy zacznie rostać, opadające z niego zamrożenie oddalać, i ciało z wody wyjąć: po czeim należy nieco wolniejszą wodą rozcierać, do której można dodać wódki, spirytusu kamforowego, wina, octu winnego. Jak tylko okaże się stać wów zwolnienie i członków ruch, osuszyć ciało zacieplonemi chustami, położyć w posciel, wszelako nie w izbie ogrzanej, gdyby jeszcze tchnienie nie miało powrócić, i tu znowu nacierać, ciało potrzeba chustami maczanemi w zimnćy wodzie, a do tego skrapianemi wódką prostą lub kamforową, wpuszczać powietrze według Nr. 6. dawać enemy zwody ciepłej, do której dodać 4. część octu, nieco kamfory w wodce rozpuszczonej, łechtąć gardziel, nos według Nr. 9. a nawet i puszczenie kropel zimnćy wody, Nr. 10. zdarza się dość często, że szczęki bywają dość

mocno ku sobie przycisnione, w tym znówu przypadku potrzeba okolicie ich nacierać wódką kamforową, spirytusem, lodem, śniegiem, stosownie do pory.

Jak tylko chory rozpocznie łysać, postąpić z nim należy iak się pod Nr. 12. podało, być iednak może, że się przytem do życia powrocie przylączy mocna febra, nieprzytomność, a nawet zaięcie od krwi nóżgu, co się poznaie przez czterwoność liców, białka, odurzenie oka, na ten znówu przypadek należy za uszami na skroniach po kilka piławek przystawiać, i niezaraz po ich odpadnięciu, krew tamować lub też i do krwi upuszczenia przystąpić, podług zdania znawcy.

*Ratowania zaduszonych od wyziewów i parowań szkodliwych, zdrowiu a zatem i życiu zagrażających.*

Pochodzą one ztlącego się torfu, drzewa, węgli bądź roślinnych, bądź kruszczowych, nadewszystko gdzie bywa powietrze zamknięte, co też nawet i zdarzyć się może od świeć i palnych wszelkich materyałów, takż nastąpić zwykło uduszenie od burzących się ciektłości, iako to: od robienia piwa, napoiów owocowych, miodu, wina, octu i t. p. do nich słusznie doliczyć można won-



ności kwiatów, mianowicie pachnących roślin, kiedy od słońca nie bywają oświecane zamkniętych do tego miejscach, nadto i wyziewy kruszczow w górniczych głębiach, wodociągach, korzennych kramach zamkniętych, napelnionych ludźmi miejscach i t. p.

Wszystkie i tem podobne wyziewy i parowania podług wszelkiego podobieństwa mają wpływ szkodenia i odurzania na wzór maku opaiającego (*papaver somniferum*) systemat nerwów a zatem i mózgu, iakoż następujące przypadłości rządzą skłonność do usypiania, uczucia ściśnięć w głowie, otrętwiałość wczole, skłonność do wymiotów, szczękosciskość, mdlenia, sinosć twarzy, wargów, odętosć żywota, oblepione klejem powieki, konwulsye, a nawet i zupełne bicie tętnów (*pulsatio arteriarum*) ustania.

#### Szrodki ratownicze.

Tych użyć należy stosownie do stanu, w którym się osoby takowe znajdują, a tak jeżeli jeszcze nie są z życia pozbawionemi, tym prędzj wynieść z tych miejsc na świeże powietrze należy, skrapiać ich twarze wodą zimną, octem winnym, lub też niemi obmywać, dać do picia szklankę wody zimnej, i niewprowadzać ich do tych-

żę miejsc, te są szrodki dostatecznemi do ozdrowienia.

Lecz jeżeli osoby uduszone zdają się być bez życia, na ten czas równie i te na świeże powietrze, że co prędzj wynieść potrzeba, zsukien rozebrać. położyć na ziemi ciało z uniesioną w górę głową, i tak sobie iak w powyższem zdarzeniu postąpić wypada, dodawszy do tego ratowania wpuszczanie w płuca świeżego powietrza za pomocą mieszka Nr. 6. powszechnych szrodków ratowania, Te zimną wodą zlewania, maczanemi chustami twarzy nacierania, dalej ciągnąc aż do oznaków życia, do czego przybrać radzę puszczenie zimnej wody Nr. 10. na przypadek uparty w ratowaniu przez te szrodki można przystąpić do krwi upuszczenia Nr. 5. do tego w zimnej wodzie unaczanemi chustami piersi nogi nacierać, zimną wodą wnos sprycować, też części drżaznić, a to iak się pod Nr. 8. podało, dawać enemy z zimnej wody. — Gdyby też szrodki przez godzinę użyte nie dość skutecznemi okazały, w toczyć ciało w ciepły popiół Nr. 3. albo owinać w chusty rozgrzewane, skoro się zacznie piersi, kadrub rozszerzać, łkanie się okazać, nozdrza się sciskać, a nadto piana przed ustami, nieprzystawać bynajmniej z polewaniem, skra-



pianiem twarzy zimną wodą, nie prze-  
pominając o osunięciu, zniżeniu,  
lub wcale zupełnem zniesieniu szczęko-  
ściłości, iakoż w tym przypadku nacie-  
rać szczęki rozciekiem amonii wo-  
dnym, oleiem lnianym, migdałowym,  
w których np. łyżce do dwóch rozpu-  
ścić kamfory ziarek od 10. do 20. jeżeli  
się uwolni od szczękościłości usta, a  
do tego przystąpią dobrowolne wymio-  
ty, takowe utrzymać należy przez da-  
wanie częste herbaty z kwiatu rumian-  
kowego, lub ciepłej wody, do której  
dodać trzecią część oliwy, oleju lnia-  
nego, masła topionego, kiedy znowu  
zacznie chory wolno oddychać: im  
dłuższy zostawał w tym stanie, należy  
ciało obwijać w ciepłe chusty, w ogrza-  
ną pościel, zakrywać wodą zoctem  
winnym, a wreszcie przystąpić należy  
do Nr. 12.

#### *Zagorzenie od węgla zarzających.*

U takich ledwie nie zawsze jest  
szczególnem dostrzeżeniem, iż skoro  
do siebie przychodzą oddychają, poły-  
kają, przy tem znaczną część materji  
czarnej nie do zniesienia cuchnącej  
przez wymioty oddają, i te ich do lep-  
szego czasem przytomności doprowadza-  
ją. Należy zatem ich co prędzej wy-  
nieść na świeże powietrze, owym wy-

miotom dopomagać przez picia rumian-  
ku samego lub mleka zwolnionego, z ó-  
lejami, tłustościami, aby tylko nie sta-  
remi, i jakie się z nich w domu znajdują.  
Wymioty takowe utrzymywać póki  
się też materja w nich okazuje, natem  
już co do wzbudzenia ich poprzestać,  
na przypadek zaś gdyby miały być czę-  
ste obfite, nie uprowadzające nic z czar-  
nej cuchnącej materji, dawać kwa-  
skowę natury napoje, iako to: wodę  
zoctem, z sokiem, kwasnicy lub suszo-  
ną wnięty gotowaną: Barszcz zaczynio-  
ny burakowy, na żywot przykładać  
ciepłe chusty, dawać enemy z serwat-  
ki, zwody i octu, szrodki te są dosta-  
tecznymi, a po zupełnym do siebie  
przyściu, zachować się należy stoso-  
wnie do Nr. 12. Nad to gdyby miało  
się przyłączać mocne serca bicie, twarz  
obrzniata, białka oczu krwią zaszyły,  
szum wuszech, odurzenie, do krwi u-  
puszczenia przystąpić.

Równie zdarzyć się mogą zadusze-  
nia od dymów arszeniku i t. p. ratu-  
nek się wprawdzie wnićzém nie różni  
od powszechnych ratowania szrodków,  
to tylko dodaję, gdy połykają i oddy-  
chają, nader pożyteczną jest rzeczą  
najprzód posilać dostatecznie sztuczne-  
mi mlekami tyle razy podanemi, klejami  
z kasz, które powinny być z dodatkiem



młodego masła, zoleiem; oliwą, zmieszane i często brane. Co się zaś tyczy przyiętego do żołądka arszeniku, to się niżej położy.

Bywają nadto przypadki, że równie zadurzyć ludzie mogą od wyziewów kwasów kruszczowych, lubo te dwa ostatnie przedrzaznienia mogą być tylko w mięscach fabryk tychże, to jest: saletrzanych, siarczanych, chcąc jednak tę materiją uzupełnić, umieszczam i na to szrodki potrzebne oprócz powyżey podanych, aby się przy nich we wszystko zawiadomić. Jakoż tu potrzeba jest dać rozciek amonij wodny, tymże rozciekiem napuściwszy kawałek gąbki położyć ją na usta chorego, a ratujący ma swe powietrze, przez nią do ust dać, dawać rozciek utegoż w łyżce wody po 12. 15. do 20. kropel, branie to popić podostatkiem wody; kiedy już połykać jest w stanie: przy dawaniu tego szrodka trzeba pozostać, pokąd chory zupełnie do zdrowia nie powróci, a do przyspieszenia czego równie jest i branie enem z ługiem mydlarskim, rozcieńczonym wodą, pomocnym, np. do półkwatki wody, pół łyżki, gdzie go niema, można użyć łyżek 3. 4. od iedzenia popiołu z twardego drzewa, zagołować razy kilka w kwarcie wody, przecedzić, dać

się

się ustać z tego półkwatkę na iednę enemę przeznaczając.

Położone tu nieszczęsne zdarzenia tych ratunków wymagające dla przywrócenia do życia na utratę z tych przyczyn wystawionego, przypomnieć także nie można i opodaniu szrodków dla ratujących osób, aby i te dopełniając ludzkości życie swe zabezpieczyli, iakoż łatwo takowe utracić mogą, wpuszczając się do głębi, sklepów. i t. p. mięsc, napełnionych wyziewami, gazami zaduszającemi, dla nich więc następująca służyć ma instrukcyja.

a.) Naypierw starać się mają, aby udając się wtak niebezpiecznemieysce, wprzód co prędzey ile możliwości swięzego napuścić powietrza, gdzie zatym mieyscowość dozwala, otworzyć okna, drzwi, kominki, piece, lecz tego w głębiach dokazać nie można, tam już o sztucznym sposobie myśleć potrzeba, aby za pomocą tego szkodliwość usunąć, ułagodzić rozrzedzić. Wypada więc wtakowe głębie łąć wodę zimną, śnieg, ługi mydlarskie, co się pod ręką znajduje, gdzie można zaprowadzić młynki do wywiania zboża, ten wielkim skutkiem użytym być może czas nieiaki obracając skrzydła.

Część II.

48



mi, z tymże skutkiem zaduszające wyziewy rozrzedza ich obrot. Wprawdzie Pan Robinson, Ebenez z Filandelfii radzi, aby do takież głębi, sklepów, grobów, studni i t. p. wpuszczać skórzaną wąż umocowany przy miechu kowalskim, z któregoby powietrze przechodzące węzłem do tych miejsc było doprowadzonym, iakoż są próby zapewniające nieszkodliwość powietrza tym sposobem rozrzedzonego. Z nich jest *Pierwsza* wpuścić wte miejsca iakieś zwierzątko domowe, zatrzymać w nim przez kwadrans, a po wyciągnięciu okaże się czyli nie jest zaduszone. *Druga* toż samo robić z palącą się świecą, smołą, drzazgą, lub łuczywem, i innemi palnemi rzeczami, jeżeli te trzymane czas nieiaki nazad wyciągniętemi zostaną przy paleniu się, są to oznaki oczyszczonego powietrza, iak przeciwnie. Lubo powszechne wprowadzenie tego wynalazku w wielu nawet w Państwach Europy doświadczoniami stwierdzanego, byłoby za kosztownem, przynajmniej po różnych kopalniach znajdować się powinien, gdy winnych miejscach, zwłaszcza gdzie może się wprowa-

dzić miech sam, lub młynek, stać się mogą i narzędzia te równie użytecznemi.

b.) Wpuszczając się do tych miejsc osoby opatrzone być mają podwójną linką, z których jedną opasani około żywotu, drugą zaś wręcz trzymać powinny dla dania o sobie przez nią znaków ratunku, aby na powrót wyciągnięci być mogli, gdyby tego potrzeba wymagała. Nie zle takż uczynią, owszem użytecznie dla siebie napić się trochę wódki, takową w ustach trzymać, suknię zaś dobrze skropić zimną wodą, lub rozciekiem amonii wodnym, którym nawet dobrze napuszczoną szmatę przed ustami trzymać mają, rozcieńczywszy tenże wprzód na w pół zimną wodą.

#### *Ratunek od pioruna uderzonych.*

Pierwszém staraniem być powinno ciało na świeże powietrze wynieść, z o dzieży obnażyć, zimną wodą polewać, naprzemian szczotkami w téż maczanymi, ręce, uda, nogi, pięty, nacierać, nozdrza drażnić podług liczby gęty wpuszczając w płuca powietrze, stosownie do Nr. 6. nawet krople zimnej wody, iak się pod Nr. 10. podało,



gdyby twarz miała być, iak się dość często przy krwistych zdarza, siną, odętą, a do tego podane szrodki nie miały skutkować, do krwi upuszczenia zszyi, rąk, nóg przystąpić, lub nasiekiwane bańki, po zauszami stawiać, na przypadek nieskuteczności z podanych tu szrodków, przystąpić do dawania enem dymnych z tytuniu Nr. 7. i nie przestać obkładania głowy zimną wodą, iako też i innych tu podanych szrodków używać. Jeżeli szczęśliwy powrót do życia nastąpi, dać niezwłocznie wyskoku siarczanno eterycznego wylżce wody kropli 20. a gdyby tego nie było, wina, wódki, wreszcie zachować się z przywróconym do życia podług przepisu liczby 12. Powstają dość często albo boleści, lub i sparalizowanie członków, takowe znosi nacieranie chustami suchymi lub skropionemi wódką kamforową, rozciekiem ammonii wodnym, a iak się spostrzeże, że chory po przywróceniu bywa do snu skłonny, maiać, lub też i doznaje drgań stawów rąk, i w tym razie wżaden sposób obkładania głowy zimną wodą poprzestać nie należy, i o wszem do ustania zupełnego tych przypadłości czynić należy.

## Ratowania zatrutych.

Wypływają z natury trucizn, gdy to dzielą się na.

- a.) Przedrzazniające, gryzące i te powszechnie rozpuszczają krew i soki ludzkie, żołądek zaś po zrządzoneń jego zapaleniu gangrenie z kształtu swojego wyzuty bywa.
- b.) Odurzające natury, a te z przymiotu szczególnie działają na gałunkowe nerwów życie, ztąd ich czynności powoli lub nagły, a to co do ilości i ich użytku, ztracają.

Do przedrzazniającej klasy pomiędzy inne należy arsenik biały, żółty, niedokwas merkuriuszu odżerający, szkło subtelnie tarte, cowieksza skuteczne nawet szrodki lekarskie stać się mogą dla zdrowia tak, iak trucizny szkodliwemi np. (*tartarus emilicus*) kamień winny antymonowy, ialapa żnię żywica, a nawet i inne z żywego srebra iako i miedzi preparaty z ziół wilosci użytych szkodliwie równie iak trucizny działają, tu liczyć należy np. konitrod lekarski, wilcze łylko pospolite, naparszlnica czerwona, (*eufor. bia Aptekarska*), korzeń ciemierzycy, przestępa, jeżeli nie długo, te i t. p.



truczny w żołądku się znajdowały, ani też swych przedrzazniających i gryzących skutków nie okazują, dać na wznity znaczną dozę ipekakuany od pół drachmy do 40. ziarek pieprzu, po nim pić słuste rzeczy z klękami, a o tych się wyżej namieniło, i tyle razy powtarzało.

Lecz jeżeli się przez czas w strzymi, i w żołądku już boleści, gryzienia, się przedstawia, a do tego truczny w ciekłościach zażytemi były, i to bez wzięcia potraw, nie trzeba dawać na wymioty lecz udać się do środków kleistych, tłustych, któreby ostrości ich łagodziły, na ten koniec służą mleko, smietanka, olęj lniany bardzo skuteczny iak oliwa z żółtkiem od iaja zbite, lub też i same żółtka od iaja połykać, także służą za napój sztuczne mleka z nasion ogórkowych, bani, migdałów, dość często przyłącza się trudne połykanie, w szyję wcierać maść Nr. 21. okładać ją kataplazmą z lnianego nasienia, chleba tartego białego z mlekiem, przykładac na serce maczane w ciepłym mleku chusty na czworo złożone, lub flanelę, połykać parę z ciepłego mleka, lub gdzie się znajdują liście z szaleju, z odwarem tychże w wodzie.

Gdyby zaś odętosć żywota przystępowała, a do tego się zatkanie stolca przyłączało, dawać podług potrzeby enemy z ciepłego mleka, odwaru lnianego nasienia, miodu, mydła, w wodzie lub też i ciepłym mleku rozpuszczone np. do pół kwaterki, cwierć łota, i znowu gdyby przystąpić miała biegunka, służyć enemy z mleka, odwaru lnianego nasienia z olejem lnianym i masłem niesłoniem, przystępować także zwykły wymioty, gryzienia w żywocie: te przypadłości silnie usmierzaia powyły nadmienione kleistey natury napoje, z dodatkiem tłustych rzeczy, a gdyby mózg był mocno zabrany, białek oczów czerwony, maiazenia, krwi upuszczenie jest potrzebnem iak się pod N. 5. przy powszechnych środkach ratowania podało.

Dotąd mówiło się o środkach przeciw wziętym truczynom gryzącym nieznanym z swęj natury, a gdy te są wiadomemi np. od arszeniku, dzielnie pomocne, są następujące przeciw niemu środki, aby tylko wcześniej, i owszem ile być może pospieszanie braniem były, w tym przypadku nie czekając dać po dostatkem pić napoje kleiste, tłuste, wyżej nadmienione, dolewać rozpuszczenie potażu, np. od pół łota do całego na kwaterkę wody czystey, lub też



na prędcę wziąć przesianego popiołu łyżek 3. 4. zagotować razy kilka z trzema kwaterkami mleka, przecedzić, i dawać po łyżce, dwie na raz, słowem początkowo częścię np. co pół godziny i co godzinę, iak późnię, zwłaszcza kiedy nudności, wymioty, boleści wolnieją i co parę godzin, gdyby zaś chory tak wiele z nadmienionych napoiów pić niemógł, wtenczas rozbić dobrze żółtko od iaią i dodać 2. 3. 4. pieprzu ziarek tartego miatko na proszek boraxu, często branie takowe powtarzać. Nie można tu pominąć Leczenia przez Hancimana, zaleconego, iak skutkami stwierdzonego, ile że iest domowe, a to zawiera się w rozpuszczoném zwodą mydła, wszelako daleko pomocnięszem iest nie stare wziąwszy, np. do kwaterki wody kółt 1. 2. a do tego dodać można łyżek 4. 5. oleiu lnianego, oliwy, migdałowego oléyku, co się z nich pod ręką znajduje lub niebawnie dostać można, ztęy mięszaniny dawać podług potrzeby i przypadłości wyżej umieszczonych po łyżce od iedzenia, częścię lub rzadzię, to iest w godzin 2. lub tész i pomiędzy dwoma godzinami raz, a popijać klejami z kasz: owsiannę, ięczmiennę, wody znasienia lnianego. Zaleca zaś Hufeland od zatrucia się arsenikiem rozciek potaziu,

którego dawał co dwie godziny z mięszaniną oleiów, mleka, po 60. kropel a na żywot przykładania lnianego nasienia, kaszy ięczmiennę, z wodą, mlekiem, tłustościami.

Po usmierzeniu gwałtowniejszych przypadłości na pozostałe ieszcze, nie dość polecić muszę dawań oléyku przekroplanego anyżku po 20. kropel w 2. łyżkach czystego miodu, czarnego syropu, lub i innę gęstę stodyczy co 2. 3. godziny, biorąc często po trosze, aby wszystko w tym czasie wypotrzebować. Takoz w dobrym skutkiem służy na pozostale boleści kwiat siarczanny (*flos sulphuris*) dając tegoż co parę godzin po 20. do 30. ziarek w dwóch łyżkach wody z równym skutkiem dawać można wątroby siarki, (*hepar sulphuris*) po ziarek od 15. do 20. dla starszych, a przez połowę dla młodszych, co 2. 3. godziny w łyżce wody, nieprzyjemny wprowadzić co do swęy woni w braniu szrodek chociaź silnie pomagający, powinienby wszelako skłonić potrzebujących tegoż, dla uwolnienia się od cierpień iak zapobiegania nie najlepszym dla zdrowia wypadkóm, nader nastąpić mogącym.

Tychże samych szrodków wymaga i przypadkiem wzięty sublimat, to iest kleistych, tłustych, olejnych, lecz bez



dodatku mleka, a na jego miejsce domięszywać rakowe oczy, kredę, potaż, np. po łyżce od iedzenia do kwatkerki iednocy tcy kleykowe i tłustey mieszaniny, którą przydawano po łyżce od iedzenia co 2. 3. godziny pierwey dobrze zmięszać potrzeba, lub też i w zastępstwie tych szrodków zaleca się powyżey wodę mydlaną. Wystrzegać się iednak zalecam brania wszelkich kwasów, chociażby te były i roślinne, iako to: barszcze, kamień winny i t. p. ponieważ takowe stać się mogą iak najszkodliwzami, dla tego nie można ich nawet w pokarmach używać, cowieksza czas niemały po ustaniu boleści.

Nadmieniłem wyżej, że nawet leki gwałtownie laxujące stać się mogą na wzór trucizn nader dla życia niebezpiecznymi, na przykład zatem wymiotów zrzędzonych przez użycie kamienia winnego antymonu, dzielnie służy odwar z chiny, a równie w zastępstwie tak drogiego nieraz szrodka, mech dachowy, któren tym końcem w przepisach lekarskich umieściłem, na przykład znowu użycia gryszpanu samego, lub też z niepobielanych naczyn kuchennych z potrawami wzięty, dający się okazywać przez wymioty kwaskowe, lub inetalicznie smakujące, i tu szrodki wyżej nadmienione dziel-

nie służą, np. rozciek ammonii wodnocy, woda z mydłem, a co do roślin gryzących natury, októrych nieco wyżej nadmieniłem, skbro wzięte rozpoczynają swe skutkowanie wyżej umieszczone, im prędzey tém skuteczniēy dać na wymioty np. ipekakuany, emetyku, a do tego dawać pić obficie kleykowe, tłuste, napoje, takōż wyżej nadmienione. Przy ostrości zaś mających roślin użytku nie trzeba skuteczniēszego mieć szrodka nad kwasy, iako to: ocet sam, miodek octowy, sok cytrynowy, kwasniocy, lub też suszona w wodzie gotowana, i które domięszywać można do napoiów kleiowych, wyżej podanych, ale i tu zaraz za przystępieniem boleściami takōż dać na wymioty potrzeba, aby przyczynę po zagranicę ciała wyprowadzić, skutki ulagodzić, usmierzyć i zupełnie nieczynnymi poczynić.

#### *Odurzających natury trucizny.*

Skutki ich szczególniēy się dają, poznawać przez obłąkania zmysłów, zawroty głowy, odurzenia, smutek, skłonności do snu, tęsknoty, dziwaczne z ciałem poruszenia, kurcze, konwulsiye, nakoniec sen appoplektyczny przechodzi w śmiertelny. Przy gatunku tych trucizn dość często przystępują palenia i gryzienia w żywocie, wymioty i wiele innych przypadłości, przez powyż-



sze trucizny wyprowadzone, dla tego też bardzo wiele zależy na rozpoznaniu istotnych przymiotów trucizny, ponieważ odurzające wcale innego ratunku wymagają, chcąc aby skutkom ich zapobiec. Pomiędzy pospolitemi są szczególnie odurzające natury bielun dzierzawa (*datura stramonium*) wiśnia bobkowa, szalęy ziele, nasienie, swinia weż, wilcza jagoda, jagody ci-su zwyczajnego (*taxus baccata*) naparsznica czerwona (*digitalis purpurea*) mak usypiający (*papaver somniferum*) wronie oko, po użyciu takowych spieszyć należy z daniem na wymioty proszku zipekakuany sposobem, i w ilości, iaka się powyżej przy szrodkach ratowniczych wiele razy podała, to jeszcze dodać, że częste i podostatkiem rumiankowéy herbaty lub ciepłéy wody popicia wiele się dla zrządzenia wymiotów przykładają. Nadto wielcepomaga, aby chory ciągle świeżego lnóg używać powietrza, ciało zaś iego ma być zimną wodą z octem zinięszaną obmywane, naprzemian toż wodą z octem skrapiane, i tu służą za napój a razem i za skuteczne lekarstwo: pić podostatkiem kleie z kasz kwasami roślinnemi zaprawne, wyżéy tyle razy zalecane, do tego niedopuszczać takowym chorym usypiania, bawiąc ich ro-

zmaitemi rozrywkami i t. p. Jeżeli zaś takowego gatunku trucizny długo wćiało bez szrodków użycia zostawały, dostrzegając się dać naczyńia krwiste, na szyi po głowie idące znacznie od krwi napelnione, przytém równie dostrzegamy czerwoności lub i sioności twarzy, nieraz i warg, co oznacza zgromadzenie krwi do mozgu, tu należy przystąpić do krwi upuszczenia Nr. 5. a przytém mieć baczność, aby był stolec wolny, na przypadek zatwardzenia dawać po dług potrzeby enemy z trzech części wody a czwartéy octu tégiego.

Bywa nadto, że po użyciu tych trucizn wymioty same od siebie przystępują, a te być mogą liczne i chorego osłabiające, że o ich wstrzymaniu myśleć należy, na ten znowu zamiar służy proszek Nr. 6. w przepisach lekarstw umieszczony, okładania żywota mięt-kwią, piołunem, same lub téż i w polowie zmieszane, z nich robione materacyki, kto chce, może téż zioła i moczyć w wodzie gorącey w przykrytych naczyniach, często wnich chusty maczać, wyzionąć, skrapiać winem, wódką, smarować żywot spirytusem kamforowym lub innemi pachnącemi, gdyby się jeszcze wstrzymania przez te szrodki upartemi być okazały, iak się to nieraz przytrafia, że nawet po



łyżce małej iakowego zasilku kwarta-  
mi prawie przez usta wydać ciepłości,  
w ten czas w pomoc przybrać albo maść  
Nr. 25go. nasmarowawszy nią płótno  
w wielkości nieco mniejszey ciwartki  
papieru, we szrodku na pępek wyr-  
znąć dziurki i na żywot przyłożyć, aby  
pęcherz był zebrany, którym prze-  
ciąć, wodę wypuścić, i przykładać do  
zagojenia maść Nr. 10. lub można takż dla  
pospieszniejszego drzaznienia, przyło-  
żyć Nr. 1<sup>o</sup>. i aby do zaczerwienienia na  
żywocie leżał, poczem odjąć i mieć sse  
to smarować smietaną, masłem, miodem  
nie słodem, czynić wypada nacierania  
udów, nóg, pięt, przykładać bańki  
wietrzne, szklanki, kieliszki na nie, to  
wszystko dla odciażnienia ciepłości do  
tych części od zdrzaznionego żołądka,  
przez co się i silnie do wstrzymania  
wymiotów przykładą, wreszcie i tu mo-  
żna na żołądek wpuszczać krople zi-  
mnej wody podług Nr. 10. szrodków  
ratowania powszechnego.

Zatrucie znowu zopium wymaga  
dać na wymioty proszek z ipekakuany,  
po czym dawać kwaskowatej natury  
napoje, a te są już wyżej powtarzane,  
nadto dzielnie służy podług doświad-  
czeń Hahnemana kamfory użytek, w tém  
więc przypadku pomocnym stać się mo-  
że proszek Nr. 10. w przepisach lekar-

skich umieszczony, a przytem i o dawa-  
niu enem przypomnieć nie należy.

Nadmieniło się wyżej, że niektó-  
re z pomiędzy trucizn osobliwie z tych,  
które posiadają połączoną własność o-  
durzenia, iakotęż i gryzienia, że po użyt-  
ku tychże przystępują zawroty głowy,  
odurzenia, mairczenia, bliski stopień  
szalństwa, popędy do snu, konwulsye,  
wymioty silne, bóle żywota.

Do téj klasy roślin należy korzeń  
biały ciemierzycy, naparsznica czerwo-  
na, tabaka, swinia weż, iakotęż i ia-  
dliwcy natury grzyby. Wiele z tych  
tu wyliczonych szkodliwych roślin, o-  
prócz powyższych przypadłości, zrzą-  
dzą nadto rozrzedzenia krwi, odętość  
żywota, czarne, sine po skórze pla-  
my, i te już szybki przechód zgnilizny  
ciała przeznaczają. Co się dotyczy szro-  
ków ratowania, wniczem się nie ró-  
żnią od powyższych, dodać tylko, że  
tu ani krwi puszczenie, ani też przy-  
kładania much hiszpańskich, bądź to  
w maści, którąśmy pod liczbą 25. prze-  
pisu lekarstw umieścili, miejsca mieć  
nie mogą, a to, aby się więcej do roz-  
rzedzenia krwi nie przykładaly.

Równie zdarzyć się może, że nie-  
które z potraw, równie szkodliwe iak  
użytek trucizn sprowadzają skutki a  
nawet i nagle zrzadzają symptomy, tu



należą iadowite grzyby, cuchnące iaia, ryby, mięsiwa nawet te, które od much lub innych insektów, pałaków były zanieczyszczone, cuchnące sadła, słoni-ny i t. p. Na te znowu przypadki służą im przedzety tem skuteczniéj wymioty, i na ten zamiar służy Nr. 2. w przepisach lekarskich umieszczony, a potem pięć kwaskowéj natury trunki, i te się już wyżej umieścily.

Zdarzyć się także mogą przypadki napicia się Szeydwaseru, kwasu siarczanego, solnego, tu znowu służą kleiowe napoje już podane, a nadewszystko rozcieg potażiu lub popiół, o czém się już wyżej nadmienilo przy użyciu arszeniku.

Nakoniec są niektóre rzeczy których użycie sprawić może palenia w drogach urnowych, rżnięcia przy icéj puszczeniu, a nieraz i z krwią icéj bolesne odpływy: temi są muchy hiszpańskie, maik, toiad mordownik (*aconitum napellus*) w tym znowu przypadku służą sztuczne mleka z migdałów, nasion ogórkowych, bani, kwaśna śmietana, serwatka ze słodkiego mleka, woda z nasienia lnianego, napoje kléy-kowate, półkapiela, to jest do pępka, gdyby zaś ten przypadek miał spotkać młodych, dobrze żywionych, używających napoiów rozgrzewających, po-

traw

traw korzennych, słonych i t. p. można i do krwi upuszczenia z ręki przystąpić, a nawet i powtórzenie uczynić, co iednak bez wezwania znawcy nie czynić, a przed iego przybyciem do użycia kamfory zalecanéj szczególniéj przez Hachnemana przystąpić, któreń ią stosownie co do wieku i okoliczności naglających od 2. do 4. ziarek na raz zsaletą czyszczoną na proszek tartą ziarek 10. co godzina z wielkim skutkiem aż do ustania tych przypadłości dawał, poczem iednak czas nie mały wstrzymać się potrzeba od używania po-traw i napoiów, które się nieco wyżej nadmienily.

Te są więc choroby nagłego ratunku potrzebujące, przy każdéj z niéy podane są liczne szrodki, które iak nie mają być razem użyte, iako raczéj iedne po drugich z znacznemi pauzami aż do nieodbytéj potrzeby ich zmiany, to jest użycia innych, dla tego lepiej jest mieć znościomość obszerniejszą, niżeli żeby w potrzebie miało na nich nie-dostarczać.

Koniec Rozdziałku Piątego.



## Obiaśnienie rycin i narzędzi ratunkowych.

### T A B L I C A I.

*Figura pierwsza*, przedstawia narzędzie od poradnika śledczem zwane, użytek tego jest bez najmniejszego uszkodzenia, szukać, natrafiać, utonione w wodzie ciało. Pojedyncze urządzenie, potrzebną długość drąga, rozłożystość ramieni, znajdujące się na ich końcach gałeczki dają łatwe jego poznanie.

*Figura druga*, są cęgi rozłożyste do wydobywania z wody ciała, za poprzedniczym przez śledczę wynalezionego.

*Figura trzecia*, też same cęgi, przywarłe zwykle się one przez swój ciężar do wody spuszczone otwierają, a zamknięcie skuteczniejszą kółko o. czyli błoczek, przy którym są umocowane dwa sznury, za ich pomocą kółko lub błoczek od u. do x. w górę posuniętym bywa, przez co następnie rozwarcie ramieni u. n. n. n. umocowanych przy tymże błoczku, zaokrąglenia zaś tych cęgów r. r. zbliżają się ku sobie, iak się widzieć dać na teyże rycinie, żeby się nie tak łatwo otwierały, konce obydwóch sznurów są okręcone około walcowego żelaza s. s. przechodzącego na drugą stronę drąga: n. n. n. n. są ramączka na swych czopach, za pomocą tych, słownie do potrzeby, mogą się cęgi rozszerzyć, zwężyć, sznury zaś od nich idą na swém kółku iak wyobraża x.)

### T A B L I C A II.

*Figura czwarta*, wyobraża drabinkę należącą w potrzebie do koszarowej łodzi, ta ma

swoie niemałe przeznaczenie, iakoż gdzie łód bywa słabym, kruchym, wnieiakiędy od utonionego odległości, w tenczas kładzie się na nią osoba ratująca, którą druga na mocniejszym jeszcze łodzi stojąca dalej popycha, za pomocą ruchawego i dłuższego od samęj drabinki drąga, co z tey figury łatwo dość można, ma ta drabinka nieco wysokość przy tylnęj części dla położenia głowy, powinna być z lekkiego, a do tego dobrze wysuszonego drzewa zrobioną, aby na przypadek załamania się, bądź z osobą ratującą, lub z wydobytym z wody ciałem nie tonęła, i owszem do łądu albo łodzi bezpiecznie mogła się dostać.

*Figura piąta*, są dwa bosaki z figury i wiadomego użytku dalszego objaśnienia niepotrzebują.

*Figura szósta*, jest kosz, przy którym są po bokach przymocowane drążki do niesienia ciała, które, żeby nie było przy włożeniu obrażonem, brzegi kosa są do koła zaokrąglone, od dna ma tenże kosz ligarki umocowane, dla łatwiejszego od ziemi ciała uniesienia.

### T A B L I C A III.

*Figura siódma*, przedstawia łódź ratunkową, zupełnie gotową i skórą powleczoną, jest koszykowę roboty z wici uplecioną, w środku znajdzie się czworoboczny otwór bez dna, takż koszykowę roboty, i skórą powleczone, mającą po bokach uszy, dla noszenia ię przez osobę ratującą do miysca potrzeby, a na przypadek w ciskania się w tenże otwór wody osoba ratująca schrania się do łodzi, udając się na siedzenie które w ry-



cinie dobrze widać, ma nadto ta łódka po obydwóch swych końcach przymocowane kółka, do ciągnięcia łódki, zwierzchnia jej od spodu długość wynosi 7 i pół, w górze 12. szerokość dna 3 w górze 4. stóp, opatrzona jest zaokrąglonemi bokami.

*Figura ósma*, jest łódka koszykowcy roboty bez skóry powleczenia.

*Figura dziewiąta*, okazuje spód téżże łódki przewrócony, na nim dają się widzieć przymocowane dwie żelazne sanie, zaopatrzone niemi ta łódź służy do posuwania jej po lodzie przez siedzącego za pomocą hosa-ka, na przypadek gdyby lód miał być chrapowatym; a do tego gdzie niegdzie tak górkowatym, iżby to posuwanie nie mogło być do skutku doprowadzonym, na takowe więc przypadki niesioną być ma przez osobę ratującą, co łatwo jest do wykonania przez otwór wyżey opisany, a któren tu w dnie łodzi jeszcze się widoczniey przedstawia, wszakże gdyby się miał i lód załamać, kolumna przez tenże otwór wpływającej wody broni od wywrotu łodzi, osoba zaś uduje się poza tenże otwór na miejsce bezpieczne dla kierowania łodzią.

Nadmienia tu poradnik, że dziełko, z którego ryciny te umieścić zapewnia, iż zaledwie dać wiarę można, nie będąc ocznym świadkiem, ile się do ratowania utonionych, co większa z pod lodu, wznacznę nawet od brzegów odległości, narzędzia te lodowodne jako i inne tu zamieszczone, do szybkiego, pomyślnego, utonionych ratowania się przyczyniają. Z powyższego zaś środków ratowczych opisu dla utonionych, i uduszonych i t. p. okazują się główne ich zamiary, z nich jest *Pierwszy*, przywrócić utracone życie

przez ciepło: *Drugi* przez wzbudzenie czynności serca i płuc, i na to służy mieszek. Doświadczenie uczy, że przyczynami do pozornej śmierci są: wstrzymanie processu oddychania, i brak w nich świeżego powietrza, z usunięciem tych przyczyn powracać zwykło życie, przez dodanie płucom właściwego bodca, którym jest świeże powietrze, powszechnie ku temu wpuszczamy z ust ludzkich, którego się sami z nich jako nieużytecznego i owszem szkodliwego pozbywamy, zamiast pomocy dość często złe pogorszamy. Daleko się bezpiecznię i skutecznię czyni, kiedy się na zamiar dodania płucom nowego powietrza, gdy to ile być może, czystem być powinno, a dla wzmocnienia tego skutku, wyciągnąć wprzód wstrzymane jako zepsute z płuc powietrze wypada, obu tak wielkim zamiarom odpowiada przemyslnie mieszka tego urządzenie.

### T A B L I C A I K.

*Figura dziesiąta*, jest podwójnie urządzoney mieszek, w środku znajduje się przedział, czyli przegroda z deszczki, przez którą oba te mieszki żadnego pomiędzy sobą w czynności nie mają związku, wszelako każdy z nich działając ma wcale oddzielne, iednakże pełne użytku zamiary. Przedział ten czyniąca deszczka oznaczoną jest a.) w każdej zaś powierzchney desce tychże mieszków, ich środku, znajduje się otwór b.) iak z wykl. być przy każdym zwyczajnym mieszku, zaopatrzone są wiatraczkami, albo powietrzeciągami, walcowa zaś część, czyli rurka, przez którą uwalnia się z mieszkow powietrze, znajduje się do puszkii czworogranney miedzia-



néy e.) umocowaną, wewnątrz której znajdują się drugie dwa wiatraczki, a te są aż do rurki prowadzącej powietrze przymocowane: rurka ta na swym końcu pokrywką jest zaopatrzoną, a wszelako tak urządzoną, że ma ruchawość łatwą, iakoż w czasie wyciągania powietrza w płucach znajdującego się jedna takowa rurka. w części jednéy tego mieszka bywa otwartą i nadętą przez toż powietrze, a która się unosi od powietrza z płuc wyciągniętego, kiedy z nową część tegoż mieszka w puszczaiąca z siebie powietrze do płuc, czyli jest napełnioną atmosferycznym, lub gazem kwasorodnym, ustępując w tenczas na stronę rurki, a przez ten mechanizm mieszka część uwalnia się z niego, aby powietrze, lub gaz, czym bywa też część mieszka napełnioną, przez kanał powietrzny do płuc wpuścić, uwolniło się. Przykrycie téj puszkii d.) które się za podłożeniem okrągłej skóry wszechowyywa, aby ściśle się stykało, ma podobieństwo do liyka, wiego szyi przymocowanym jest kanał z drótu kręconego wężykowato, powleczoney ceratą, e.) przez takowe więc urządzenie zawsze bywa otwartym na wzór cybuchów do lulek. Na końcu tego kanału znajduje się mała rurczka ze słoniowéy kości f.) ta może być na swym końcu zaokrągloną, aby nie obrazić wydrążenia nosa, wpuszczając ją do niego, lub też i być może płaską, chcąc takowéy do ust użyć na tenże sam zamiar, to jest wpuszczać z mieszka do ust powietrze.

Powietrzociągi są podobne iakle się znajdują przy nowych powietrznych pompach, to jest, że są urobione z uwinętey tafty, i tak umocowane, że iednoznaczność otworów w deskach mieszkowych jest w odwrotném poło-

zeniu. Jakoż, kiedy bywają oba mieszki napełnione, w tenczas otwierają się oba zewnątrz na wewnątrz, i z tych ieden znajduje się na boczny desce iednego mieszka; drugi zaś w środku puszkii, przy uyciu prowadzącej powietrze rurki drugiey części mieszka. Za pomocą tego urządzenia wciska się w prawdzie w oba mieszki powietrze razem, a które po nastąpieniu obu mieszków scisnieniu przez inne dwa powietrzociągi, które się zewnątrz na wewnątrz otwierają, znajdujące się w obu mieszkach powietrze uprowadzają. Oba te mieszki kończą się około wiatrociagn, ku dołowi w iedną główną rurkę wyżéy nadmienioną, i lubo przez takowe urządzenie ruch obojga mieszków zarazem się odbywa, przecie z opisanego tu mechanizmu powietrze na przemian wchodzi i wychodzi. Przy użyciu tego narzędzia, np. w prowadzając rurkę z kości słoniowéy wyżéy nadmienionéy w ieden otwór nosa, lub usta osobie ratunku tego potrzebującéy, w pierwszym przypadku, to jest do iednego nosa otworu, przywrzeć potrzeba usta wraz z drugim nosa otworem, kiedy zaś w same tylko usta, oba nosa otwory scisnąć należy, i takie jest narzędzia tego użycie przy wpuszczaniu powietrza, przy wyciąganiu zaś iego otrzymuje ieden mieszek za pomocą swego powietrzociągu znaczną część powietrza atmosferycznego, gdy drugi wyciąga z płuc w strzymane dotąd powietrze, a to za pomocą swego powietrzociągu przez ową rurkę sprężną, która się powyżéy opisała, jeżeli to postępowanie z ręczniami i ostrożnie razy kilka powtórzone bywa, na nowo płuca czynność swą rozpoczynają, wszelako czyniąc za nagle. za pośpiesznie toż w płuca powietrza wpędzanie,



daleko więcej uszkodzić można działaniom płuc, byłoby zatem arcy użyteczną rzeczą, ażeby znająca się osoba na mechanizmie oddychalnym tym się trudnić mogła, a gdy to wszędzie i zawsze być nie może, wpędzenie to powietrza powoli i z małemi nawet przerwami czynić należy. Chcąc to skuteczniey działać na przywrócenie oddychania, część jedną mieszka napełnić można przez poprzeczne gazem kwasorodu pęcherza wołowego wydecia, iak się widzieć daie przy fig. 11. i 12. narzędzie to poznać wypada. Figura 11. sama z boku przy mieszkui okazuje pęcherz wołowy napełniony kwasorodem, stosownie do fig. 12. umocowanym jest przy rurce długiey, w której znajduie się kurek (h.) koniec rurki opatrzonym jest nieiako szrubą, i ta się pierwey śrubuie do flaszki, z której uchodzi do pęcherza kwasoród, po napełnieniu przy- myka się kurek, i tak przywarto, do miesz- ka przyśrubowany, okazuię się przy fig. 10.

*Figura iedynasta*, przedstawia mieszek do dawania w czasie potrzeby dymnych z ty- tuniu onem, opis iest następujący, a daie po- znać metaliczną okrągłą puszkę, śrubuiącą się w środku, iak obręczka daie poznawać, i ta część iest tytniemi napełniona, ten wprzód zapalić, zaśrubować iey część wyż- szą, do której śrubuie się kanał nakrzy- wiony (b.) na końcu iego iest kanka (c.) sam zaś mieszek za ruchem rozrzarza tytuń, dym zaś z niego wpędzonym bywa do kiszeki.

*Figura dwunasta*, iest flaszka napełnio- na kwasorodem, lejąc więc przez leiek wo- dę, wypędza się boczną rurką z flaszki kwaso- ród do rurki, przy której iest przymoco-

wanym pęcherz, po napełnieniu iego przez kwasoród zamyka się kurek, przez co wstrzymuie się w pęcherzu kwasoród aż do swego użycia, októrem się przy figurze 10. mowiło.



## R O Ź D Z I A Ł E K VI.

*Apteczka domowa.*

Pragnąc uzupełnić dla cierpiących przeznaczone pisimo, porządek i potrzeba wymagały ułożyć takową apteczkę, aby po lekarstwa do miast czasem o mil kilka odległych nieposyłać, kiedy dość często im przedęy tem skutecznię zaradzić można, i zapobiec pogorszenia chorób, tym więc celem zamieszczam takową ze szczupłego, skutecznego, oszczędnego, pojedynczego, szrodków wyboru wraz z potrzebnemi ku temu z naiomościami, i te zaraz poznamy.

Do mięszania, cząstkowania niektórych lekarstw są pod ręką potrzebne.

- a.) Mozdierzyków szklanych lub kamiennych, ieden większy, mniejszy drugi.
- b.) Szalek rogowych dwie, iedne, na których można większe rzeczy, gdy drugie powinny być małe, i te już przeznaczyć wazeniu, począwszy od 2. 3. naywięcęy do 30. i 40. ziarek pieprzu.
- c.) Mieć także ciężarki (*pondera*) począwszy od uncyi aż do ziarków, te się zaraz objaśnią.
- d.) Kapsutków rogowych nie więcęy nad sześć do wysypowania nanie z szalek proszków, gdyby te cząstkować potrzeba

*Apteczka domowa.*

wymagała, nadto do tychże proszków wysypowania potrzebne są i papirowe kapsotki, różney wielkości.

- e.) Rogową łopatkę do obskrobywania przylegających do mozdierza proszków i nasypowania ich na szalki.
- f.) Mieć także od półkwatka do całej.
- g.) Należy także mieć pod ręką kilkanaście flaszeczek kwaterkowych, półkwatrkowych, gąsiorków pół do całego garca, te służyć mogą tak do moczenia w nich niektórych essencyi, iako i do przelewania tychże.

*Przeestrogi.*

- I. Imo. Naczynia te wczystości zawsze, po każdym którego z nich użyciu, utrzymywać należy.
- II. do. Korzenie, zioła, kwiaty wonne, potrzeba dobrze w zachowaniu utrzymywać, aby z utratą ich wonności nie stały się mnię użytecznemi.
- III. to. Całą zaś apteczkę trzymać w mięyscu; gdzieby słońce nie zagrzewało lekarstw zbytecznie, toż samo się rozumie o suchości iego, w wilgotném zalechają i stają się do brania obrzydliwemi, do tego i łatwo zepsuciu ulegają.



## Ważki Ciężarki i Miary Lekarskie.

	Uncyæ.	Drachm.	Skrupul.	Ziar. piep.	Miary.
Funt lekarski wynosi	12				
Uncya iedna		8			
Drachma iedna			3		
Skrupul				20	
Kwarta wody wynosi ciężaru	24				

W domowo lekarskim użytku ciekłości mogą być mierzonemi do robienia różnych moczeń, warów, lub też naknieć essencyi, gdy te wszystkie przy przepisach lekarskich umieszczone zostały.

Co się dotyczy płynnych lekarstw jako i suchych chemicznie przygotowanych, gdy niektóre z nich w sobie ulotne wonności utrzymują, lubo z nich szczupłą liczbę w małej ilości nie odbicie potrzebną umieścić, takowe wypada ciekłości w flaszeczkach z szlifowanemi czopkami, a przynajmniej korkowemi, jak najlepiej pęcherzem obwinięte, suche zaś w słoiczkach także zatkane i pęcherzami obwinięte, w miejscu chłodnem, nie wilgotnem, utrzymywać.

Przystępujemy do szrodków siły wzmagających, a że skutkowania ich zawarte są

w pierwiastkach odżywnych, od tych więc zaczniemy, dając poznać, że czuwająca nad nami opatrność nadała im przymioty, skutkach których ożywiając nas, służą razem i za najsilniejsze szrodki siły wzmagające, i takowe utrzymujące, że bez nich nie zgoda w usiłowaniach ratowniczych na pokonanie chorób dokazać, nie jesteśmy w stanie.

Najżywniejsze, najpowsze, lniejsze nawet, na którychby w chałach pracowitych rolników żywać nie powinno, a gdyby na niektórych zbywało, przecie możnych być powinno z prawa ludzkości obowiązkiem, w czasie choroby w takowe ich zaopatrzyć.

Rosół z wołowego mięsa drobiu białego mięsa, tudzież na przypadek, mieć sucho buliony, te mogą być z wielką oszczędnością robione z kości wołowych, zwłaszcza długich lubo sposób ich gotowania nie należy do pisma tego, wszelako znajdowałyby się powinien prócz kuchennej potrzeby i do tego zamiaru, iakoż rozpuszczony kawałek jego w wodzie wrzącej, na pręde udzielony chorym, dziwnie siły wzmagają.

Do klasy odżywnych szrodków, należą takż iia świeże kurze, gęsie, kaczki, najstrawniejsze są ich żółtka, nawet surowe, i te użytemi być mogą w znacznych słabościach bez najmniejszej obawy, gdy z białkiem miękko gotowane mocniejszych sił żołądka do strawienia potrzebną.

Mleko jeżeli bez przykrości i zrzędzenia wiatrow, biegunki znoszonem bywa, dziwnym prawie zażywniającym jest szrodkiem, iakoż gdzie potrzebna dyetla, która żywić nader umiarkowane wzruszenia krwi sprawowuje np. w krwi płucach, biegunkach krwawych, febrach zapalnych, gorączkach



silnych umłodych, krwistych, używających trunki rozpalające, prowadzących żywną dyetę przy powiększonéj sile żywotniéj w chorobach wymienionych, samo przez się, jeżeli nie jest gęste, a to znówu rozcieńczyć można wodą na w pół z mieszaną, tak daie napój przyjemny siły utrzymujący, i z tégj własności jest oraz i środkiem lekarskim, służy nadto w zatruciach, przy użyciu ostrych, słonych, korzennych przypraw i napoiów rozgrzewających nadużyciu, z tymże samym skutkiem co sztuczne mleka z migdałów, bani, ogórków, konopnego nasienia, maku, robione:

#### *Smietana słodka i kwaśna.*

Ohie iako żywności uważać należy, jeżeli i tych użycia w stanie zdrowia znoszone nie bez żadnych przykrości były, równie w powyższych chorobach i stanie powiększonéj siły żywotniéj, słodka, rozcieńczona odwarem zięcznienia, iak druga do smarowań oparzeń, ogniopiór po przyłożonych synopizmach, plastrach z młuch hiszpańskich, zastępuje inne plastry i maści.

#### *M a s ł o.*

Tak do użytku odżywczego lekarskiego, iako i powyższe, do ostatniego zaś być powinno, niesłone, świeże, a roztopione w mleku wolnóm służy do enem w zatkaniu stolca, wzruszenia wymiotów, gdy tych potrzeba wymaga np. przy użyciu potraw niestrawnych, nadużycie inszych, iakimi są, grzyby i kwaśne potrawy, w miedzianych naczyniach, z których pobielanie zniszczone, gdy te są w nich trzymane, roztopione zaś samo

dzielnie służy na usmierzenie boleści, smarując nim żywot co parę godzin.

#### *Oléy Lniany i Makowy.*

Maią takóž powyższe co mleko, smietana, przymioty odżywe, rozmiękczaające, boleści usmierzaające, im są świeższe, tem są skuteczniejsze do zewnętrznego i powierzchownego użytku lekarskiego, którenkolwiek z nich pod ręką się znajdzie, wzięwszy np. pół kwaterek rozbić żółtka świeże dodając do nich po trochu oleju, przy-nienastanném mieszaniu pół kwarty wody osłodzonej miodem czystym, cukrem, do upodobania po łyżce 1. 2. co parę godzin, tak użyty i żywi i goi obrażony żołądek, kiszki, bądź to przez powyższych potraw użycie, lub po nadużyciu trunków rozgrzewających. Służą równie i do powierzchownego użytku, gdzie nie ma pod ręką innéj maści, letnio ciepło użytym być powinien do smarowania części oparzonych, ukąszonych od owadów, iako to: pszczoł, oss, węży, zmij, można z niego na tenże użytek robić w następujący sposób smarowanie, wzięść z nich półkwatki 2. 3. białka od iaja, na pianę w przód ubić, domieszczyć nadmienioną oleju ilość, potem rozciążyć czyli rozrzedzić mlekiem, smietaną kwaśną lub i słodką, i tą mieszaniną nasmarowane płatki z płótna na części oparzone przykładać, co często mianowicie w pierwszych dniach powtarzać należy: do dawania enem przydawanym bywa, a nawet i sam zwolniony w małej ilości przy upartych stolcach zatrzymanych.



## Z roślinnego wydziału.

Należą kasze ięczmienna, owsiana, orkiszowa, perłowa, ryż, korzenie klej wsobie mające, iako storczyk kukawka, salepp, slazu swoyskiego, prócz innych wielu do oddzielnego dziełka należących, przestając na tej ilości oprócz użytku zwykłego pokarmu przysługują się: ich kleje nawet za napój w chorobach, iakoż usmierzaia pragnienia, gorączki, wzruszenia febryczne, boleści w żołądku, kiszkach, a mogą iakoż służyć do okładań, enem. Z użytku tu położonych artykułów przekonać się możemy, i ów to szrodek w szpitalach porządnym znajdujemy pokarmów a razem i dzielnie służących lekarstw.

## Owoce i Jagody.

Pierwsze, równie ogrodowe iako i dzikie, suszone stanowią i posilek i lekarstwa, tu należą gruszki, jabłka, sliwki, a że użytek ich jest wiadomy, dodaje że napoje z nich w gorączkach, głowy bólach, piersi, krwi płucach, biegunkach, i dysenterjach; dzielnie z równym skutkiem służy kwaśnica (*berberis*) żurawina, a i te zasługują, aby się między temi szrodkami znajdowały.

## Cukier, Miód.

Jest ważnym w Apteczce domowój artykułem, prócz robienia z nim niektórych proszków, osłodzenia lekarstw ciekłych, np. mixtur, sam przez się rozpuszczony w półkwarcie wody łot. lub: powoli pity ochładza po zagraniu się, zaspokoia wzruszone nerwy, dopomaga trawności żołądkowi czyli to

to przez nadużycie potraw czyli leż i tłustych, rozpuszczony w wodzie na proszek tarty lub po kawałku żuty, rozrzedza śleginę w żołądku, w płucach i ułatwia iey wyrzucanie.

Po nim także użytecznym i potrzebnym jest miód, otrzymujący przymioty podobne do cukru, a tem więcej im bywa od swych woszczyn, woni i smaku, uwolnionym w sposób następujący, np. wziąć fontów 10. zwykłego miodu, rozrzedzić go z 10. częściami wody czystej, zagotować w kociołku, zbierając szumowiny iako naylepię, dodając kredy tartej w gotowaniu, przy ciągłem mieszaniu, pokąd papier niebieski często w nim maczany koloru nie zmieni, co oznacza, że kwas przyłączony do miodu zupełnie z obojętnionym został, do tego wszystkiego dodać i 1. i pół funta twardych węgli, ile tylko być może iako naylepię wytłonych, a potem grubo przetłuczonych, z niemi tak długo gotować, dopokąd i wonia z woszczyn zupełnie się nie ulotni, przepuszcivszy to wszystko przez worek wełniany wprzód dobrze wygotowany, i wysuszony, wodą wolną tenże splukiwać pokąd tylko słodki smak zupełnie z płokanym nie zostanie, dopiero to do gęstości syropu gotować, a tego można na miysce cukru używać, gdzieby wolnych laxowań nie zrządzał, w tym bowiem skutku osłabienie chorego zrządzić mogący, już użytym być nie powinien.

## Wino, Wódka.

Oba te napoje, ile że się nie ma rozumieć o drogich, znajdować się w domowój Apteczce powinny, są one wistotnéj potrzeby, w umiarkowaney ilości użyte, tak zewną-



trznego iako i wewnętrzznego przeznaczenia nader dzielnymi szrodkami, iakoż w smutkach różnych, alteracyach, w słabościach, w pozostałych po chorobach niemocach, pożywe, dwie, co parę godzin dawać, czy pierwsze czy drugie, stosownie do możności ich mienia, podnoszą zwątloną siłę żywotną, obmywania niemi ciało, nieco zwolnieniami, raz 2. dniem, téż same skutki okazują.

### *Oceł winny.*

Dawniey zwinnych jagód do nas wprowadzony, dziś powiększey części z owoców ogrodowych, a nawet i leśnych, w niczem winnemu nie ustępujący, robionym u nas bywa, prócz kuchennych potrzeb, i w apteczce domowey wilości wystarczającsey znaydować się zawsze powinien. Wonność jego miła z przyjemnym, kwasem daje mu pierwszeństwo nad piwny miodowy. gdyby i te w potrzebie iako zastępcze użyte być mogły, zwłaszcza kiedy są mocne, jego skutki są te: uspokoić krwi wzbudzenia rozciężony wodą do miły kwaskowatości: lekko drżaźni układ nerwów, wzruszenie jego usmierzają, działa na poty, pędzenie moczu, służy takż dzielnie w przypadkach zatruciów przy użyciu roślin odurzających, iako to: szaleciu i t. p. z pożywą zaś wody zmięszany służy do okładania części ciała, które przypadkiem uderzenia, przyciśnienia, stłuczenia doznały, domięszawszy do moczeń np. pod lezbami 9. i 11. służy w zgnilych febrach, w nerwowych gorączkach, do płókań zapalonego gardła, dodając tenże do moczeń bżowych kwiatów, aby kwaskowo smakowały, w czasie młodości skuteczniey służy do ocucenia nad same pachną-

ce wodki, dając tenże wachać, skronie zaś ręce i nogi nim nacierać w czwartey części do wody trzech części uwolnić uparte nader stolców wstrzymywania, przeznaczając na enemy, do obmywania całego ciała zwolnwszy w przed raz 2. 3. na dzień, w powyżey nadmienionych chorobach, równie wtychże samych służy skrapiając nim pościel, iako i podłogę w izbie chorego, i tu on nader skutkuje w ten sposób użyty, lepiej niżeli iak jest zwyczaj kadzenie na duszy żelaznocy, lub cegle rozpaloney nie udzielając bynajmniej powietrzu izby przepaloney woni którątém bardziej zanieczyszczają: domięszany do miodu, i robienie z nim tak zwanego *ocłu miodowego*, któren w przepisach Nr. 13. umieszczony, służy do napoiów, do płókań zapalonego gardła, moczona w nim gorczyca, chrzan, przeznaczone być mogą do nacierania świeżo zparalizowanych części, do robienia z nich plastru gorzycowego, w przypisach Nr. 17. i 18. można równie w nim moczyć maliny, pachnące zioła i t. p. i takż na liczny użytek w nadmienionych tu potrzebach używać. Z opisu jego dzielnych skutków, z których wieleby pomnożyć można, przekonają się czytelnicy dziełka tego, że oprócz potrzeb kuchennych, ten to sam szrodek mając tak dzielne skutki, ze wszęch miar zasługuie, aby na nim nigdy nie zhywało.

### *Woda zimna, Ciepła.*

Uważane za szrodki lekarskie z ich skutkowaniami obznaymić wypada, a nayprzód zimną, ta im może być zimniejszą tem jest pomocniejszą, służy do przykładania na wszelkie obrażenia części, które przycisku, uderze-



nia, wzruszenia doznały, rozpędza dzielnie nabiegania krwi i innych soków przy nadmienionych zdarzeniach, a to czyniąc, otrętwia czułość obrażonych w ten lub ów sposób części, znosi zapalenia.

Skrapia się nią twarz mgiejących, u dziecka w pozorncy śmierci na świat przybyłego dołeczek serca zlewa się, głowę, lub na nią przykładą się gębka wnięty maczana: w zapaleniach mózgu, w nagromadzeniu się do niego krwi, w szkarlatynie mianowicie przy przytomnych małaczeniach, twarzy czerwonej, i wleczas można albo umaczaną w nięty gębka często głowę ocierać lub też i polewać często, to okazuje, że wzbudza siłę żywotnią, zmniejsza drżaznienia skutki, otrętwia umiarkowanie, drżazliwość i do czynności naczynia krwiste, i wodniste wzbudza. Napój ten natury jest ieden z nayszdrowszych, należałoby wcześniej do niego przyzwyczaić się, aby późnięć niestudził ciepła żołądka, przez co by trawność mogła się opóźniać, rozdęcia żywota, i wiatry zrządzić, służy zatem dla młodych krwistych, dobrze żywionych, wszelako iak niema żadney reguły bez wyjątku, tak się ma rozumieć i o picciu zimney wody, gdy tę używamy obficie przy iedzeniu lub zaraz po niem, gdzie niemoże iak uszkadzać trawność służy przecie miernie pita w godzin 3. 4. po iedzeniu, i wleczas dopomaga rozrzedzeniu pokarmowey cieczy (*hylus*) oprócz tego spłókuie z soków ludzkich ostrości, i nie dopuszcza silnie utworzenia się skorbutowi na nosie, lub innych po twarzy wyrzutów, czego doświadczaia nader z szczupłego ięć picia. Nieprzyzwyczajonych należy z wolna przyzwyczaić, tak iak jest nayszdrowszym napojem, wszelako po zmordowaniu się, rozgrzaniach

hywa nader szkodliwą, iak muięć służącą dla flegmatycznych, do wiatrów skłonnych, dla podeszłych w wieku, i owszem dla nich stać się może szkodliwym ięć nader obfite użycie studząc resztę pozostałego ciepła żołądka rozwalnia iego błony, rozrzedzoną zbyt pokarmów ciecz czyni, przed to do obrzumięć nóg, twarzy, a nawet i całego żywota opuchlin przysposabia. Lubo zalecaia kąpiele z zimney wody na różne słabości, gdzie się przysługuię dzielnemi skutkami, zwłaszcza u młodych dobrze żywionych, z tém wszystkiem użycie ich odsyłam do znawców sztuki lekarskię.

Ciepła oprócz że służy do obmywania dla utrzymania w czystości ciała, przez co dopomaga, im jest ciepleyszą, w chorobach do ułatwienia przeziwów skóry, nawet i samych potów z któremi pozbywa się natura chorobliwych pierwiastków, a przeto dopomaga do ozdrowienia. służy ieszcze do wzniecenia wymiotów obficie pita sama, kiedy skłonność do nich przez ekliwość się okazuje, w czasie użycia znowu szkodliwych rzeczy lub nadużycia potraw, napoiów, ich mięszaniny, te są więc w szczupłości zebrane ięć skutkowania.

*Gorzycza, Chrzan, Cebula, Pieprz.*

W kuchennym użytku są znane, przysługuię się do zdrowia, iakoż do strawienia potraw twardęć nawet natury żołądkowi silnie dopomagaia, drżazniać tenże ruch kręty ciepło iego przymnażia. Na powierzchniowe przeznaczenie, gdzie wypada prędsze niż przez muchy hiszpańskie któreć części ciała ludzkiego uczynić drżaznienie, za którego skutkowaniem silne boleści nieraz i niebez-



pieczeństwem życia grożące uśmierzonem bywają, iakoż w tym zamiarze w przepisach środków ratowczych Nr. 18. są umieszczone. Lecz dodaję przestrożę, żeby tylko do lekkiego skóry zaczerwienienia leżały, wszakże to uczyniwszy stosownie do potrzeby, można powtórzyć ich przyłożenie, na témże miejscu lub odleglejszych częściach. Moczone w occie służą do nacierań części paraliżem tkniętych, lub i całego ciała w przypadkach wstąpienia wyrzutów, odry, szkarlatyny i t. p. gdzie co półtorej godziny zwoleńszy nieco powtarzać i niebezwiekliego użytku radzę. Nadto moczone wrościeńczońcy wodzie czystej po łyżce, 2. razy kilka przez dzień używane pędzi mocz w obrzmieniach, w opuchlinach po febrach, a nawet tymże sposobem użyte dzielnie i wszkorbucie pomagają, można rozcieńczywszy wodą dziaśła płókać. Sam zaś chrzan w płaskie kawałki pokraiany, przymocowawszy obwiniciem płóciennem, przykładac za uszami, na rękach, w czasie bólu zębów z zaziębień pochodzącego, gdzie równie i na dziaśłach czynić można, aby się nieznaydowały w stanie zapalenia.

### C e b u ł a.

Oprócz kuchennych przypraw, którym dopomaga do strawności, przecie ma własność wzbudzenia wiatrów, odęcia żywota, odbicia, niesłuży dla uległych tym cierpieniom, dla chemoroidycznych, służy jednak jako środek dla flegmatyków mających powolną trawność, powierzchownie zaś pierzonna, przetłuczona, zmieszana z sadłem i dodatkiem lnianego nasienia, mąki żytniej, chle-

ba pyłowego i nieco miodu, jak kataplazm przyłożona, uparte twarde wrzody do ropienia doprowadza, służy nawet w mgłościach do wężania, gdzie mieć nie można innych środków.

### P i e p r z.

Pieprz pomimo użycia do kuchennych przypraw, cały lub na proszek utłuczony; gule w ostatniem przygotowaniu daie swę moc rozgrzewającą nawet w ustach uczuwać; wątpić nie należy, że tę samą własność i w żołądku zrządza, iakoż po jego użyciu doświadczaamy pragnienia, cały zaś po ziarek 6. do 10. polykany i długo tym sposobem używany, jest ieden ze środków najlepszy do wzmacniania żołądka, zaraz po obiedzie wzięty. Nie zbywa na doświadczeniach że wuporczywym, ciągłym apetytu niedostatkowi, przy częstych wiatrów napadach, w opieszałem trawieniu, w zamuleniach żołądka flegmistycznych, i z téj przyczyny kaszlach pochodzących, swą dzielność potwierdzał.

### M y d ł o, E / Ź g.

Jle ma służyć na użytek lekarski niepowinno być stare, gorzkie, białe zawsze jest lepsze, i na niem zbywać niema w domu, iakoż wziąwszy z niego ziarek 4. do 6, rozpuścić w moczeniu kwiatu lipowego łyżkach od iedzenia dwóch, osłodziwszy dobrze cukrem, dawać po małej łyżeczce od kawy dzieciom sześćcio tygodniowym przy piersiach, usmierz kwas żołądkowy, wstrzymnie wymioty pokarmu zwarzone, usmierza boleści w żywocie, wiatrów i stolca odeyscie zrządza i



w tém przeznaczeniu można tego szrodka część ósmą do całej proszku dzieciennego ilości, Nr. 1. dodać dla starszych wziąć łót 1. 2. do kwarty wody rozpuścić, osłodziwszy miodem, cukrem, brać z niego po łyżce i dwie naraż co pół lub godzinę, stosownie do boleści w przypadku zatrucia, lecz branie to mlekiem obficie popijać należy. Lżeysze to mydła białego rozpuszczenie *np.* łót jeden do kwarty wody także po łyżce od iedzenia co parę godzin dopomaga w upartem stolca wstrzymaniu, równie iak służy do brania eniem z odwaru rumianku, kleiu z kaszy ięczmienney do okładania żywota w czasie iego twardości przez wstrzymanie kilkudniowe stolca, służy także i do kąpieli, gdzie może być łótów 3. 4. do 8. wziętym, a rozpuszczenie *np.* łótów dwóch w półkwarty wody dzielnie, szwędzenia skóry znosi, obmywając razy 2. na dzień całe ciało, lub dokuczające od niego części. Na przypadek gdyby się w domu nie miało znajdować, zastąpić może w nadmienionych tu potrzebach.

Ług czysty z twardego drzewa, a ten iezeli jest tegi, żeby na nim iacie pływało, kropel 10. 15. do dwóch łyżek wody w tymże zażywać co powyżey czasie, popijając obficie mlekiem w zatruciach, a łyżkę pełną do półkwarty wody przeznaczyć można na iedną, bądźto z odwaru kwiatu rumianku, lulanego nasienia, lub kasz klęczy mających, robioną półkwaterek zaś enemą na garniec wody do obmywania ciała, a kwaterek do kąpieli.

### Rozmaite szrodki należące do Apteczki domowej.

Borax wenecki.

Hałun czyszczony.

Krochmal.

Kamfora.

Kamień winny.

— Antymonu.

Korzeń dzięglu.

— rumbabarum cały.

— — w proszku.

Kwiat tranku górnego.

Korzeń kozłku.

Święto Jańskie ziele.

Judycki wirginiański w proszku.

W zastępstwie téy kosztowney rośliny korzenia z równymże skutkiem służy i korzeń naszego krwawniku, aby tylko przed lub po zupełnem okwitnieniu był wykopywanym, w cieniu suszony, w naczyniu dobrze opatrzonem, przechowywanym: patrz w wyborze roślin Str. 101.

Jpekakuana.

Magnezya Angielska.

Miód czyszczony.

Muchy Hiszpańskie.

Oleý łniany świeży.

— Makowy.

Oleiek przekroplany z miętki polney.

Oleiek z kopru włoskiego.

### Uwaga.

Oba te oleyki w małej ilości dobrze zatłaczanych flaszeczkach na zimno trzymać, ina-



częć wonia ich ulatnie: gęśnięć i stać się  
mnieży użytecznemi.

Powidła bżowe.

— Jąłowcowe.

Saletra czyszcżona.

Rozciek Ammonij wodny.

Siarczyk Antymonu.

Sól Glaubera.

— Ammoniaķu.

— — Żelazem.

Węglan ammonij prosty.

— — Z oleiem przepalany.

### Odżywne.

Nie może być choroba uleczoną bez  
wzmagania sił żywotnych natężonym cię-  
głym, tem bardzieży kiedy też w procesie cho-  
robliwym wyczerpanemi zostały.

Z tego to względu pokarmy, iako isto-  
tę gospodarstwa zwierzęcego zawsze stano-  
wiące, zasługują być w pierwszym rzędzie  
szrodków lekarskich, bez nich leki nie nie  
dokazą.

Na ten więc zamiar, służą rosóły zdro-  
biu białego mięsa, cielęciny, wołowego, ale  
te być niepowinny tłustemi, osolonemi zhy-  
tecznemi, ani korzennemi, gotując takowe,  
dodać należy marchwi, pietruszki, selerów,  
bez innej włoszczyzny, a to dla uniknienia  
wiatrów, które sprawi zwykły kapusta  
włoska, porę i t. p. Latem nie powinny  
być dłużej trzymane nad godzin 12, wzi-

mnem przechowywane mieyscu, po tym to inż  
czasie kwaśnięć, mogą stać chorymi szko-  
dlewemi.

Byłoby arcy użyteczną rzeczą dla rolni-  
ków naszych, czeladzi domowych, trzymać  
w pogotowiu tak zwany suchy wyciąg czyli  
bulion, i tenże robić z kości wołowych  
wszystkich wyjąwszy żebra. Sposób robienia  
umieszczam. Weźmie się nadmienione ko-  
ści ile być może drobno przetłuczone, z do-  
dankiem wyżey nadmienionych ogrodowin,  
nader powoli a długo gotować szumując, na  
jedne kości można 2. 3. razy świeżey wody  
do gotowania dodawać, po ostatniem odgot-  
owaniu przecedzić i wspólnie też rosóły zław-  
szy zastudzić dla skrzepienia się tłustości,  
którą wprzód zebrać należy, aż do gęsto-  
ści kleju zwyczajnego na powolnym ogniu  
parować, aby się nieprzypalił, a resztę wil-  
goci z niego w naczyniu kuchennem czystem  
nieco masłem świeżem wysmorowanem dla  
łatwego wydobyćia iey, w piecu piekarnym  
po chlebie należycie wysuszyć i tak na uży-  
tek zachować. Zaledwieby wierzyć można, ile  
1. 2. funty tych kości galarety świeżey, lub  
i samego i suchego wyciągu dać, wszakże to co  
się z kuchni wyrzuca, wydać produkt uży-  
teczny, którego wdzwiganiu sił wielkich do-  
znaiemy skutków. Na kwaterkę wody dosyć  
jest łót ieden, zagotowawszy do rozpuszcze-  
nia inż jest gotowym dla osłabionych, cho-  
rych, dając im na posiłek podług potrzeby.  
Do tęy klasy odżywnych szrodków na-  
leżą i iaja kurze, kacze, gęsie, aby tylko  
świeże, żółtka od nich są istotnie żywiące, i  
do strawienia łatwiejsze od białków.



Takoż mamy w roślinach skuteczne pożywności. i temi są posiadające kleie, tu uuleżą kasze: owsianna, igczmienna, orkiszowa, ryż, a kleie z nich dziwnie siły wzmagają, są i inne równie rośliny takóŜ posiadające kleie, tu należy korzeń ślazu swojskiego, liście, a nawet i sam kwiat, prócz innych wielu, mogące i te być przeznaczonemi za napóy na odmiąg.

### *Szrodki lekarskie z ziół.*

Namieniłem w prospekie do tego pisma, takó i zastrzegłem, a tu powtarzam, że wybór roślin krajowych do Poradnika domowego będzie potrzebnym, czytelników do tegoŜ dziełka odsyłam, znajdą w niem wyszczególnienie chorób, pojedyncze rośliny, lub tóż i przepis złoŜonych, uŜytek, przez które dzieł nie leczonemi bywają, tu już więc żadnego powtarzania czynić nie widzę potrzeby, a co znowszych krajowych roślin dostrzegano skutków, takó to: porostu dachów, scian starych, kory z'cieremchy, te są umieszczone między przepisami lekarstw Nr. 12. z czeremchy, Nr. 31. odwar porostu ściennego niemniéy babka wodna, kurzy ślad czerwony przy w sciekli-znach.

### *Przepisy lekarstw.*

#### *Nro. I.*

##### *Proszek dla dzieci.*

Magnezyi Angielskiéy.

Proszku korzenia siatkowego.

— każdego po drachm dwie.

— rumbarbarowego pół drachmy.

Szafranu ziarek sześć.

Cukru białego półtory drachmy napuścić na niego.

Oléyku kopru włoskiego przekroplanego kropli sześć.

Wszystko zetrzyć na proszek, zmięszając najlepší, zachować w miejscu chłodnym w słoiku lub flasce dobrze zatkanym długo się utrzymuje. Proszku tego można kazać zrobić i przez półowę, gdzie się znajdują dzieci przy piersiach lub i starsze, do lat 2. znajdować by się powinien: dla wzmocnienia skutków, którym się przysłuŜnie, dodać do niego można i mydła, patrz artykuł ten powyŜey.

### *UŜycie.*

Przy piersiach dzieciom podług potrzeby co 2. 3. godziny nakoniec noŜa, w pokarmie rozmieszawszy dobrze, na łyŜce dać zażyć z pokarmem, lub rumiankową herbatą osłodzoną popić, starszym zaś po pół łyŜeczki od kawy.

#### *Nro. II.*

##### *Proszku z ipekakuany.*

Cukru mialkiego równe części np. po drachm: dwie zmięszać w moździerzku razem, i takóŜ w naczyniu szklaném dobrze zatkaném zachowywać.

### *UŜycie.*

Dla dzieci przy piersiach dosyć jest odważyć na raz ziarek dwa, dla półrocznych do



3. kwartałów ziarek 4. tymże co powyżej sposobem dać zażyć, wszakże iak się zdarza, że ta ilość razu pierwszego zażyta nie zrzadza wymiotów dwóch, trzech, w parę dni bez obawy brania te z dodatkiem jednego ziarka powtórzyć, a dla starszych nad rok do 4. lat ziarek 6. do 8. dorosłym zaś do 20. i 30. ziarek włożyć wody zimnej: przy następujących zaś nudnościach poprzedzających wymioty dać ciepłą wodę, lub rumiankową herbatę pić, aby łatwiej mogli wonitować.

Na ten zamiar wymioty sprawujący dla starszych, od lat 15. i t. d. służy iako mocniejszy skutkujący środek, gdzieby powyższy miał być za słaby, następujący.

Wziąć kamienia winnego antymonowego ziarek 4. rozpuścić w łyżkach 8. wody ciepłej, i dawać na raz od pół do całej łyżki np. co godzina aż do wzbudzenia wymiotów, a te gdy nastąpią, z braniem w strzymać się i ożekiwać: jeżeli więc wymiotów nie nastąpi, wtenczas można jeszcze jedną łyżkę wziąć i przestać na trzech do czterech wymiotach, przy użyciu tego środka także pić często wodę letnią i lub herbatę rumianku potrzeba.

### Przestrogi.

*Pierwsza*, gdyby wypadła potrzeba podług chorób w części tej umieszczonych dać na wymioty, a właśnie w tenże sam czas miały biegunki panować, użycie tego środka nie służy, ale raczej powyższego proszku, iako wymioty sprawującego, bynajmniej się do biegunki nieprzyczyniającego i owszem, ile też niebysza zaniechywaną przez zrzadza-

ne wymioty takową iak najskuteczniej wstrzymuje.

*Druga*, mieć także wzgląd potrzeba, czyli chorzy potrzebują czynić wymiotów, nie mają kify takową pierwszy iak należy wprzód opatrzyć wypadu, aby dalej się przy nich nie powiększyła.

### Nro. III.

Goryczki zołci ziemnej.

(*Gentiana centaureum*).

Korzenia z goryczki krzyżowej.

(*Radix gentianae cruciatæ*).

Kudlika goździkowego.

(*Radix carophilatae*).

Kalmusu.

Każdego po uncję 2. dobrze pokraianego zmięszać i nalać czystej wody kwartę dwie, wódki ile być może czystej kwartę potażu czystego pół uncyi, moczyć w piasku ciepłym w gąsiorku przez godzin 36. przecedzić, wlać, i gąsiorek zatkać.

Użycie w dniach wolnych od zimnicy brać dla starszych po łyżce od iedenia, dla młodszych półowę co 3. godziny i popić czystą wodą, ponieważ zimnicę przerywane dość często w leczeniu są upartemi, następujący przepis w zatraceniu takowych udziela, gdyby powyższy środek nieskutkował dostatecznie.

### Nro. IV.

Do powyższych korzeni tęż ilość dodać Kory wierzby łoziny.

Porostu dachu, i ze wszystkiemi tak co do robienia sposobu, iako i brania, postępować iak pod liczbą 3.



## Uwaga.

Cheąc skuteczność téy krajowéy kory z kosztowną zamorską chiną porównać, potrzeba ją zbierać z niestarszych nad dwuletnie gałązek i w cieniu suszyć, bądź to do tego moczenia, lub i następnego użycia, kore jako i porost scian, dachów, ususzone, w móżdżerzu utłuczone przez sito subtelnie przesiane od pół do całéy drachmy osobno, rano i pod noc w dwóch łyżkach wody dawać, osobliwie w dniach wolnych od zimnic, a cheąc te proszki dla żołądka strawniejszemi uczynić, do każdego dodać olejku Anyżku, lub kopru włoskiego po kropki dwie, zmieszawszy dobrze, w téyże ilości wody zażyć, i rumiankową herbatą popić.

## Nro. V.

Wyciągu (*extractum*) z soku piołunu ziela wygotowanego uncją iedną.

Solanu Amonij z żelazem drachm dwie.

Wody czystéy kwaterkę, rozpuścić w móżdżerzu i w lać do flaszki.

## Używania.

Zamieszać i brać począwszy od łyżki od iedzenia do dwóch naraz na dwie godziny przed, w 4. po obiedzie, jeżeli godziny te są od napadów zimnic wolne, inaczej przed niemi na godzinę, i po ustaniu zupełnem gorączki, popiiając ciepłą wodą czystą.

## Uwaga.

Przepis ten służy na zatracenie czwartaczek, które ze wszystkich przerywanych zimnic w leczeniu bywają nayuporczywsze.

Nro

## Nro. VI.

Magnezyi Angielskiéy drachmów dwie.  
Kamienia winnego.

Cukru twardego białego po pół uncyi.

Zetrzyć na proszek miałki w móżdżerzu i do użytku wsłoyku zawiązanym przecho-  
wywać

## Używanie.

Co parę godzin brać po łyżeczce, lub téż po drachmi w wodzie, mieszając w naczyniu prędko, aby w swoim okazującym się burzeniu był zażyty, i niewiele wody do popiiania potrzebować, może tenże proszek być robiony bez cukru.

## Nro. VII.

Ałunu czystego uncją iedną, zetrzyć na miałki proszek.

## Używanie.

Po 20. pieprzu ziarek do pół drachmy w dwóch łyżkach wody rozpuścić i co parę godzin wypić, popiiając klejem z kasz, lub klejem z ośrodka białego chleba. Oznaczone tu doze brać o tymże czasie lub i co półtory godziny, przy znacznych krwi płuciach bez tego przypadku dosyć jest branie iego po 10. ziarek naraz co parę godzin w chorobach, do których jest wskazanym.

## Nro. VIII.

Bzowych powideł uncją iedną.

Saletry czyszczoney drachmą iedną.

Część II.

51



Wody czystéy kwaterkę.  
W moździerzu rozpuścić i dodać.  
Octu miodowego uncyą iedną.

### Używanie.

Za każdym zażyciem zmięszać dobrze,  
po łyżce od iedzenia co parę godzin brać, i  
popiwać bżowym kwiatem.

### Nro. IX.

Korzenia kozłka.

— Dzięglu pokraianych drobno.  
Każdego po pół uncyi.

Wody czystéy wrzącéy półkwarty, mo-  
czyć w naczyniu dobrze przykrytym do zu-  
pełnego ostygnięcia, przecedzić i dodać wy-  
skoku eterycznno - siarczanego drachmę iedną.

Ośłodzić do upodobania, cukrem, miodem czystym, lub miodkiem octowym, trzy-  
mać w laszce zawsze zatkanéy.

### Używanie.

Co dwie godziny w znaczney słabości  
i co gddzina po łyżce stołowéy, popiwać czy-  
stą wodą lub gotowaniem kwaśnicy.

### Dodatek pierwszy.

Z powyższych dwóch korzeni na przypa-  
dek gdyby się ieden z nich pod ręką niemiał  
znaydować, którenkolwiek wziętym być mo-  
że w znaczniejszy inż dozie np. od 6. drachm  
do całej uncyi.

### Dodatek drugi.

Gdyby wypadała potrzeba hardziéy osła-  
bione siły życia wzmacniać iak się to dość  
często przy febrach nerwowych zdarza, a do  
tego ból piersi, kaszel suchy, kłucia w któ-  
rymkolwiek boku się przyłączały, z wielkim  
skutkiem służy dodanie na wpół do tego na-  
lania moczenia pod liczbą 11.

### Nro. X.

Kamforę pół drachmy.

Migdałów słodkich oparzonych drachmę  
iedną, lub w niedostatku, proszku z gummy  
arabskiéy tąż samą ilość, na kamforę napu-  
ścić kropki kilka wódką, w moździerzu ze-  
trzeć na proszek, i dodać cukru twardego  
uncyą iedną, zmięszać wszystko iak nayle-  
piéy i w słoju zawiazanym zachować.

### Używanie.

Proszku tego na raz dawać po ziarek 10.  
co 2. godziny rozrobiwszy wpród dobrze  
w łyżce wody, co godzin 3. od oznaczony  
tu ilości rozpocząć, gdyby zaś siły życia osła-  
bionemi były iak się przytrafia w gorączkach  
zgniłych, nerwowych febrach, lub wznieca-  
niu potów wtychże samych chorobach, mo-  
żna ten proszek na przemian z lekarstwem  
pod Nr. 9. dawać, to iest, po dwóch zaży-  
ciach w oznaczonym czasie, raz trzeci tego  
proszku służy takóż dzielnie tenże proszek  
wbiegónkach zżaziębień pochodzących, w kol-  
kach po mocowaniach się, dzwiganiach, lub  
silnych uderzeniach powstałych, powiększyć  
nawet można iego użycie w oznaczonym po-



wyżey czasie, dla starszych wiekiem od 4. do 6. ziarek. Przy używaniu zaś tego proszku w nadmienionych tu chorobach lub przypadkach, mieć potrzeba wzgląd na obfitość potów, i ich trawienie, ażeby chorych nie osłabiały, ponieważ przez nie lubo uwalnia się w processie choroby przysposobione pierwiastki dla zwierzęcego gospodarstwa nieprzyjazne i po zagrancie ciała wyprowadzone, znacznie się do ozdrowienia przykładają wszelako zwykły się też i z niemi pierwiastki odżywe wyprowadzać, zwłaszcza przy chorobach wyżej nadmienionych gdzie szczupłe pokarmów użycie ledwie wystarcza utrzymaniu sił żywotnych. Do wzniesienia zaś tym potów równych po całym ciele mieć uwagę należy ażeby ich przez pościel otulania nią, gorącość izby i użytek takowych napoiów, nigdy długo a tymbardzię obfitych nieutrzymować ich dla powyższych przyczyn, w których skutku powiększenie słabości nastąpić może.

#### Nro. XI.

Kwiatu tranku górnego drachm dwie.  
(*Flores anicæ montane*).

Wrzucę wody kwaterek.

Moczyć w naczyniu do ostygnięcia, przecedzić, osłodzić miodem octowym, dodać

Wysoką eteryczno-siarczanego pół dr: zmięszając.

#### Używanie.

Po łyżce od iedzenia co parę godzin i wodą popić, na przypadek upadnięcia, podzwinięcia, uderzenia, sfłuczenia, służy to moczenie gatunkowo.

#### Dodatek.

W tym przypadku gdyby się pod ręką kwiat tranku górnego nie miał znajdować, lubo z daleko pomniejszy skutkiem i następującego szrodka użyć można. Wziąć

Kwiatu Sto Jańskiego uncyą iedną.

Wody półkwarty, zagotować razy 4. 6. przecedzić, osłodzić miodem czystym, lub octem miodowym do upodobania, dodać także wysoką eteryczno-siarczanego pół drachmy, zmięszając i z niego po dwie a nawet i trzy łyżki na raz w tymże co powyżej czasie dawać i wodą popijać.

#### Nro. XII.

Kory z sliwy czeremki uncyą iedną.

Ta nie ma być iak zgałazków 3. 4. letnich zbierana, w cieniu suszona, pokrajać drobno, wody czystey 3. kwaterek gotować do zostania się mnię nieco iak półkwarty, dać zupełnie ostygnąć, dodać wysoką żytniego czystego, to jest wódki łyżek 6. moczyć w ciepłym miejscu godzin 24. lub 36. przecedzić, wycisnąć, osłodzić miodem czystym, lub cukrem i zachować,

#### Używanie.

Brać co 3. godziny po pełney łyżce od iedzenia i popijać wodą czystą.

#### Nro. XIII.

Miodu czyszczonego praśnego.

Octu winnego legiego równe części up. o kwarcie, gotować na wolnym ogniu w niepalenicy rynce, zbierając szumowiny do



gęstości syropu czarnego, zachować do potrzeby w gąsiorku

### Używanie.

Służy do osłodzenia różnych mieszanin tu umieszczonych, do moczeń, kwiatu bzuwego, wody z grzanką, gotowania ięczmienia z wodą kleiową dla ich osłodzenia podług upodobania, a może też być przeznaczonym i sam od pół do całej łyżki co parę godzin w kaszlach, gardła bólach.

### Nro. IVX.

Soli Glaubera uncyą iedną.

— Amoniaku drachm dwie.

Proszku rumbabarowego drachm dwie.

Złoto siarczyku antymonu 20. ziarek.

Cukru twardego uncyą iedną.

Na ten napuścić olejku przekroplanego, kopru włoskiego lub anyżkowego kropli 12. wszystko w moździerzu na miazki proszek zetrzyść, i w słoju dobrze obwiązany zachowywać.

### Używanie.

Na trzy godziny przed a 4. po obiedzie łyżeczkę od kawy, z dwoma łyżkami wody czystej dobrze zamięszawszy wypić, wodą czystą lub też moczeniem wrzucęj wody ziela melissy iak cherbata się robi, popić.

Na przypadek któren się dość często pomiędzy zdrowem i tembardziem przy chorach zdarza, że się im albo nie podoba, lub zażywać w proszku lekarstw niechęć, następujące dla tych rozpuszczenie pod tymże numerem umieszczam.

Soli Glaubera uncyą iedną.

— Ammoniaku drachm dwie.

Kamienia winnego Antymonu ziarek 2. 3.

Miodku octowego łyżek 4. 6.

Wody wolnej dobrze połkwarty, razem to rozpuścić.

### Używanie.

Co parę godzin dawać po łyżce od iedzenia, lub i dwie podług potrzeby, otrzymania skutków w chorobach przy których wskazanym został proszek wyżej umieszczony, branie tego rozpuszczenia często popić wodą, lub też i melissą miasto herbaty.

### Nro. XV.

Do robionego moczenia pół Nr. 9. lub  
11 dodać

Soli Ammoniaku drachm dwie.

Rozpuścić i używać otymże czasie i w téj ilości iak się lekarstwa tam umieszczone zażywać kazały.

### Nro. XVI.

Hałunu czystego na proszek tartego drachmę iedną.

Wody czystej pół kwaterki, rozpuścić.

### Używanie.

Sarkać wnos podług potrzeby, lub też maczać w nim skubanki z płótna zwinięte i w otwór nosa wkładać, co często świeżo powtarzać do otrzymania skutku na któren jest to rozpuszczenie przeznaczonym.



## Dodatek.

Na przypadek krwi płynień znacznych, bądź to po rozwiązaniu, poronieniu, lub też i przez utrzenia w żywot gwałtownie powstających, rozpuszczenie to Hiatunu mocniejszy np. do tejże wody ilości wziąć iego drachm 2. 3. w tymże rozpuszczeniu gdzie niema pod ręką gąbki, można użyć i skubanki uwinięte, maczać dobrze w tym rozpuszczeniu i wypierać niemi pachwę maciczną, do otrzymania skutku, później takowe skubanki powolęj same zplyną lub też można je zwolna po 24. do 30. godzinach palcami wydobywać.

## Nro. XVII.

1. Osródka od chleba pytlowego garść 1.  
2. rozmiękczyć octem winnym, żeby się z tego ciasto przylegałące do palcy zrobiło.

## Używanie.

Gdzie wypada przyłożyć plaster z much Hiszpańskich, ten zastąpić oszczędnie może iego miejsce w sposób następujący, rozsmarowawszy toż ciało w grubości pół palca na płutnie wilgłości i szerokości jaka na miejscu przyłożyć się mające wymaga, brzegi po zaginać, na wierzach posypać proszku z much hiszpańskich, takowy wszędzie nożem rozgładzić, i na miejscu bólu, lub gdzie potrzeba w czasie sił osłabienia, maiaczeń, głowy bólów, na łytkach, karku, rękach, żywocie, przykładac, dobrze obwiązać aby się nie usunął, po 6. do 10. godzinach nabrany pęcherz przeciąć, wodę zebraną w nim wy-

puścić, hynaymniéy nie zdeymować uniesionéy skórki, przez co by znacznego bolu możną chorým tym bardziéy czułym, drażliwym, nieraz aż do febry i gorączki przynoczyć, poczym należy opatrzyć maścią pod liczbą 19. umieszczoną.

## Nro. XVIII.

Gorczycy tłuczonéy.

Chrzanu tartego np. po łyżek 2. 3.

Srzodka od chleba pytlowego, żytniego lub mąki garści dwie, octu winnego ile potrzeba, mieszaiać do zrobienia ciasta miękkiego.

## Używanie.

Gdzie pospieszniéy draznienie uczynić wypada np. na łytkach lub i innych miejscach wyżej namienionych, tam się tymże samym sposobem przykładá i tak długo trzyma aż się miejsce te nie zaczerwienieią, Wzgniętych febrach przy przytomności peteciów zwłaszcza sinych, u młodych krwistych jest to ciasto gorczycowe daleko bezpieczniey sze niżeli z much hiszpańskich, lub powyższe ciasto niemi posypane.

## Nro. XIX.

Wosku żółtego.

Żywiecy każdego po uncyi iednéy.

Sadła wieprzowego świeżego, niesłonego lub w nie dostatku iego

Oleju lnianego uncye 3. 4.

Na wolnym ogniu wszystko rozpuścić, przez grube płótno przecedzić i w naczyniu zachować.



*Używanie.*

Do przykładania na miejsce gdzie były przykładane robione plastry z ciasta i much hiszpańskich pod Nr. 17. przepisane, lub też i goienia skaleczeń, poiedyncze téy to maści złożenie, równie skutkuje iak inne drogie maści.

*Nro. XX.*

Wody czystéy zimnéy półgarca.

Solikuchenney półtory uncyi.

— Ammoniaku pół uncyi.

Octu winnego inocnego kwartę.

Kwasu siarczanego rozcieńczonego unc. 2.

Miodu praśnego czystego uncyi. 2.

Wszystko razem rozpuścić, w chłodnym miejscu zachować, można tę mieszaninę za każdą potrzebą świeżo robić, gdyby nawet pod ręką nie było soli Ammoniaku i kwasu siarczanego, wziąć do téy ilości wody, sól kuchenną i ocet winny.

*Używanie.*

Służy na uderzenia, przyciśnienia, zwłaszcza skuteczniejsza świeża, maczając w tym chusty we czworo złożone, te wycisnąwszy, na obrażone miejsca często przykładać, wszelako jeżeli przy tych obrażeniach jest zranienie, soli brać niepotrzeba, dosyć jest woda, ocet w téyże ilości co wyżej, z dodatkiem kwaterek dwóch okowitki.

*Nro. XXI.*

Oleju lnianego w niedostatku oliwy, migdałowego olejku uncją 1. rozpuścić w nim Kamfory ziarek 20.

Rozcieku ammonij wodnego drachm dwie zmieszać i flaszeczkę dobrze zatkać aby nie wywietrzała.

*Używanie.*

Mocno kłuiąc, smarować miejsca dolegające co 2. 3. godziny lub i miejsca przez powyższe przypadki obrażone, jeżeli te nie są zaczerwienione, w tym stanie już nie służy, iak z dobrym skutkiem kiedy sinieją, lub też i potym gdy jeszcze ból po nich zostaje.

*Nro. XXII.*

Wrotyczy nasienia lub kwiatu.

Goryczki krzyżowéy każdego drachm 2.

Wody półtory kwatunki.

Gotować do zostania się kwatunki, przecedzić, cukrem lub miodem osłodzić.

*Używanie.*

Dawać po pół łyżki od iedzenia dla młodszych, dla starszych po całej na godzin dwie przed, a 4. po iedzeniu, i na noc spać idąc popić wodą. Gdyby mniéy skutkować ten szrodek miał na zamiar dla siebie przeznaczony, do téyże ilości domieszać z niemalym skutkiem kropli rumbarbarowych łyżek od iedzenia 2. 3. a iedną łyżkę kropli z żelazą z pod Nr. 28.

*Nro. XXIII.*

Rumbarbarum dobrego pokraianego pół uncyi.

Boraxu weneckiego drachm półtory.

Wody wrzącéy kwatunkę dobrą.

Moczyć na miejscu ciepłym przez godzin 36. wycisnąć, przecedzić, dla dłuższego



utrzymania dodać łyżek dwie wysokości czy-  
stego.

### Używanie.

Dla młodych dzieci dawać po małej ły-  
żeczce od kawy, lub po kropli 20, 30. w o-  
słodzonej herbacie, lub moczeniu melissy,  
starszym zaś po parę łyżeczek na raz, a do-  
rosłym i po po całej łyżce od iedzenia 2 3.  
razy na dzień, to jest: z rana około południa  
w 3. godziny po obiedzie i na noc spać idąc,  
popić wodą czystą lub powyższym moczeniem,

### Nro. XXIV.

Korzeni omanu.

- biedrzyńca białego,
- Kozłku.
- Kalmusu.

Ziela goryczki czyli żółci ziemnej.

Jałowcu dojrzałego przefluczonego.

Z każdego po uncyi dwie.

Ziela i korzenie drobno pokrajać, zmię-  
szać i dodać potażu czyszczonego pół uncyi.

Wody czystej kwart trzy.

Wysokoku czystego kwartę iedną.

Moczyć na ciepłym miejscu godzin 36.  
w naczyniu szklanym lub niepolewanym gli-  
nianym, dobrze obwiązany, cedząc wyci-  
skać mocno, dać się ustać, zlać w gąsiorek  
dobrze zatkany.

### Używanie,

Zacząć brać od pół łyżki do całej aż do  
pół kieliszka, rano przed obiadem na godzin 2.  
w 4. zaś po iedzeniu samego moczenia lub z do-  
mieszaniem czystej wody. Oprócz choro-  
by na przeciw której szodek ten zlicznych

doświadczeń tu położyłem, równie i dzielnie  
się skutecznym okazał, po długich często po-  
wracających febrach przerywanych, szwar-  
tackach, gdzie już obrzmiewania nóg nawet  
i całego żywota przystępowały, niemniej w u-  
partych biegunkach, dysenterjach, wszkro-  
ficznych nawet u starych cierpieniach, lub  
też i przez wstrzymanie czyszczeń miesięcz-  
nych, gdzie się już i dech krótki, bladeść  
twarzy, utracenie apetytu, obrzmienie części  
ciała przedstawiały przywracając takowe pły-  
nienia zupełnie zniósł nadmiernie tu przy-  
padłości.

### Nro. XXV.

Maści z pod Nr. 19. uncją iedną.

Proszku z much hiszkańskich pół drach:  
Zmieszać razem dobrze.

### Używanie.

Gdzie wypada utrzymać ciągle rany ro-  
pienie np. po ukąszeniu zwierząt wściekłych,  
bądź to domowych, lub dzikich, czyli też  
przy upartych bólach miejscowych, nasma-  
rować nią fleytuszką, na miejsca obrażone  
przykładać co dzień świeżo, pokąd utrzyma-  
nie ropienia jest przez znawcę za potrzebno  
uznany.

### Nro. XXVI.

Węglań amonij z olejem przepalany  
ziarek 1. 2. do 3. stosownie do wieku.

Kamfory od pół do całego ziarka.

Cukru twardego ziarek 15.

Zetrzyć na proszek.

### Używanie.

Co dwie godziny a w potrzebie najlepszy  
gdzie się zwiększa uduszenia obawa, co pół-



tory godziny włożyć osłodzoną wody i nią popić, zbraniem tych proszków opóźnić się stosownie do zwolnień przypadłości które się przy opisie tej choroby umieściły.

*Nro. XXVII.*

Storczyku korzenia suszonego przetłuczonego, lub też i saleppu pół do całej dr:

Wody zimnej czystej kwaterkę.

Mieścić, powoli do ognia przystawić, klucząc łyżką przy gotowaniu, przecedzić przez sitko, osłodzić cukrem, na którym napuścić kropli 2. 3. olejku anyżkowego lub z kopru włoskiego. zetrzyć i zmieszać z gotowaniem, tem dobrze przestudzonem, dodać rozcieku amonii wodnego pół do całej drachmy, i zmieszać trzymając w fiaszce dobrze, zalkamę, gdzieby nie było cukru, osłodzić można i miodem czyszczonym.

*Używanie.*

Mocno klucząc dawać co godzina, co półtury dla młodych po parę łyżeczek od kawy, dla starszych od pół do całej łyżki.

*Nro. XXVIII.*

Opitków żelaza świeżych, czystych Un: 1.

Octu winnego łgiego półtury kwarty.

Korzenia kuklika goździkowego uncją 1.

Ten pokrajać drobno, zmieszać i moczeniu bez czasu oznaczenia zostawić, mieszać kiedy niekiedy naczynie.

*Używanie.*

Oprócz dodawania tych kropli z żelaza do innych środków, samym od 20, 30 włożyć wody zażywać zrana na godzin dwie przed

a w 4. po obiedzie, popijając wodą. Przy używaniu ich koniecznym jest potrzebny jest ruch ciała dla silniejszego wzmacniania sił skutkowania, dla młodszych zaś np. od 10. lat którym jest połowa tych kropli.

*Nro. XXIX.*

Pączków sosnowych.

Mrowiska czystego, każdego po kwarcie

Wysokiu czystego półtora garca.

Moczyć w gąsiorku do upodobania, niekiedy klucząc.

*Używanie.*

Przedziwszy na potrzebę, smarować części od reumatyzmu zacięte, rano i na noc, i te wprzód lekko wełnianemi rzeczami nacierać, poczym takowe można okłaniać płótnem aby niezbyt grubym, które umaczać należy w roztopionym wosku i żywicy, w równych częściach, dodając utartą kamsforę część czwartą co było wosku i żywicy. Takowe płótna dla uboższej klasy, równymże skutkiem się przysługują, jak dla możnych zagraniczne, jedwabne, lub z cienkiego płótna pokostowane.

*Nro. XXX.*

Boraxu Weneckiego utartego na proszek pół uncij.

Wody czystej półtury kwaterki.

Rozpuścić miodem lub cukrem osłodzić.

*Używanie.*

Co półtury, dwie godziny brać po 1. dnę lub dwie łyżek od jedzenia popijać wodą, lub moczeniem Melissy, bylicy, kwiatu rumiankowego, miasto herbaty:



## Nro. XXXI:

Porostu scian lub dachów oczyszczonego mircyą iedną.

Wody czystéy pultory kwarty, gotować do zostania się połowy, precedzić, osłodzić cukrem lub miodem i dodać wysoku eteryczno-siarczanego drachmę iedną

## Używanie.

Co dwie lub 3. Godziny brać zacząwszy od łyżki od iedzenia do dwóch, popić wodą czystą.

## Nro. XXXII.

Kwas Siarczauny rozciężzony.  
Zawsze gotowy iest w Aptekach.

## Używanie.

Wchodzi do lekkiego zakwaszenia wody, do dodawania gotowanego ięczmienia, kleiów z k. sz. służących za napój w Gorączkowych chorobach, wzgniętych febrach, w szkorbutcie.

Przy zamknięciu téy części nadmieniam pracownik pisma tego że się starał i dokonał dowieść żeby leczenia srodki, były łatwe do zrobienia nie kosztowne a nadewszystko z kraioowych roślin robionemi, oparty na swych doświadczeniach zarówno zastąpić mogły w dzielnym skutkowaniu najkosztowniejsze zamorskie rozmaite roślinnego wydziału części, iakoż z nowych odkryciów nieprzepominał umieścić porostu pod Nr. 31. że tenże i co do pierwiastków składowych i co do skutku drogiéy a nieraz i do niezwyčajney ceny dochodzącéy chi-

ny

ny wniczym nieustępuje. Gdyby się starało śledzić niewiadomych dotąd roślin ziemni Oycow naszych i ich skutków, bynajmniej niema powątpiewania, żeby się nie miały znaleźć zastępcze lpekakuany i innych wielu.

Koniec całego Pisma.










Fig. 4.



Fig. 5.




Fig. 6.



leaf



Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.






Fig. 10.





Fig. 11.



Fig. 12.





4616



